

ОҢТҮСТІК-ҚАЗАҚСТАН MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		 SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Педиатрии-1 кафедрасы		044-38/19
«Балалар хирургиясы» пәні бойынша оқу нәтижелерін қорытынды бағалауға арналған БӨҚ		76 беттің 1 беті

Пән бойынша оқу нәтижелерін қорытынды бағалауға арналған бақылау-өлшеуіш құралдары

Пән атауы: «Балалар хирургиясы»

Пән коды: ВР 4206

БББ атауы: 6В10101 «Жалпы медицина»

Оқу сағаттарының көлемі (кредиттер): 150сағат (5 кредит)

Оқытылатын курс пен семестр: 4 курс, VIII семестр

Бақылау-өлшеуіш құралдары: аралық аттестаттау

Шымкен 2023ж

ОҢТҮСТІК-ҚАЗАҚСТАН MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Педиатрии-1 кафедрасы «Балалар хирургиясы» пәні бойынша оқу нәтижелерін қорытынды бағалауға арналған БӨҚ		044-38/19 76 беттің 2 беті

Аралық аттестаттауға арналған тест тапсырмалары

Құрастырушы:

Ассистент: Нарходжаев Н.С.

Хаттама № 11 « 23 » 06 2023ж

Каф.меңгерушісі, PhD



К.С.Кемельбеков

ОҢТҮСТІК-ҚАЗАҚСТАН MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		 SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Педиатрии-1 кафедрасы		044-38/19
«Балалар хирургиясы» пәні бойынша оқу нәтижелерін қорытынды бағалауға арналған БӨК		76 беттің 3 беті

1. Пән бойынша аралық аттестаттауға арналған тест тапсырмаларының спецификациясы

№	Тақырып	Үлес салмағы, %	Тест тапсырмаларының саны	Когнитивті деңгейлер		
				Білім, %/саны	Түсіну, %/саны	Қолдану %/саны
	Пән бойынша барлық тестілер	100%	480	10%/48	50%/240	40%/192
1	ҚР балалар хирургиясының қызметін ұйымдастыруы. Аппендицит.	11%	53	1/5	5/26	4/21
2	Балалардағы құрсақ қуысының жіті хирургиялық аурулары.	11%	53	1/5	5/26	4/21
3	Туа біткен және жүре пайда болған жіті ішек өтімсіздігі. Ішек инвагинациясы.	11%	53	1/5	5/26	4/21
4	Зәр шығару жолдарының туа біткен ақаулары мен аурулары.	11%	53	1/5	5/26	4/21
5	Жұмсақ тіндердің ірінді қабыну аурулары. Нәресте флегмонасы, омфалит, мастит, псевдофурункулез, гидроаденит. Остеомиелиттер.	11%	53	1/5	5/26	4/21
6	Кіндіктің туа біткен жыланкөзі. Меккель дивертикулі. Шап жарықтары. Крипторхизм. Варикоцеле. Гидроцеле.	12%	56	2/8	10/32	8/24
7	Асқазан-ішек жолдарынан қан кету	11%	53	1/5	5/26	4/21
8	Ұршықтың туа біткен шықпасы. Бұлшық еттік қисық мойын. Маймақтық.	11%	53	1/5	5/26	4/21
9	Балалар жасындағы сынықтардың ерекшеліктері. Патологиялық сынықтар. Туылу кезіндегі жарақат.	11%	53	1/5	5/26	4/21

2. Аралық аттестаттауға арналған тест тапсырмалары (4 кредит 120 сағ 480 тест)

~Краснобаев-Венгеровский классификациясы бойынша жедел гематогенді остеомиелиттің клиникалық түріне ... түрі жатады.

@жергілікті

@ірінді

@аллергиялық

@геморрагиялық

@деструктивті

~Краснобаев-Венгеровский классификациясы бойынша жедел гематогенді остеомиелиттің клиникалық түріне ... түрі жатады.

ОҢТҮСТІК-ҚАЗАҚСТАН MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Педиатрии-1 кафедрасы		
«Балалар хирургиясы» пәні бойынша оқу нәтижелерін қорытынды бағалауға арналған БӨҚ		044-38/19 76 беттің 4 беті

@септикопиемиялық

@деструктивті

@аллергиялық

@іріндісі

@геморрагиялық

~Краснобаев-Венгеровский классификациясы бойынша жедел гематогенді остеомиелиттің клиникалық түріне ... түрі жатады.

@токсикалық

@ірінді

@деструктивті

@аллергиялық

@геморрагиялық

~Балаларда жедел гематогенді остеомиелит патогенезінің тұжырымдалған ... теориясы жатады.

@Дерижановтың аллергиялық

@Краснобаевтің тұрақтылық

@Ашофтың инфекциялық

@Венгеровскийдің деструктивті

@Ивановтың токсикалық

~Балаларда жедел гематогенді остеомиелиттің көп жағдайда қоздырғышы ... болады.

@стафилококк

@стрептококк

@хламидиялар

@вирустар

@ішек таяқшасы

~Балаларда эпифизарлық остеомиелит ... жиі кездеседі.

@1 жасқа дейін

@3 жасқа дейін

@3 жастан жоғары

@жаңа туған нәресте кезеңі

@пубертанттық кезеңде

~Балаларда жедел гематогенді остеомиелит ... жиі орналасады.

@сан сүйегінде

@бас сүйегінде

@бұғанада

@білек сүйектерінде

@кіші жіліктік сүйегінде

~Балаларда жедел гематогенді остеомиелиттің дамуына әсер ететін негізгі себеп:

@жасырынды инфекция ошағының болуы

@тұқым қуалаушылық

@көректендіру ерекшелігі

@мінез-құлқының ерекшелігі

@экология

~Жедел остеомиелит кезінде қабыну процесі сүйектің ... басталады.

@сүйек кемігінен

@сыртқы қабығынан

@диафизден

ONTÜSTIK-QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Педиатрии-1 кафедрасы		
«Балалар хирургиясы» пәні бойынша оқу нәтижелерін қорытынды бағалауға арналған БӨҚ		044-38/19 76 беттің 5 беті

@метафизден

@эпифизден

~Нәрестелерде остеомиелит сүйектің ... көп кездеседі.

@эпифизінде

@метафизінде

@диафизінде

@апофизінде

@сүйек кемігінде

~Жедел гематогенді остеомиелитпен түскен науқасқа оперативті ем ... жүргізіледі.

@түскеннен кейін алғашқы сағаттарда

@түскеннен кейін 6 сағаттан соң

@1 тәуліктен соң

@3 тәуліктен соң

@6 айдан кейін

~Жедел деструктивті пневмониямен ауру ... жиі кездеседі.

@3 жасқа дейін

@3-5 жас аралығында

@5-7 жаста

@7-9 жаста

@10 жастан жоғары

~Мегадуоденумның пайда болуының сыртқы себептерінің бірі болып ... табылады.

@сақина тәрізді ұйқы безі

@12-елі ішектің атрезиясы

@орталық ішектің бұралуы

@12-елі ішектің стенозы

@12-елі ішектің саңылауындағы мембрана

~12-елі ішек атрезиясының R-логиялық көрінісіне ... тән.

@іш қуысының жоғарғы бөлігінде сұйықтықтың екі деңгейі

@мылқау іш

@бауырдың үлкеюі

@көптеген Клойбер тостағаншалар

@сұйықтық деңгейі бар асқазанның кеңеюі

~Ледда синдромы дегеніміз - ...

@орталық ішектің туа болатын бұралуы, жоғары орналасқан соқыр ішек іш қуысының артына жабысуымен қосарланып келеді

@іш қуысының ісігі, орталық ішектің бұралуымен қосарланып келеді

@12-елі ішектің стенозы

@соқыр ішектің аномальды орналасуы мен сақина тәрізді ұйқы безі

@12-елі ішектің мембранозды өткізбеушілігі

~Ледда операциясы кезінде ... жасалынады.

@эмбрионалды тартылған жіпшелерді кесіп, шажырқайды қалпына келтіру

@өңештің пластикасы

@талақты алып тастау

@ішектің резекциясы

@ішек саңылауындағы мембрананы тілу

~Төменгі ішек өткізбеушілігіне ... жатады.

@аш ішектің атрезиясы

ONTÜSTIK-QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Педиатрии-1 кафедрасы		
«Балалар хирургиясы» пәні бойынша оқу нәтижелерін қорытынды бағалауға арналған БӨҚ		044-38/19 76 беттің 6 беті

@12 елі ішектің атрезиясы
 @12 елі ішектің стенозы
 @пилоростеноз
 @өңештің атрезиясы
 ~Аш ішек атрезиясында клиникалық көріністер ... басталады.
 @өмірінің 2-ші тәулігінен
 @10 жасында
 @5 айлығында
 @өмірінің 1 айының соңында
 @өмірінің 3-4 апталарында
 ~... аш ішек атрезиясының симптомдарының бірі болып табылады.
 @Меконияның болмауы
 @Меконияның қан аралас шығуы
 @Дене қызуының көтерілуі
 @Фонтан тәрізді құсу
 @Тәбетінің жоғарылауы
 ~... мекониялды өткізбеушілікке әкеледі.
 @Ішек саңылауының қою мекониямен бітелуі
 @Ішек инвагинациясы
 @12-елі ішектің атрезиясы
 @Глисті инвазия
 @Оорта ішектің бұралуы
 ~Мекониялды өткізбеушілік кезінде ... көрінеді.
 @іштің барлық бөлігінің кебуі
 @іштің барлық бөлігінің ішке тартылуы
 @қалыпты жағдай
 @тек эпигастралды аймақтың кебуі
 @“құм сағат” белгісі
 ~Крипторхизмнің пайда болуына ... әкеледі.
 @механикалық кедергілер мен гормондардың жетіспеушілігі
 @ұрық бауының ұзын болуы
 @аталық безінің иннервациясының бұзылуы
 @аталық бездің ұмаға орналасуы
 @шап жарығының пайда болуы
 ~Крипторхизмнің себебіне ... жатады.
 @шап каналындағы фиброзды кедергілер
 @ұрық бауының созылуы
 @ұманың жетілмеуі
 @Гунтеров жіпшелерінің болмауы
 @іш пердесінің қынап өсіндісінің жетілмеуі
 ~Аталық бездің орналасуына байланысты крипторхизмнің ... түрі болады.
 @инвагиналды
 @ұмалық
 @шаптық және ұмалық
 @аралық
 @кеуделік
 ~Жалған крипторхизмнің себебіне ... жатады.

ONTÜSTIK-QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Педиатрии-1 кафедрасы		
«Балалар хирургиясы» пәні бойынша оқу нәтижелерін қорытынды бағалауға арналған БӨҚ		044-38/19 76 беттің 7 беті

@кремастерлі рефлектің жоғары болуы
 @аталық бездің туа болатын жетілмеуі
 @шап каналының жетілмеуі
 @іш пердесінің вагиналды өсіндісінің семуі
 @вагиналды өсіндінің абсорбциялық қабілетінің төмен болуы
 ~Крипторхизмнің негізгі белгісі болып ... табылады.
 @ұмада аталық бездің болмауы
 @шап каналының сыртқы тесігінің кеңеюі
 @аталық бездің веналарының варикозды кеңеюі
 @аталық бездің көлемінің үлкеюі
 @ұманың үлкеюі
 ~Крипторхизмді ... ауруымен ажырату жүргізілмейді.
 @орхитидит
 @анорхизм
 @монорхизм
 @жалған крипторхизм
 @аталық бездің эктопиясы
 ~Крипторхизм ... қосылып келеді.
 @шап жарығымен
 @мегаколонмен
 @гидроцелемен
 @уретроцелемен
 @гидронефрозбен
 ~Крипторхизм кезінде аталық бездің орналасуын анықтау үшін ... қолданылады.
 @лапароскопия
 @жедел түрдегі урография
 @радиоизотопты нефросцинтиграфия
 @жалпы шолу рентгенографиясы
 @ретроградты пиелография
 ~Крипторхизм кезінде ... жиі кездесетін асқыну болып табылады.
 @сперматогенездің бұзылуы және аталық бездің малигнизациясы
 @ұрық бауының жедел пайда болатын шемені
 @шап жарығында аталық бездің қысылып қалуы
 @орхитидит
 @аталық бездің тамырларының варикозды кеңеюі
 ~Крипторхизм кезінде операцияны ... жасау керек.
 @2-4 жаста
 @10-14 жаста
 @6-10 жаста
 @15 жастан жоғары
 @0-1 жаста
 ~Крипторхизмді оперативті емдеу кезінде ... кең қолданылады.
 @Китли-Торека-Герцен операциясы
 @Винкельман операциясы
 @Росс операциясы
 @Полом операциясы
 @Иванисевич операциясы

ONTÜSTIK-QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Педиатрии-1 кафедрасы		
«Балалар хирургиясы» пәні бойынша оқу нәтижелерін қорытынды бағалауға арналған БӨҚ		044-38/19 76 беттің 8 беті

~Крипторхизм кезінде бір мезеттік орхипексия көрсеткіштеріне ... жатады.

@ұрық бауының ұзын болуы

@абдоминалды түрі

@жалған крипторхизм

@екі жақты крипторхизм

@бір жақты крипторхизм

~Крипторхизм кезіндегі екі этапты орхипексияға көрсеткіш болып ... саналады.

@ұрық бауының қысқа болуы

@2 жақты крипторхизмнің болуы

@1 жасқа дейінгі балалар

@12-14 жастан жоғары балалар

@жалған крипторхизм

~Аталық без эктопиясы дегеніміз:

@аталық бездің ұмаға түсетін жолынан ауытқуы

@іш пердесінің вагиналды өсіндісінің семуінің болмауы

@шап каналында аталық бездің бөгелуі

@екі аталық бездің жетілмеуі

@бір аталық бездің жетілмеуі

~Анорхизм дегеніміз:

@екі аталық бездің туа болмауы

@бір аталық бездің туа болмауы

@шап каналында аталық бездің бөгелуі

@іш пердесінің вагиналды өсіндісінің бітелмеуі

@аталық бездің түсетін жолынан ауытқуы

~Монорхизм дегеніміз:

@бір аталық бездің туа болмауы

@екі аталық бездің туа болмауы

@аталық бездің шап каналында бөгелуі

@іш пердесінің өсіндісінің бітелмеуі

@аталық бездің түсетін жолынан ауытқуы

~... синорхизмге тән болады.

@Екі аталық бездің бір-біріне туа жабысуы

@Қосымша үшінші аталық бездің болуы

@Аталық бездің туа жетілмеуі

@Екі аталық бездің туа болмауы

@Бір аталық бездің туа болмауы

~Варикоцеле дегеніміз ... білдіреді

@ұрық бауының веналарының кеңуін

@бір аталық бездің туа жоқ болуы

@аталық бездің ұмаға қарай жүретін жолынан ауытқуы

@аталық бездің шап каналында орналасуы

@вагиналды өсіндінің қуысында серозды сұйықтықтың жиналуы

~Варикоцеленің этиологиялық факторы ... болып табылады.

@аталық безден, қосалқыдан, ұрық жүретін жолдың вена жүйесіндегі қанның кері ағуы

@аталық бездің гипоплазиясы

@жоғарғы қуыс венаның қысылып қалуы

@анорхизм

ONTÜSTIK-QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Педиатрии-1 кафедрасы		
«Балалар хирургиясы» пәні бойынша оқу нәтижелерін қорытынды бағалауға арналған БӨҚ		044-38/19 76 беттің 9 беті

@шап каналының даму ақауы

~Оң жақ аталық без венасы ... келіп құяды.

@төменгі қуыс венасына

@мықын венасына

@төменгі геморраидальды венаға

@кремаштерлі венаға

@оң жақ бүйрек венасына

~Сол жақ аталық без венасы ... келіп құяды.

@сол жақ бүйрек венасына

@төменгі қуыс венасына

@мықын венасына

@төменгі геморраидальды венаға

@кремаштерлі венаға

~Варикоцеле ... жиі кездеседі.

@сол жақта

@оң жақта

@екі жақтада бірдей

@артында

@алдында

~Варикоцеле ... жас шамасында жиі кездеседі:

@12-14 жас

@4-6 жас

@15 жастан жоғары

@7-8 жас

@1-3 жас

~... оперативті емге көрсеткіш болып табылады.

@2-3 дәрежелі варикоцеле

@Квинке ісігі

@4-5 дәреже варикоцеле

@1 дәрежелі варикоцеле

@эпидидимит

~Варикоцеле кезінде ... әдісі бойынша операция жасалынады.

@Иванисевич

@Росса

@Фред-Рамштед

@Вангестин

@Мартинов

~Варикоцеле кезінде операцияның басты мақсаты ... болып табылады.

@қаннның теріс ағуын жою

@шап каналына пластика жасау

@коллотералды ағым жасау

@іш перденің вагиналды өсіндісін байлап, кесіп тастау

@аталық безда қан айналысын күшейту

~Талақтың көлемі ... кішірееді.

@қан кеткеннен кейін

@қан кеткенге дейін

@гипертермия кезінде

ONTÜSTIK-QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Педиатрии-1 кафедрасы «Балалар хирургиясы» пәні бойынша оқу нәтижелерін қорытынды бағалауға арналған БӨҚ		
		044-38/19 76 беттің 10 беті

@құсқаннан кейін
 @дене қалпын өзгерткеннен кейін
 ~Порталды гипертензия кезінде ... қан кетеді.
 @өңеш веналарынан
 @асқазан кілегей қабатынан
 @12-елі ішектен
 @мықын ішектен
 @асқазанның пилорикалық бөлігі веналарынан
 ~Өңеш-асқазан қан кетуін тоқтату үшін ... қолданылады.
 @Блекмор зонды
 @ішектің интубациясы
 @жгутпен байлау
 @тамырды саусақпен басу
 @аяғын жоғары көтеру
 ~Гиперспленизм кезінде қан анализінде ... болады.
 @лейкопения
 @лейкоцитоз
 @лимфоцитоз
 @нейтрофилез
 @билирубинемия
 ~Меккел дивертикулы ... шажырқайының қарсы бетінде орналасады.
 @мықын ішектің
 @тоқ ішектің өрлейтін бөлігі
 @12-елі ішектің
 @соқыр ішектің
 @тоқ ішектің көлденең бөлігі
 ~Меккел дивертикулы кезінде ... кездеспейді.
 @талақтың жыртылуы
 @қан кету
 @дивертикулит
 @ішек инвагинациясы
 @ішек өткізбеушілігі
 ~Меккел дивертикулын ... анықтауға болады.
 @лапароскопия арқылы
 @рентгенография
 @биохимиялық анализдер арқылы
 @Грегуар сынамасымен
 @томография арқылы
 ~Меккел дивертикулын емдеу ... қажет етеді.
 @радикалды операцияны
 @консервативті емді
 @паллиативті операцияны
 @витамин мен гормондарды қолдануды
 @физиотерапияны
 ~Аппендикс деструкциясының басталуымен жедел аппендициттің клиникасында науқастың ... байқалады.
 @уақытша жағдайының жақсаруы

ONTÜSTIK-QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Педиатрии-1 кафедрасы		
«Балалар хирургиясы» пәні бойынша оқу нәтижелерін қорытынды бағалауға арналған БӨҚ		044-38/19 76 беттің 11 беті

@жалпы жағдайының нашарлауы
 @күсуы
 @іштің ауырсынуының күшеюі
 @жиі сұйық нәжістің болуы
 ~Жедел аппендицит ... жиі кездеседі.
 @орта мектеп жасындағы балаларда
 @3 жастағы балаларда
 @төмен мектеп жасындағы балаларда
 @1 жасқа дейінгі балаларда
 @жаңа туған нәрестелерде
 ~Іштің ауру синдромы бар 3 жасқа дейінгі балалар ... бөлімшеде тексерілу қажет.
 @хирургиялық
 @реанимация
 @соматикалық
 @инфекциялық
 @нефрологиялық
 ~Ерте жастағы балаларда жедел аппендициті болғанда ұйықтатып ... табамыз.
 @қолды итеріп тастау белгісін
 @Ситковский белгісін
 @Ровзинга белгісін
 @пульспен дене қызуының әр түрлі болуын
 @тік ішектің алдыңғы қабырғасының салбырау белгісін
 ~Мектеп жасына дейінгі қыз балаларда жедел аппендицитті ... ажырату керек.
 @пневмониядан
 @тік ішектің полипінен
 @менструация алдындағы ауырсынудан
 @пилоростеноздан
 @пилороспазмнан
 ~3 жасқа дейінгі балаларда жедел аппендицитті анықтау үшін ... әдісі қолданылмайды.
 @ректороманоскопия
 @ректальды тексеру
 @лейкоцитозды анықтау
 @термометрия
 @ішті ұйқы кезінде пальпация жасау
 ~Жедел аппендициті бар балада іштегі ауырсыну ... түрде болады.
 @тұрақты
 @ұстамалы
 @айналмалы
 @колика
 @иррадиациялы
 ~Жедел аппендициті бар баланың құсығында ... болады.
 @асқазандағы тамақ
 @жасыл түсті зат
 @өт
 @нәжіс
 @қан

ONTÜSTIK-QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Педиатрии-1 кафедрасы		
«Балалар хирургиясы» пәні бойынша оқу нәтижелерін қорытынды бағалауға арналған БӨҚ		044-38/19 76 беттің 12 беті

~Инфекциялық гепатитті жедел аппендициттен ажыратуға арналған диагностикалық шараға ... жатады.

- @қанның биохимиялық анализі
- @қанның жалпы анализі
- @аускультация
- @перкуссия
- @термометрия

~Жедел аппендицитті зәр-тас ауруынан ажыратуға арналған диагностикалық тәсілге ... жатқызамыз.

- @іш қуысының жалпы шолу рентгенографиясын
- @цистоскопияны
- @цистографияны
- @экскреторлы урографияны
- @ректороманоскопияны

~Асқазанның жарасын жедел аппендициттен ажыратуға арналған диагностикалық тәсілге ... жатқызамыз.

- @фиброгастроскопияны
- @қанның жалпы анализін
- @асқазан сөлінің анализін
- @компьютерлі томографияны
- @іш қуысының жалпы шолу рентгенографиясын

~Ішек инфекциясын жедел аппендициттен ажыратуға арналған диагностикалық тәсілге ... жатқызамыз.

- @копрологиялық зерттеу әдісін
- @ректороманоскопияны
- @зәрдің жалпы анализін
- @термометрияны
- @қанның биохимиялық зерттеу әдісін

~Балалардағы жедел аппендицитті ... ауруымен ажырату диагностикасы жүргізілмейді.

- @асқазан ішек жолының атрезиясы
- @асқазанның және 12 елі ішектің жарасы
- @цистит
- @глисті инвазия
- @пневмония

~Жедел аппендицитті диагностикалау үшін балаға дәрі беріп ұйықтату кезінде ... симптомы анықталады.

- @қолды итеру
- @Кохер
- @Кернинг
- @Ортнер
- @Пастернацкий

~Аппендикулярлы абсцесс кезінде хирургтің іс-әрекетіне ... жатады.

- @абсцесті тіліп, дренаждау
- @аш ішекті ревизия жасау
- @ішек стомасын қою
- @іш қуысына санация жасау
- @іштің қабырғасына компресс қою

ONTÜSTIK-QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Педиатрии-1 кафедрасы		
«Балалар хирургиясы» пәні бойынша оқу нәтижелерін қорытынды бағалауға арналған БӨК		044-38/19 76 беттің 13 беті

~Ересек жастағы балаларда аппендикулярлы инфильтрат болған кездегі хирургтің іс-әрекетіне ... жатқызылады.

@консервативті емдеу

@аппендэктомия жасау

@ішек резекциясын қолдану

@іш қуысын жуу

@инфильтратты тілу

~3 жасқа дейінгі балаларда аппендикулярлы инфильтратты емдеудегі хирургтің іс-әрекетіне ... жатқызылады.

@консервативті емдеу

@ішекті интубация жасау

@ішекті резекция жасау

@іш қуысын жуу

@лапаротомия, инфильтратты тіліп, дренаж жасау

~Аппендэктомиядан кейін іш қуысына қан кету ... себебінен болады.

@өсінді шажырқайының лигатурасы дұрыс байланбау

@ішек қабырғасы тесілу

@өсінді қалдығының әлсіз байлануы

@тифлит

@перитонит

~Мектеп жасындағы баланың іші ауырғанда педиатр ... керек.

@жедел жәрдем машинасын шақыруы

@мектепке хирургті шақыруы

@науқасты емханада тексеруі

@ата-анасын шақыруы

@баланы үйге жіберуі

~Диплококты перитонит ... жиі кездеседі.

@5-9 жас аралығында

@5 жасқа дейін

@10-14 жаста

@3 жасқа дейін

@14 жастан жоғары

~Мектеп жасындағы балаларда перитониттің ... түрі жиі кездеседі.

@аппендикулярлық

@өттен болатын

@диплококтан болатын

@спецификалық

@гормоналды

~Перитонит жіктелуінде ... түрі болмайды.

@шіріген

@серозды

@хилезді

@ірінді

@геморрагиялық

~Жайылған перитонит кезінде балаларда құрсақ қабаттарын ... кеседі.

@ортадан

@Федоров бойынша

ONTÜSTIK-QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Педиатрии-1 кафедрасы		
«Балалар хирургиясы» пәні бойынша оқу нәтижелерін қорытынды бағалауға арналған БӨҚ		044-38/19 76 беттің 14 беті

@Рио-Бранко бойынша

@қиғаш

@Дьяконов-Волкович бойынша

~... нәрестелердегі перитониттің себебі болып табылады.

@Кіндік сепсисі

@Сары уыз жолының бітпеуі

@Нәрестелердің маститі

@Урахустың бітпеуі

@Некротикалық флегмона

~Нәрестелерде некрозды флегмона кезінде ... бірінші зақымдалады.

@тері асты майлары

@май бездері

@тері бездері

@дерма

@эпидермис

~... некротикалық флегмонаның дамуының бір ерекшелігіне жатады.

@Некротикалық процесстің басым болуы

@Ірінді ыдыраудың басым болуы

@Лимфа түйіндерінің инфильтрациясы

@Дене қызыуының жоғары болуы

@ЭТЖ-н тездеуі

~Некротикалық флегмона кезінде инфекцияның енуіне мүмкін болып табылатын жол -

@мацерацияланған тері жамылғылары

@асқазанның кілегей қабығы

@ауыз қуысының кілегей қабығы

@тыныс жолдары

@ас қорыту жолдарының кілегей қабықтары

~Некротикалық флегмона кезінде инфекцияның енуіне мүмкін болып табылатын жол -

@кіндік жарасы

@асқазанның кілегей қабығы

@ауыз қуысының кілегей қабығы

@түк қапшығы

@ішектің кілегей қабығы

~Нәрестелердің флегмонасында ... басым болады.

@некротикалық процесс

@қабыну белгілері

@иісті ірің

@ірінді сұйықтық

@экссудативті түзіліс

~Нәрестелердің флегмонасын хирургиялық жолмен емдеудің ең дұрыс жолы - ...

@сау тіндерді қамтып тілу, тілме жасау

@ошақты үлкен етіп тіліп ашу

@ошақты пункция жасау және жергілікті антибиотиктер енгізу

@гиперемия аймағын тілу, тілме жасау

@новокаин ерітіндісімен ошақты пункция жасап, инфильтрациялау

~Нәрестелер флегмонасы ... көп кездеседі.

@бел - сегізкөз аймағында

ONTUSTIK-QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Педиатрии-1 кафедрасы		
«Балалар хирургиясы» пәні бойынша оқу нәтижелерін қорытынды бағалауға арналған БӨҚ		044-38/19 76 беттің 15 беті

@қолда
 @аяқта
 @бетте
 @күрсақ қабырғасында
 ~Пилоростеноз дегеніміз - ...
 @асқазанның пилорикалық бөлігінің қалындауы және тарылуы
 @асқазанның пилорикалық бөлігінің спазмы
 @Верльгоф ауруы
 @Гиршпрунг ауруы
 @12 елі ішектің өткізбеушілігі
 ~Пилоростеноздың алғашқы белгілері ... білінеді.
 @туғаннан кейін, бірінші күннен 1 айға дейін
 @5 жаста
 @7 жаста
 @4 айда
 @туылғаннан кейін алғашқы сағаттарда
 ~Пилоростеноз диагнозын негіздеу үшін ... қолданылады.
 @эндоскопия
 @УДЗ
 @пальпация
 @лабораториялық анализдер
 @аускультация
 ~Пилоростенозды оперативті жолмен емдеу ... тәсілімен жүргізіледі.
 @Фред-Рамштед
 @Дюамель
 @Кадер
 @Ледд
 @Баиров
 ~... пилоростенозға тән белгі.
 @2-ші аптаның соңы мен 3-ші аптаның басында құсу
 @туылған сәттен бастап құсу
 @1-ші тәуліктен бастап локсу
 @туылған күннен бастап өт аралас құсу
 @2 айдан соң «фонтан» тәрізді құсу
 ~Гидроцеле кезіндегі консервативті емге ... жатқызылады.
 @пункция жасау
 @физиотерапия
 @жылы ванналар
 @суспензорий қолдану
 @хорионды гонодотропинді қолдану
 ~Балаларда күйік бетінің мөлшерін анықтау үшін ... схемасы қолданылады.
 @Ланда-Броудер
 @Вейденфельд
 @Красовитов
 @Беркау
 @Постников
 ~Тері жамылғылары күйігінің I дәрежесіне ... тән.

ONTÜSTIK-QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Педиатрии-1 кафедрасы		
«Балалар хирургиясы» пәні бойынша оқу нәтижелерін қорытынды бағалауға арналған БӨҚ		044-38/19 76 беттің 16 беті

@гиперемия, ісіну, ауырсыну
 @көпіршіктердің пайда болуы
 @бозару, ісіну, түссіз сұйықтары бар көпіршіктер
 @гиперемия, ісіну, түссіз сұйықтары бар көпіршіктер
 @бозару, ісіну
 ~Тері жамылғылары күйігінің II-дәрежесіне...тән
 @гиперемия, көпіршіктердің пайда болуы
 @гиперемия,ісіну, ауырсыну
 @ет қабатының некрозы
 @дерманың некрозы
 @фасция мен сіңірлердің некрозға ұшырауы
 ~Тері жамылғылары күйігінің III-дәрежесіне ... тән.
 @терінің емізікше қабатымен қоса некрозы
 @гиперемия, ісіну, ауырсыну
 @гиперемия, көпіршіктердің пайда болуы
 @фасция мен сіңірлердің некрозға ұшырауы
 @сүйектің некрозға ұшырауы
 ~IV дәрежелі күйікке ... тән.
 @некроз, тіндердің қараюы
 @бозару, ісіну, ауырсыну
 @қызару, ісіну
 @қызару, ісіну, түссіз сұйықтықтары бар көпіршіктердің болуы
 @эпителийдің некроз
 ~Алғашқы медициналық көмек көрсеткен кезде күйік бетін ... емдейді.
 @стерильды таңумен
 @фурациллин майымен
 @бриллиант көгімен
 @спиртпен
 @маймен
 ~Сан сүйегі басының остеохондропатиясы ... деп аталады.
 @Легг-Кальве-Пертес ауруы
 @Келлер I ауруы
 @Келлер II ауруы
 @Осгут - Шлаттер ауруы
 @Кинбек ауруы
 ~Үлкен жіліншік сүйегінің бұдырлығының остеохондропатиясын ... ауруы
 деп атаймыз.
 @Осгуд-Шляттер
 @Кинбек
 @Шанца
 @Келлера II
 @Кинг
 ~Осгуд-Шляттер ауруының клиникасында ... байқалады.
 @үлкен жіліншік сүйегінің бұдыр аймағындағы ауырсыну
 @үлкен жіліншік сүйегінің бұдыр аймағындағы қызару
 @ауру аяғына ақсақтық
 @дене қызуының көтерілуі

ONTUSTIK-QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Педиатрии-1 кафедрасы		
«Балалар хирургиясы» пәні бойынша оқу нәтижелерін қорытынды бағалауға арналған БӨҚ		044-38/19 76 беттің 17 беті

@аяғының шаршауы

~Ладья тәрізді аяқ басы сүйегінің остехондропатиясын ... деп айтамыз.

@Келлер I ауруы

@Келлер II ауруы

@Морфан ауруы

@Шпренгель ауруы

@Лоренц ауруы

~Омыртқа эпифизінің остеохондропатиясын ... ауруы деп айтамыз.

@Кальве

@Шлиц

@Шайра-Май

@Дега

@Шинц

~Үсіге адамда терідегі көпіршіктер ... соң пайда болуы мүмкін.

@2-5 тәуліктен

@1 жылдан

@20-25 тәуліктен

@1-2 айдан кейін

@1- аптадан

~1,5 айлық баланың соңғы екі күннен бері сол аяғын жазып құндақтау кезінде мазасызданады.

Қарау кезінде сол аяғы ішке тартылған, өкшесі салбырайды. Белсенді қозғалыс жоқ. Жамбас-сан буындағы пассивті қозғалыс ауырсынулы. Дене қызуы 37,5С. Сіздің болжам диагнозыңыз:

@сан сүйегінің эпифизарлы остеомиелиті

@сол өкшенің соғылуы

@өкше сүйегінің сынығы

@сол сан сүйегінің сынығы

@оң санның флегмонасы

~1,5 айлық баланың соңғы екі күннен бері сол аяғын жазып құндақтау кезінде мазасызданатына шағымданып келді. Қарау кезінде сол аяғы ішке тартылған, өкшесі салбырайды. Белсенді қозғалыс жоқ. Жамбас-сан буындағы пассивті қозғалыс ауырсынулы. Дене қызуы 37,5С.

Жергілікті – буынның көлемі ұлғайған. Хирургтың амалы:

@буынды диагностикалық пункциясы

@антибактериальді ем тағайындау, бақылау

@буынды дренаждау

@остеоперфорация

@остеопункция және сүйек ішілік қысымды өлшеу

~1,5 айлық баланың соңғы екі күннен бері сол аяғын жазып құндақтау кезінде мазасызданатына шағымданып келді. Қарау кезінде сол аяғы ішке тартылған, өкшесі салбырайды. Белсенді қозғалыс жоқ. Жамбас-сан буындағы пассивті қозғалыс ауырсынулы. Дене қызуы 37,5 С.

Пункция кезінде ірің алынды. Иммобилизацияның ЕҢ тиімдісі:

@Шеде бойынша тарту немесе Виленскийдің жақтау құрылғыны қолдану

@санның жоғарғы үштен бір бөлігіне дейін гипсті лонгета салу

@санның жоғарғы үштен бір бөлігіне дейін циркулярлы гипсті лонгета салу

@еркін жүргекке орау

@гипсті жамбас – сан таңғышын салу

ONTÜSTIK-QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Педиатрии-1 кафедрасы		
«Балалар хирургиясы» пәні бойынша оқу нәтижелерін қорытынды бағалауға арналған БӨК		044-38/19 76 беттің 18 беті

~28 күндік баланың оң қолы дененің бойымен салбырап тұр және қозғалмайды. Киіндіру кезінде пассивті қозғалыс ауырсынулы. Объективті иық буын аймағында жұмсақ тіндердің ісінуі, жергілікті дене қызуының жоғарлауы байқалады. Сіздің болжам диагнозыңыз:

@оң иық сүйегінің эпифизарлы остеомиелиті

@оң иық флегмонасы

@қолтық асты лимфаденит

@оң иық сүйегінің сынуы

@оң иық буынының шығуы

~10 күндік Д деген баланы қабылдау бөліміне алып келді. Қарап тексергенде сол жақ жауырын аймағында үлкен қызарған ошақ анықталды. Ата-анасының айтуы бойынша баланың шағымы дене қызуының жоғарылауы, мазасыздық. Сіздің болжам диагнозыңыз:

@Нәрестелер флегмонасы

@Фурункул

@Карбункул

@Аллергиялық реакция

@Лимфаденит

~10 күндік Д деген баланы қабылдау бөліміне алып келді. Қарап тексергенде сол жақ жауырын аймағында үлкен қызарған ошақ анықталды. Ата-анасының айтуы бойынша баланың шағымы дене қызуының жоғарылауы, мазасыздық. Сіздің амалыңыз:

@сау теріні қоса тілік жасау

@крест тәрізді тілік жасау

@ашу және дренирлеу

@физиом

@ерте некрэктомия

~6 жастағы Т деген бала ауруханаға ауруы басталғаннан кейін 3 – ші тәулікте келіп қаралды. Шағымдары дене қызуының жоғарылауы, бас ауруы, жауырын аймағындағы ауру сезімі. Қарау кезінде ісік тәрізді түзіліс, қызарған эрозирленген бетімен, жергілікті гиперемия, сонымен қатар бірнеше жыланкөздерден ірінді бөлініс шығып тұр. Қан сынамасында эр-3,5, Нв-125 г/л, ЭТЖ-18 мм/сағ. Оперативті емнің көлемін көрсетіңіз:

@крест тәрізді кесу

@шахмат тәрізді тіліктер жасау

@сызықты тілік жасау

@жабық дренаж салу

@гипертоникалық таңу салу

~14 жастағы П деген бала ауруханаға ауруы басталғаннан кейін 1 тәуліктен соң келді.

Шағымдары оң жақ жамбас бөлігіндегі ауру сезімі, гипертермия, гиперемия, жайылмалы ісінудің болуы, ортасында флюктуация анықталады. Қан сынамасында эр-3,5, Нв-125 г/л, лейкоц-15,2, ЭТЖ-10 мм/сағ. Сіздің болжам диагнозыңыз:

@Флегмона

@Фурункул

@Инфицирленген жара

@Парапроктит

@Кабункул

~6 айлық баланың ауырғанына 8 сағат уақыт болған. Баланың анасы баласының кенеттен мазасызданып, тамақ ішуден бас тартқанын айтты. Бұған дейін үлкен дәреті қалыпты болған. Ректалді саусақпен тексеру кезінде «малина тәрізді желе» бөлінді анықталады. Ішек инвагинациясына күмәндалды. Аталған іс-шаралардың ЕН тиімдісі:

ONTÜSTIK-QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Педиатрии-1 кафедрасы		
«Балалар хирургиясы» пәні бойынша оқу нәтижелерін қорытынды бағалауға арналған БӨҚ		044-38/19 76 беттің 19 беті

@пневмокомпрессия жүргізу

@операциялық ем

@экранда баридің жайылуы

@тазалау клизмасы

@лапароскопия

~6 айлық баланың ауырғанына 8 сағат уақыт болған. Баланың анасы баласының кенеттен мазасызданып, тамақ ішуден бас тартқанын айтты. Бұған дейін үлкен дәреті қалыпты болған. Ректалді тексеру кезінде «малина тәрізді желе» бөлінді анықталады. Сіздің болжам диагнозыңыз:

@ішек инвагинациясы

@дизентерия

@копростаз

@геморрагиялық васкулит

@тік ішектің полипі

~Қабылдау бөліміне ауру басталғанына бір тәулікттей болған жедел аппендицит диагнозымен 2 жасар бала жеткізілді. Ауру дене қызуының 38,6°С-қа дейін күрт көтерілуімен, түшкірумен, жөтелмен басталған. Айқын ентікпе. Тынысы қатқыл, жекеленген ылғалды сырылдар естіледі. Тілі ылғалды. Пульсі 106 рет/мин. Бала қарауға қарсылық білдіреді, жылайды, ішін тартады. Тексеру әдісі жіті аппендицитті РАСТАЙДЫ немесе ЖОҚҚА шығарады:

@ұйқы кезінде ішті пальпациялау

@қанның жалпы анализі

@іш қуыс органдарының кең көлемді рентгенографиясы

@күрсақ қуысының УДЗ-і

@тік ішекті саусақпен тексеру

~14 күндік балада соңғы 2 тәулік бойы үлкен дәреті болмады. Іші кепкен, бала нашар тамақтанады, лоқсиды. Ата-анасы тазалау клизмасын жасай алмаған, себебі анальді тесігін таппаған. Қызды қарау кезінде сыртқы жыныс органдары дұрыс қалыптасқан. Бұт аралығы нәжіспен бұлғанған. Диагнозды анықтау үшін іс-әрекеті:

@жыланкөз арқылы ирригография жасау

@фиброгастроскопия

@флюорография

@фиброколоноскопия

@томография

~7 жасар балада күшті ұстамалы іш ауырсынуы, өт араласқан қайталамалы құсу болған. Үлкен дәреті 2 тәуліктен бері жоқ. Анамнезінде 3 жасында «аппендэктомия» жасалған. Сіздің болжам диагнозыңыз:

@жабысқақ ауруы

@ішек бұралуы

@копростаз

@ішек атониясы

@гастрит

~7 жасар балада күшті ұстамалы іш ауырсынуы, өт араласқан қайталамалы құсу болған. Үлкен дәреті 2 тәуліктен бері жоқ. Анамнезінде 3 жасында «аппендэктомия» жасалған. Жабыспалы ішек өткізбеушілікке күмәндалды. Хирургтың амалы:

@дайындықтан кейін шұғыл операция жасау

@жоспарлы түрде операция жасау

@консервативті емін жалғастыру

@фиброколоноскопияны өткізу

ONTÜSTIK-QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Педиатрии-1 кафедрасы		
«Балалар хирургиясы» пәні бойынша оқу нәтижелерін қорытынды бағалауға арналған БӨҚ		044-38/19 76 беттің 20 беті

@динамикалық бақылау

~Соматикалық бөлімшеде екі жақты пневмониямен ауырған 2 жасар бала жатыр. Жүргізіліп жатқан емге қарамастан, оның іші кебулі, ұлғаюда, өт араласқан құсық, ентікпе пайда болған. 1,5 тәуліктен бері үлкен дәреті болмаған. Қарағанда іші кепкен, пальпацияда жұмсақ. Ішек перистальтикасы төмендеген. Сіздің болжам диагнозыңыз:

@динамикалық ішек өткізбеушілігі

@странгуляциялық ішек өткізбеушілігі

@обтурациялық ішек өткізбеушілігі

@туя пайда болған ішек өткізбеушілігі

@аралас ішек өткізбеушілігі

~Соматикалық бөлімшеде екі жақты пневмониямен ауырған 2 жасар бала жатыр. Жүргізіліп жатқан емге қарамастан, оның іші кебулі, ұлғаюда, өт араласқан құсық, ентікпе пайда болған. 1,5 тәуліктен бері үлкен дәреті болмаған. Қарағанда іші кепкен, пальпацияда жұмсақ. Ішек перистальтикасы төмендеген. Динамикалық ішек өткізбеушілігіне күмәндалды. Хирургтың амалы:

@консервативті ем

@шұғыл операция жасау

@консервативті емінен кейін операция жасау

@бақылау

@бақылаудан кейін операция жасау

~6 жасар баланы қарағанда іш қатуға бейімділігі және соңғы 2 күннен бері дефекация актісі кезінде ал қызыл қан араласқан бөлінді байқалды. Сіздің болжам диагнозыңыз:

@тік ішек полипі

@тік ішек ісігі

@ішек туберкулезі

@дизентерия

@ішек инвагинациясы

~6 жасар баланы қарағанда іш қатуға бейімділігі және соңғы 2 күннен бері дефекация актісі кезінде ал қызыл қан араласқан бөлінді байқалды. Полипке күмәндалды. Хирургтың амалы:

@полипті алып тастау

@криодеструкция

@рентгенотерапия

@гормональді терапия

@химиотерапия

~Ауруханаға 8 жастағы ұл бала түсті. Шағымдары – оң жақ бел аймағында керіп ауырсыну, кіші дәретке жиі шыққысы келу. Бала биіктен арқасына құлаған. Терісі бозғылт. Тамыр соғысы 120 рет минутына. АҚ-80/60 мм сын.бағ. іші жұмсақ, іш астарының тітіркену белгісі теріс, оң жақ бел аймағында үлкен ісіну анықталады. Қан анализінде – Нв -120 г/л, эритроциттер 3,2, зәр анализінде – эритроциттер -50-60 көру аймағында. Сіздің болжам диагнозыңыз:

@оң жақ бүйректің жабық жаракаты

@құрсақтың жабық жаракаты

@оң жақ 12 - қабырғаның жабық сынуы

@оң жақ бел аймағының урогематомасы

@оң жақ бел аймағының жұмсақ тіндерінің соғылуы

~Ауруханаға 8 жастағы ұл бала түсті. Шағымдары - оң жақ бел аймағында керіп ауырсыну, жиі жалған дәрет шығарғысы келу. Бала 6 сағат бұрын 2 м биіктен арқасына құлаған. Терісі бозғылт. Тамыр соғысы 120 рет минутына. АҚ-80/50 мм сын.бағ. Іші жұмсақ, іш астарының тітіркену

ONTÜSTIK-QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Педиатрии-1 кафедрасы		
«Балалар хирургиясы» пәні бойынша оқу нәтижелерін қорытынды бағалауға арналған БӨК		044-38/19 76 беттің 21 беті

белгісі теріс, оң жақ бел аймағында үлкен ісіну анықталады. Қан анализінде - Нв -120 г/л, эритроциттер 3,2, зәр анализінде – эритроциттер -50-60 көру аймағында. Шұғыл түрде зерттеу әдістерін ЕН тиімдісі:

- @бүйректі УДЗ
- @лапароскопия
- @ретроградты пиелография
- @экскреторлы урография
- @бауыр ангиографиясы

~Науқас 7 жаста. Ауырғанына 1 тәулік өтті. Ауру кенеттен, эпигастрий аймағында басталып, кейіннен іштің оң жақ жартысына ауысты. Дене температурасы 38С, тахикардия. Іші кеппеген, тыныс алу актіне қатысады, барлық бөлімдерінде жұмсақ және терең пальпация жүргізгенде сәл ауырсыну анықталады, ішастарының тітіркену симптомы күмәнді. Сіздің болжам диагнозыңыз:

- @жедел аппендицит
- @асқазан мен 12 елі ішектің ойық жара ауруы
- @жедел панкреатит
- @жедел гастрит
- @жедел дивертикулит

~11 жастағы қыз бала. Іштің төменгі жағында, қасағаның оң жағында қатты ауырсыну. Ауырсыну оң жақ жыныс ернеуіне және тік ішекке иррадиацияланады. Балада зәр жиі, ауырсынумен және нәжіс шырыш пен қан араласып шығады. Ректальды тексеру кезінде оң жақтан инфильтрат және ауырсыну анықталады. Сіздің диагнозыңыз:

- @жамбастық аппендицит
- @ішек инвагинациясы
- @цистит
- @дизентерия
- @оң жақ аналық бездің кистасы

~Науқас 12 жаста. Іште ауырсыну, құсу, гектикалық температура. Жағдайы ауыр. Іштің оң жағының шығыңқы болуынан іштің асимметриясы көрінеді. Пальпация кезінде қатты ауырсынатын және флюктуациямен түзіліс анықталады. Щеткин-Блюмберг симптомы оң. Қан анализінде жоғары лейкоцитоз, қан формуласының солға жылжуы. Диагноз бен хирургтың амалы:

- @аппендикулярлық абсцесс, абсцесті ашу
- @ішек инвагинациясы, лапаротомия
- @аппендикулярлық инфильтрат, консервативтік ем
- @іш қуысының ісігі, ісікті кесіп алу
- @мезаденит, консервативтік ем

~10 жастағы балада ішінің қатты ауырсынуы, жүрек айнуы, құсу анықталды. Анамнезінде – мұрнына қан кету. Ішін пальпациялағанда іштің оң жақ жартысында ауырсыну және осы жақтағы бұлшық еттердің сәл қатаюы анықталады. Қан аралас нәжіс болған. Диагноз және дәрігердің амалы:

- @шенлейн-Генх ауруы, гормондар тағайындау
- @ішек полиппі, полипэктомия
- @жедел аппендицит, аппендэктомия
- @жедел дивертикулит, дивертикулэктомия
- @ішек инвагинациясы, дезинвагинация

~Хирургиялық стационарға 14 жасар бала келіп түсті. Анамнезінде бір апта бойы эпигастрий аймағында ауру сезім жіне кекіру мазалаған. Түсерге дейін екі сағат бұрын ішінде қатты ауру

ONTÜSTIK-QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Педиатрии-1 кафедрасы		
«Балалар хирургиясы» пәні бойынша оқу нәтижелерін қорытынды бағалауға арналған БӨК		044-38/19 76 беттің 22 беті

сезім, тамақпен құсық пайда болды. Баланың жағдайы ауыр. Бала сол жық қырында аяғын ішіне тартып жатыр. Тілі құрғақ, ақ жабындымен жабылған. Іші тыныс алу актісіне қатысады, ауру сезімді, ішперде тітіркену симптомы оң. Пульсі 120 рет минутына. Т – 37,5⁰С. Сіздің болжам диагнозыңыз:

@асқазан жарасының тесілуі

@улану

@жедел холецистит

@жедел гастрит

@жедел панкреатит

~Бала бір жаста Оң жақ қолының қозғалысы шектелген. Қарап тексергенде ауру сезімді, оң жақ бұғанасында жергілікті ісік байқалады. Қолданылатын таңуының түрі:

@Дезо таңуы

@кокситті-гипстік таңу

@сегіз тәрізді гипстік таңу

@кузьминский-карпенко таңуы

@жергілікті анестезиямен жабық репозиция

~Туғаннан бір сағаттан кейін нәрестеде өтпен көп мөлшерде құсу байқалды. Емізгеннен кейін құсуы қайталаңады. Адинамия, эксикоз байқалуда, 256г салмақ жоғалтты. Іші жұмсақ, эпигастрии аймағы кепкен, құсқаннан кейін кішірейеді. Ішінің төменгі бөлігі төмен түскен.

Жалпы рентгенде құрсақ қуысында екі горизонтальды сұйықтық деңгейі байқалады, ішектерде газ жоқ. Сіздің болжам диагнозыңыз:

@фатер емізікшесінен төмен ұлтабар атрезиясы

@Гиршпрунг ауруы

@пилоростеноз

@сигма тәрізді ішек атрезиясы

@Фатер емізікшесінен жоғары ұлтабар атрезиясы

~6 айлық қыз баланы қарап тексергенде оң жақ шап аймағында ауру сезімді жарықты түзіліс байқалды. Аурудың басталғанына 45 минут болған. Аталған іс-шаралардың тиімдісі:

@жарықты кесу жедел операциясы

@жарықты орнына келтіру

@жарықты жоспарлы кесу

@диспансерлі графикпен герниотомия

@диагностикалық лапароскопия

~Қабылдау бөлімшесіне бір жасар бала келіп түсті. Анасының айтуы бойынша бала туғаннан бастап іш қатумен ауырады, іші ұлғайған. Тазалау клизмалары әсерсіз. Аталған іс-шаралардың тиімдісі:

@ирригография

@құрсақ қуысының шолу рентгені

@жіңішке ішек қабырғасының биопсиясы

@құрсақ қуысының УДЗ

@копрограмма

~1айлық бала анасының айтуы бойынша мазасыз және фонтан сияқты құсады. Қарап тексергенде эпигастрии аймағы кепкен. Пальпация жасағанда құм сағат симптомв оң, және асқазанның пилорусты аймағы тығыздылған. Сіздің болжам диагнозыңыз:

@пилоростеноз

@пилороспазм

@адреногенитальды синдром

ONTÜSTIK-QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Педиатрии-1 кафедрасы		
«Балалар хирургиясы» пәні бойынша оқу нәтижелерін қорытынды бағалауға арналған БӨК		044-38/19 76 беттің 23 беті

@Дебре-Фибигера синдромы

@ұлтабар стенозы

~1,5 айлық бала анасының айтуы бойынша мазасыз және фонтан сияқты құсады. Қарап тексергенде эпигастрии аймағы кепкен. Пальпация жасағанда құм сағат симптом оң, және асқазанның пилорусты аймағы тығыздылған. Аталған іс-шаралардың тиімдісі:

@Фред-Рамштед операциясы

@консервативті ем

@Росс отасы

@Винкельман отасы

@Коэн отасы

~Бала 3 жаста, әлсіздікке, жиі құсып жіберуге, туған мезеттен бастап өздігінен дәрет болмауына, тек клизмадан кейін шағымданады. Қарап тексергенде іш көлемі ұлғайған. Алдыңғы құрсақ қабырғасына басқанда саусақ іздері қалады «саз» симптомы. Сіздің болжам диагнозыңыз:

@Гиршпрунг ауруы

@аноректальді ақаулар

@долихосигма

@созылмалы іш қатулар

@ішек өтімсіздігі

~4 жастағы қызда пальпация кезінде жайылған ауырсынғыштық пен алдыңғы құрсақ қабырғасы бұлшықеттерінің кернелуі құрсақ қуысының барлық бөлімдерінде анықталады. Перитонизм симптомдары іштің төменгі бөліктерінде айқын, Щёткин – Блюмберг симптомы оң. Сыртқы урогениталийлердің гиперемиясы байқалады. Сіздің болжам диагнозыңыз:

@пельвиоперитонит

@жедел аппендицит

@аналықбездер кистасының айналып кетуі

@аппендикулярлы инфильтрат

@аппендикулярлы перитонит

~Профилактикалық тексеруде балада балабақшада кіндік сақинасы аймағында томпаю анықталды. Ол тыныш жағдайда жоғалады, бірақ күшенгенде және айқайлағанда пайда болады. Кіндік сақинасы өлшемдері ұлғайған. Керекті зерттеу жоспарын тандаңыз:

@кіндік сақинасын қарау мен пальпациясы

@ортостатикалық сынамалар

@құрсақ қуысы ағзаларының УДЗ

@ұманы қарау мен пальпациясы

@доплерография

~Тексеруде балада балабақшада кіндік сақинасы аймағында томпаю анықталды. Ол тыныш жағдайда жоғалады, бірақ күшенгенде және айқайлағанда пайда болады. Кіндік сақинасы өлшемдері ұлғайған. Сіздің болжам диагнозыңыз:

@кіндік жарығы

@шап жарығы

@кіндік бауының жарығы

@іштің ақ сызығының жарығы

@вентральді жарығы

~2 айлық бала анасының айтуынша «фонтан» сияқты құсады, қарап тексергенде эпигастрии аймағы кепкен. Пальпация кезінде «құм сағат» симптомы оң. Аталған іс-шаралардың тиімдісі:

@УДЗ

@ФГДС

ONTÜSTIK-QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Педиатрии-1 кафедрасы		
«Балалар хирургиясы» пәні бойынша оқу нәтижелерін қорытынды бағалауға арналған БӨҚ		044-38/19 76 беттің 24 беті

@MPT

@Колоноскопия

@КТ

~2 жасар баланың анасы баласының оң қолымен қозғалмайтынына және денесінің бойында салбырап тұратынына, пассивті қозғалыстар аурусына шағымданып келді. Жоғарғы айтылған шағымдар баланы киіндергенде анықталған. Сіздің болжам диагнозыңыз:

@оң кәрі жіліктің басының шығуы

@иық сүйегінің жедел гематогенді остеомиелиті

@оң иық сүйегінің т/3 бөлігінің жабық сынығы

@оң бұғананың о/3 бөлігінің жабық сынығы

@ревматоидты артрит

~Қабылдау бөлімшесіне 7 күндік бала келіп түседі. Өлсіз. Терісі бозғылт, акроцианоз. Тынысы жиі, беткей. Жүрек тондары тұйық. Ішінің қатты кепкені және ауру сезімділігі көңіл аудартады. Тері асты вена торы кеңейген. Перистальтикасы естілмейді. Перкуторлы - бауыр тұйықтығы жоқ. Сіздің болжам диагнозыңыз:

@перитонит

@жедел панкреатит

@жедел аппендицит

@ОНМК

@күрсак қуысының ісігі

~Қабылдау бөлімшесіне 7 күндік бала келіп түседі. Өлсіз. Терісі бозғылт, акроцианоз. Тынысы жиі, беткей. Жүрек тондары тұйық. Ішінің қатты кепкені және ауру сезімділігі көңіл аудартады. Тері асты вена торы кеңейген. Перистальтикасы естілмейді. Перкуторлы - бауыр тұйықтығы жоқ. Диагнозды дәлелдеу үшін жасау қажет:

@күрсак қуысының шолу рентгені

@диагностикалық лапароскопия

@кеуде қуысының шолу рентгені

@ирригография

@ештенке жасамаймыз

~Қабылдау бөлімшесіне 7 күндік бала келіп түседі. Өлсіз. Терісі бозғылт, акроцианоз. Тынысы жиі, беткей. Жүрек тондары тұйық. Ішінің қатты кепкені және ауру сезімділігі көңіл аудартады. Тері асты вена торы кеңейген. Перистальтикасы естілмейді. Перкуторлы- бауыр тұйықтығы жоқ. Хирургтың амалы:

@2-3 сағат дайындықпен жедел операция

@1сағат аралығынад жедел операция

@5сағаттық ота аолдыңғы дайындықтан кейін жедел операция

@бір тәулік баланы реанимацияда консервативті ем жүргізу керек

@күту амалы

~10 жастағы қыз балада гектикалық температура, жиі шырышты нәжіс пен тенезм, зәр шығару ауырсынумен, ректальды зерттегенде тік ішегінен алды қарай ісік тәрізді түзіліс анықталды.

Хирургтың амалы:

@шұғыл лапаротомия, балада Дуглас-абсцессі

@шұғыл лапаротомия, балада аналық бездің апоплексиясы

@шұғыл лапаротомия, балада аппендикулярлы инфильтрат жеделдеу формасы

@шұғыл лапаротомия, балада аппендикулярлы инфильтрат лизис сатысында

@шұғыл лапаротомия, балада жаралы-перфоративті энтероколит

~2 айлық бала ауырғаннан соң 16 сағаттан кейін келіп түсті. Анасының айтуынша, баланың

ONTÜSTIK-QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Педиатрии-1 кафедрасы		
«Балалар хирургиясы» пәні бойынша оқу нәтижелерін қорытынды бағалауға арналған БӨҚ		044-38/19 76 беттің 25 беті

шағымдары мазасыздыққа, оң жақ шап аймағындағы ісік тәрізді түзіліс. Баланың жалпы жағдайы орташа ауырлықта. Дене қызуы қалыпты. Жергілікті қарау кезінде оң жақ шап аймағында ұрық бауы бойымен ұмаға түсетін, көлемі 1.0x1.5 см болатын, пальпацияда қатты ауырсынатын, қатты эластикалық құрылымды және құрсақ қуысына енбейтін ісік тәрізді түзіліс анықталады. Сіздің болжам диагнозыңыз:

- @қысылған шап жарығы оң жақтан
- @ұрық бауының жедел дамыған шемені оң жақтан
- @байланысқан ұрық бауының қысылған шемені оң жақтан
- @ұрық бауының айналуы жақтан
- @шап лимфадениті оң жақтан

~Перзентханадан салмағы 2600 гр болатын жаңа туған сәби жедел түрде жеткізілді. Бала өте мазасыз және аузынан көпіршікті бөлініс шығады, сонымен қатар цианоз ұстамалары да байқалады. Өңештің рентген суретінде өңештің жоғарғы сегменті тұйық бітеді, әрі асқазан мен ішектерде газдар анықталады. Сіздің болжам диагнозыңыз:

- @өңеш атрезиясы
- @12-елі ішек атрезиясы
- @ашы ішек атрезиясы
- @тік ішек атрезиясы
- @анус атрезиясы

~2 күндік жаңа туған нәресте. Жағдайы ауыр. Мұрын-ерін үшбұрышының көгеруі, ентігу, өт аралас құсық. Қарағанда кеуде клеткасының ассиметриясы, сол жақ кеуде клеткасының ісінуі. Тынысы әлсіреген ішек шулары естіледі, перкуторлы тынықталған. Іші түскен, ладья тәрізді. Сіздің болжам диагнозыңыз:

- @жалған көкеттік жарық
- @өкпе секвестрациясы
- @туа болған кеңірдекөңештік жыланкөз
- @өңеш атрезиясы
- @шынайы көкеттік жарық

~Нәрестенің кіндігі түскен соң бірінші күні кіндігінен ішек құрамының бөлінуі байқалады. Кіндігі инфильтарцияланған, гиперемияланған. Баланың салмақ қосуы нашар, арықтауда, физикалық дамуы қалыс. Жалпы жағдайы күн сайын нашарлауда. Сіздің болжам диагнозыңыз:

- @кіндіктің толық жарығы
- @кіндік жарығы
- @кіндік шылбырының жарығы
- @Меккелев дивертикулі
- @флегмонозды омфалит

~Бала 9 жаста. Хирургия бөлімінде сол жақ балтырдың жедел гематогенді остеомиелиті бойынша ем қабылдаған. 2 айдан кейін сол жақ балтырдың ортаңғы 1/3 бөлігінде патологиялық қозғалыс, деформация анықталады. Емдеу барысында асқынуының түрі:

- @патологиялық сынық және жалған буынның түзілуі
- @анкилоз және санның қысқаруы
- @анкилоз және жалған буынның түзілуі
- @санның шығуы және жалған буынның түзілуі
- @артроз және санның қысқаруы

~Ата-анасы баласының ұмада аталық безінің жоқ екеніне шағымданды. Бала 2 жаста. Қарау кезінде сыртқы жыныс мүшесі дұрыс дамыған, бірақ ұмада аталық без анықталмады.

ONTÜSTIK-QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Педиатрии-1 кафедрасы		
«Балалар хирургиясы» пәні бойынша оқу нәтижелерін қорытынды бағалауға арналған БӨК		044-38/19 76 беттің 26 беті

Кремастерлік рефлекс сақталған. Екі аталық безде де сыртқы шап сақинасында пальпацияланады және түсуі тез. Ең тиімді болжам диагнозыңыз:

- @жалған крипторхизм
- @орхоэпидимит
- @анорхизм
- @монорхизм
- @аталық безінің эктопиясы

~Ата-анасы баласының ұмада аталық безінің жоқ екеніне шағымданды. Бала 2 жаста. Қарау кезінде сыртқы жыныс мүшесі дұрыс дамыған, бірақ ұмада аталық без анықталмады.

Кремастерлік рефлекс сақталған. Екі аталық безде де сыртқы шап сақинасында пальпацияланады және түсуі тез. «Жалған крипторхизм»-ге күмандану. Ең тиімді тәсіл:

- @бақылау
- @гормоналды ем
- @операция
- @физиопроцедура
- @шап аймағының массажи

~11 жасар бала сол жақ ұманың үлкеюіне және ауырсынуына шағымданады. Қарау кезінде және пальпацияда сол жақ ұма қан тамырлары «жүзім өрімі» тәрізді үлкейген. Күшейген кезде толып үлкейеді. Аталық бездері ұмада орналасқан. Ең тиімді болжам диагнозыңыз:

- @варикоцеле
- @аталық безінің инфаркты
- @орхоэпидимит
- @крипторхизм
- @аталық безінің шемені

~11 жасар бала сол жақ ұманың үлкеюіне және ауырсынуына шағымданады. Қарау кезінде және пальпацияда сол жақ ұма қан тамырлары «жүзім өрімі» тәрізді үлкейген. Күшенген кезде толып үлкейеді. Аталық бездері ұмада орналасқан. «Сол жақ варикоцеле» - деген диагноз қойылды. Ең тиімді қолданатын хирургиялық бару жолы:

- @сол жақ мықын аймағын қиғаш кесу
- @параректалді кесу
- @мықын сүйегінің алдыңғы-жоғарғы осінің деңгейінде көлденең кесу
- @ұма арқылы бару жолы
- @шап аймағын қиғаш кесу

~11 жасар бала сол жақ ұманың үлкеюіне және ауырсынуына шағымданады. Қарау кезінде және пальпацияда сол жақ ұма қан тамырлары «жүзім өрімі» тәрізді үлкейген. Күшенген кезде толып үлкейеді. Аталық бездері ұмада орналасқан. «Варикоцеле» - деген диагноз қойылды. Хирург амалының Ең тиімдісі:

- @Иванисевич - Ерохин операциясы
- @динамикалық бақылау
- @консервативті терапия
- @склерозирлеуші терапия
- @веналы тестикулосафенді анастомоз

~Ұл баланың туылғанынан бастап үрпінің ажырауы байқалған. Бала күшеніп жіңішке үзік-үзік дәрет алады. Уретраның сыртқы тесігі тәж тәрізді жылға аймағында орналасқан нүктесі. Сіздің болжам диагнозыңыз:

- @гипоспадия
- @куықтың экстрофиясы

ONTÜSTIK-QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Педиатрии-1 кафедрасы		
«Балалар хирургиясы» пәні бойынша оқу нәтижелерін қорытынды бағалауға арналған БӨҚ		044-38/19 76 беттің 27 беті

@эписпадия

@уретра атрезиясы

@уретра гипоплазиясы

~Ұл баланың туылғанынан бастап үрпінің ажырауы байқалған. Бала күшеніп жіңішке үзік-үзік дәрет алады. Уретраның сыртқы тесігі тәж тәрізді жылға аймағында орналасқан нүктесі.

«Гипоспадия» - деген диагноз қойылды.Ең тиімді хирург амалы:

@меатотомия

@эндоскопиялық электрорезекция жасау

@уретраның V-тәрізді пластикасы

@бужирлеу

@жергілікті тіндермен уретра қабырғасына пластика жасау

~4 айлық баланың туылғанынан ұмасының сол жағы үлкейген. Пальпацияда ісік тәрізді жұмсақ, контуры анық ауырсынусыз, мөлшері 5 x 3,5 см іш қуысына енбейтін түзіліс байқалады. Кешке қарай түзіліс мөлшері үлкейеді. Сыртқы шап сақинасы ұлғаймаған. Сіздің болжам диагнозыңыз:

@құрсақ қуыспен байланысқан аталық без су шемені

@крипторхизм

@ұрық бауының кистасы

@аталық без қабығы су шемені

@аталық без эктопиясы

~4 айлық баланың туылғанынан ұмасының сол жағы үлкейген. Пальпацияда ісік тәрізді жұмсақ, контуры анық ауырсынусыз, мөлшері 3 x 1,5 см іш қуысына енбейтін түзіліс байқалады. Кешке қарай түзіліс мөлшері үлкейеді. Сыртқы шап сақинасы ұлғаймаған. «Құрсақ қуыспен байланысқан аталық без су шемені» деген диагноз қойылған.Ең тиімді тактика:

@динамикада бақылау

@жоспарлы түрде оперативті емдеу

@сұйықтықты сыртқа шығарып пункция жасау

@гидрокортизонды енгізіп пункция жасау

@гормоналды дәрілерді тағайындау

~3 айлық қыз баланың кіндік сақинасында жұмсақ консистенциялы мөлшері 1,5x1,5 см іш қуысына оңай енетін, ауырсынусыз түзіліс байқалады. «Кіндік жарығы» - деген диагноз қойылды. Сіздің болжам диагнозыңыз:

@кіндік жарығы

@іштің ақ сызығы жарығы

@кіндік бауының жарығы

@жай омфалит

@флегмонозды омфалит

~3 айлық қыз баланың кіндік сақинасында жұмсақ консистенциялы мөлшері 1,5x1,5 см іш қуысына оңай енетін, ауырсынусыз түзіліс байқалады.Ең тиімді тактика:

@жабысқыш пластырь, массаж

@жоспарлы түрде оперативті емдеу

@склероздеуші терапия

@шұғыл түрде оперативті емдеу

@гормоналды дәрілерді тағайындау

~Профилактикалық қарау кезінде 6 жасар қыз баланың кіндік сақинасынан 3 см жоғары ортаңғы сызық бойында мөлшері 0,5 x 0,5 см, іш қуысына оңай енетін, ауырсынусыз түзіліс байқалған. Ортаңғы сызық бойында мөлшері 0,5 x 0,5 см апоневроз дефекті анықталады.Сіздің болжам диагнозыңыз:

ОҢТҮСТІК-ҚАЗАҚСТАН MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Педиатрии-1 кафедрасы		
«Балалар хирургиясы» пәні бойынша оқу нәтижелерін қорытынды бағалауға арналған БӨҚ		044-38/19 76 беттің 28 беті

@іштің ақ сызығы жарығы

@кіндік жарығы

@кіндік бауының жарығы

@жай омфалит

@флегмонозды омфалит

~Профилактикалық қарау кезінде 6 жасар қыз баланың кіндік сақинасынан 3 см жоғары ортаңғы сызық бойында мөлшері 0,5 x 0,5 см, іш қуысына оңай енетін, ауырсынусыз түзіліс байқалған.

Ортаңғы сызық бойында мөлшері 0,5 x 0,5 см апоневроз дефекті анықталады. «Іштің ақ сызығы жарығы» - деген диагноз қойылды. Сіздің болжам диагнозыңыз:

@жоспарлы түрде оперативті емдеу

@жабысқыш пластырь, массаж

@склероздаушы терапия

@шұғыл түрде оперативті емдеу

@медикаментозды емдеу

~1 айлық ұл баланың туылғанынан бастап оң жақ ұмада ісік тәрізді түзіліс анықталады пальпацияда жұмсақ-эластикалық консистенциялы, ауырсынусыз іш қуысына кіріп кетеді, бірақ бала мазасызданғанда қайтадан шығады. Оң жақ шап сақинасы кеңейген. Сіздің болжам диагнозыңыз:

@шап-ұма жарығы

@орнына түспейтін шап жарығы

@қысылған шап жарығы

@шап лимфадениті

@аталық без қабының шемені

~1 айлық ұл баланың туылғанынан бастап оң жақ ұмада ісік тәрізді түзіліс анықталады, пальпацияда жұмсақ-эластикалық консистенциялы, ауырсынусыз, іш қуысына кіріп кетеді, бірақ бала мазасызданғанда қайтадан шығады. Оң жақ шап сақинасы кеңейген. Сіздің дұрыс амалыңыз:

@жоспарлы түрде оперативті емдеу

@динамикада бақылау

@шұғыл операция

@ЛФК, массаж

@антибактериальды терапия

~1 айлық нәрестеде құрсақ ішілік жүктіліктің 32 аптасында УДЗ соң ұрықтың екі бүйрегін мөлшері 14 мм, екені анықталды, тостағанша-астауша жүйесі кеңейген. Туылған соң осы диагноз дәлелденген. Зәр анализі қалыпты. Сіздің болжам диагнозыңыз:

@гидронефроз

@Вильмс ісігі

@бүйректің солитарлы кистасы

@пиелонефрит

@шажырқай кистасы

~Бір айлық нәрестеде құрсақ ішілік жүктіліктің 32 аптасында УДЗ диагностикасында ұрықтың екі бүйрегін мөлшері 14 мм, екені анықталды, тостағанша-астауша жүйесі кеңейген. Зәр анализі қалыпты. Диагнозды нақтылау үшін зерттеудің Ең тиімдісі:

@инфузионды урография

@антеградты пиелография

@цистоскопия

@лабораторлы зерттеу

@цистография

ONTÜSTIK-QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Педиатрии-1 кафедрасы		
«Балалар хирургиясы» пәні бойынша оқу нәтижелерін қорытынды бағалауға арналған БӨК		044-38/19 76 беттің 29 беті

~2,5 жасар қыз бала 5 айлығынан бастап қайталанушы пиелонефритпен емделген. Эскреторлы урографияда екі жақты тостағанша-астауша жүйесі мен несепар кеңейген. Сіздің болжам диагнозыңыз:

@екі жақты уретрогидронефроз

@екі бүйректің поликистозы

@екі жақты пиелонефрит

@Вильмс ісігі

@екі бүйректің гидрокаликозы

~2,5 жасар қыз бала 5 айлығынан бастап қайталанушы пиелонефритпен емделген. УДЗ-да екі жақты тостағанша – астауша жүйесі мен несепар кеңейген. Диагнозды дәлелдеу үшін зерттеу жүргізген ЕҢ тиімдісі:

@инфузионды урография

@ангиография

@ауқымды рентгенография

@цистография

@ретроградты пиелография

~Созылмалы пиелонефритпен ауыратын 6 айлық балаға цистография жасалынды, сіз несепардың кеңейгені мен астаушаның екі жақты ұлғайғанын анықтадыңыз. Балаға «IV-V дәреже қуық-несепар рефлюксі, уретрогидронефроз» диагнозы қойылды. Емдеудің ЕҢ тиімді амалы:

@операциялық

@консервативті

@динамикада бақылау

@физио ем

@бүйректі дренаждау

~6 жастағы қыз бала құрсақтың оң жағындағы үнемі болатын ауырсынуға шағымданады. 2 жыл бойы пиурия анықталған. Жалпы жағдайы қанағаттанарлық. Физикалық тексеру кезінде патология анықталған жоқ. Зәр анализінде - белок, лейкоцитурия. Цистоскопия кезінде патология анықталған жоқ. Эскреторлы урографияда оң жақ астауша мен тостағаншалардың біршама кеңуі, астауша - несепар сегментінің тарылуы бар. Емдеудің ЕҢ тиімді амалы:

@астауша-несепар сегментінің пластикасы

@консервативтік ем

@антибактериальдық ем

@уростатиктер тағайындау

@нефрэктомия

~Жаңа туылған нәрестені перзентханада қарап тексергенде уретраның дорсальды қабатының қысылуы түрінде сыртқы урегитальды қысылуы байқалады. Ұшы қалыңдаған, уретраның сыртқы тесігінің басының ойығының ығысуы байқалады. Зәр шығаруы еркін. Жүктілік токсикозбен өткен. ЕҢ тиімді болжам диагнозыңыз:

@эписпадия

@гермофродитизм

@гипоспадия, бағаналық түрі

@гипоспадия, аралық түрі

@қуықтың экстрофиясы

~4 жастағы баланы қарау кезінде әкуінің басының көгеруі мен ісінуі анықталады, әкуінің басы толық жабылмайды. Зәр шығаруы қиындаған және ауру сезімімен, өздігінен кіші дәретке шыға алмайды. Сіздің болжам диагнозыңыз:

ONTUSTIK-QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Педиатрии-1 кафедрасы		
«Балалар хирургиясы» пәні бойынша оқу нәтижелерін қорытынды бағалауға арналған БӨҚ		044-38/19 76 беттің 30 беті

@парафимоз

@гидатиды Морганьи қабынуы

@баланопостит

@тыртықты фимоз

@орхиэпидидимит

~5 жасар баланың әкуінің басы ісінген және гиперемияланған. Әку басын ашу мүмкін емес, іріңді бөлініс бар. Зәр шығаруы ауру сезіммен. Сіздің болжам диагнозыңыз:

@жедел баланопостит

@фимоз

@крипторхизм

@парафимоз

@гипоспадия

~Перзентханадағы баланың құрсақ қуысының алдыңғы қабатындағы қуық проекциясындағы қуықтың артқы қабатының шырышты қабығында зәр ағатын несепардың тесігі анықталады. Шырышты қабаты ісінген, гиперемияланған, айналасындағы терісі мацерацияланған. Сіздің болжам диагнозыңыз:

@қуық экстафиясы

@инфравезикулярлы обструкция

@обструктивті мегауретер

@қуық-кіндік жыланкөзі

@қуық дивертикулы

~2,5 жасар баланы тексергенде ұманың сол жағында консистенциясы жұмсақ-эластикалы, ауру сезімсіз ісік тәрізді түзіліс анықталады, басқанда және көлденең қалыпта көлемі кішірейеді.Ең тиімді тәсіл:

@Росса тәсілімен операция

@РУ-Краснобаев бойынша операциясы

@Иванисевич-Ерохин операциясы

@аталық без венасын таңу

@Хайнес-Андерсен-Кучер операциясы

~3 жасар баланы қарау кезінде әку тесігінің тарылуы, зәр шығаруының бұзылуы анықталады.

Әкуінің басын сыртқа шығару мүмкін емес. Сіздің болжам диагнозыңыз:

@фимоз

@парафимоз

@баланопостит

@эписпадия

@гипоспадия

~13 жасар баланы қарау кезінде ұманың сол жақ аймағындағы тері асты веналары иректелген және кеңейген. Көлденең қалыпта веналар орнына келеді. Сіздің болжам диагнозыңыз:

@2 дәрежелі Варикоцеле

@1 дәрежелі Варикоцеле

@шап-ұмалық жарық

@аталық без кистасы

@3 дәрежелі Варикоцеле

~4 жасар баланың жоғарғы тыныс алу жолдарының бөгде затымен келіп түсті. Баланың тасылмалдау ершелігі:

@тек отырғызып

@ішімен жатқызып

ONTÜSTIK-QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Педиатрии-1 кафедрасы		
«Балалар хирургиясы» пәні бойынша оқу нәтижелерін қорытынды бағалауға арналған БӨК		044-38/19 76 беттің 31 беті

@бүйірімен жатқызып

@арқасымен жатқызып

@Тренделенбург позасында

~2 жасар баланың жағдайы бірден нашарлады, айқын тыныс жетіспеушілігі, ұстама тәрізді үрген жөтел пайда болды, дем алғанда ашық шапалақтаушы дыбыс естіледі. Анасы бала жағдайының бірден нашарлауын бөгде затпен аспирацияланумен байланыстырады. Бөгде заттың нақтылау орналасқан жерін атаңыз:

@трахея

@көмей

@өңеш

@негізгі бронхтар

@бөліктік бронхтар

~Жараны алғашқы хирургиялық өңдеудің балалардағы ерекшелігіне ... жатады.

@жара шеттерін үнемдеп кесу

@жараға антибиотик енгізу

@жараның шеттерін кеспеу

@жараны асептикалық ерітінділермен жуу

@жара шеттерін үлкен етіп кесу

~Үлкен тері астылық сан гематомасы болғанда ... жүргізіледі.

@пункция жасау

@гематоманы тілу

@қысып тұратын байлау жасау

@күрғақ жылу басу

@мұз басу

~... гидронефроздың рентгенологиялық белгілері болып табылады.

@астауша мен тостағаншаның кеңейген пішіні

@деформацияланған тостағанша

@тостағанша бөлімінің ампутиациясы

@бүйрек функциясының төмендеуі

@астаушаның бүйрек ішілік түрі

~Гидронефрозға тән белгілерге ... жатады.

1) үнемі болып тұратын микрогематурия

2) зәр шығару жүйесінің тұрақты инфекциясы

3) құрсақ қуысындағы ісік

4) дизурия

5) никтурия

@2,3

@1,2

@3,4

@4,5

@1,5

~Гидронефроз кезінде көбіне ... қолданылады.

@зәрағар-тостағанша сегментіне пластика жасау

@нефростомия

@нефролитотомия

@пиелотомия

@уретеронефростомия

ONTÜSTIK-QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Педиатрии-1 кафедрасы		
«Балалар хирургиясы» пәні бойынша оқу нәтижелерін қорытынды бағалауға арналған БӨҚ		044-38/19 76 беттің 32 беті

~Гидронефроз кезінде радикалды операция әдісі ... болып табылады.

@Хайнес-Андерсен-Кучер операциясы

@Росса операциясы

@Мартынов операциясы

@Федоров операциясы

@Политано-Леатбеттер операциясы

~Гидронефроз кезіндегі ем - ... ем.

@оперативті

@консервативті

@фитотерапиялық

@егер балада туа пайда болған гидронефроз болса ғана оперативті

@жүре пайда болған түрінде баланың жасы 15-тен асқанда ғана оперативті

~Гидронефрозды анықтау үшін ... қолданылады.

@экскреторлы урография

@ангиография

@уретраның урофилотриясы

@цистография

@ретроградты пиелография

~Гидронефроз кезінде урограммада ... болады.

@тостағанша, табакшалардың кеңуі

@тек зәрағардың кеңуі

@тек табакшалардың кеңуі

@бүйрек паренхимасының бүрісуі

@гидрокаликоз

~Қуық-зәрағар рефлюксіне ... тән нәрсе.

@жоғарғы зәр жолдарына қарай қуықтан зәрдің кері ағуы

@зәрағар сағаларының тарылуы мен зәр эвакуациясының бұзылуы

@уретроцеленің болуы

@инфравезикулярлы обструкция

@зәрағардың нервті-бұлшық еттік дисплазиясы

~Қуық-зәрағар рефлюксі ... ауруға жатады.

@полиэтиологиялық

@туа болатын

@екіншілік

@жүре пайда болатын

@біріншілік

~Қуық-зәрағар рефлюксі ... бұзылуы нәтижесінде пайда болады.

@зәрағардың эвакуаторлы-бітеуші қызметі

@зәрағардың эвакуаторлы қызметі

@зәрағардың бітеуші қызметі

@зәрағардың фильтрациялық қызметі

@зәрағардың абсорбциялық қызметі

~Қуық-зәрағар рефлюксін анықтауда ... ең информативті әдіс болып табылады.

@микционды цистография

@ретроградты пиелография

@бүйрек тамырларының ангиографиясы

@томография

ОҢТҮСТІК-ҚАЗАҚСТАН MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Педиатрии-1 кафедрасы		
«Балалар хирургиясы» пәні бойынша оқу нәтижелерін қорытынды бағалауға арналған БӨҚ		044-38/19 76 беттің 33 беті

@экскреторлы урография

~Микция кезінде және қуық толғанда контрасты заттың ретроградты енуі ... тән.

@активті және пассивті рефлюкске

@жедел рефлюкске

@созылмалы рефлюкске

@екіншілік және жүре пайда болатын рефлюкске

@алғашқылық және туа болатын рефлюкске

~Зәр шығару кезінде контрасты заттың ретроградты енуін ... рефлюкс деп атаймыз.

@пассивті

@активті

@туа болатын

@алғашқылық

@екіншілік

~Қуық толғанда контрасты заттың ретроградты енуін ... рефлюкс деп атаймыз.

@активті

@пассивті

@туа болатын

@алғашқылық

@екіншілік

~Микция кезінде және қуықтың толған кезіндегі контрасты заттың ретроградты енуі ... тән.

@активті және пассивті рефлюкске

@жедел рефлюкске

@созылмалы рефлюкске

@екіншілік және жүре пайда болатын рефлюкске

@алғашқылық және туа болатын рефлюкске

~Зәр-тас ауруы кезінде тас ... болған жағдайда уретеротомияжасалынады.

@зәрағарда

@уретрада

@бүйректе

@тостағаншада

@қуықта

~Зәр-тас ауруы кезінде тас ... болған жағдайда цистолитотомия жасалынады.

@қуықта

@тостағаншада

@уретрада

@зәр жолында

@бүйректе

~Зәр-тас ауруы кезінде тас ... болған жағдайда нефролитотомияжасалынады.

@бүйректе

@зәрағарда

@уретрада

@тостағаншада

@қуықта

~... зәр-тас ауруын анықтау үшін қолданылатын ең қарапайым және маңызы зор әдіс.

@Іш қуысының жалпы рентгенографиясы

@Цистоскопия

@Лапороскопия

ONTÜSTIK-QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Педиатрии-1 кафедрасы		
«Балалар хирургиясы» пәні бойынша оқу нәтижелерін қорытынды бағалауға арналған БӨҚ		044-38/19 76 беттің 34 беті

@Клинико-лабораторлы әдістері

@Пальпация, перкуссия

~... рентгенде көрінбейтін тастарды анықтауда қолданылатын маңыздыәдіс.

@Компьютерлі томография

@Іш қуысының жалпы рентгенографиясы

@Цистография

@Ангиография

@Хромоцистоскопия

~Зәр-тас ауруының басталуына ... себеп болады.

@зәр жолының аномалиялары

@созылмалы гастродуоденит

@гиперкалиемия

@авитаминоз

@гиперкальциемия

~... тас тостағанша-астауша жүйесінің түрін қайталайды:

@Коралл тәрізді

@Бірең-сараң

@Өткізбейтін

@Солиитарлы

@Сегментарлы

~Зәр тас ауруының өзіне тән келесі симптомдары бар, ... оған жатпайды.

@никтурия

@пиурия

@гематурия

@аурсыну

@дизурия

~... бүйрек коликасының себебіне жатады:

@Фрагменталды тастар

@Бекітілген тастар

@Ірі тастар

@Коралл тәрізді тастар

@Тастардың көп болуы

~Зәр тас ауруы кезінде ауыру сезімі ... жиі тарайды:

@шап аймағына

@сол жақ мыңың аймағына

@оң жақ мыңың аймағына

@кіндіктің айналасына

@оң жақ қабырға астына

~Инвагинацияны консервативті жолмен емдеу ... жүргізілуі тиіс.

@ауру басталғаннан 12 сағатқа дейін

@ауру басталғаннан 24 сағатқа дейін

@ауру басталғаннан 48 сағатқа дейін

@бір жасқа дейінгі балаларға

@бір жастан жоғарғы балаларға

~Инвагинацияны консервативті әдіспен қалпына келтіру жолы ... болып табылады.

@ауалы клизма жасау

@ішке жылы қою

ONTÜSTIK-QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Педиатрии-1 кафедрасы		
«Балалар хирургиясы» пәні бойынша оқу нәтижелерін қорытынды бағалауға арналған БӨҚ		044-38/19 76 беттің 35 беті

@жылы ваннаға жатқызу

@сифонды клизма жасау

@спазмолитикалық дәрілерді енгізу

~Инвагинацияны оперативті жолмен емдеуге көрсеткіш болып саналады:

@аурудың басталғанына 12 сағаттан асса

@аурудың басталғанына 20 сағат болса

@аурудың басталғанына 4 сағат болса

@аурудың басталғанына 12 сағат болса

@аурудың басталғанына 18 сағат болса

~Балаларда ... ішек инвагинациясы көп кездеседі.

@3 айдан 1 жасқа дейін

@2 айға дейін

@1 жастан 3 жасқа дейін

@3 жастан 5 жасқа дейін

@5 жастан 8 жасқа дейін

~Балаларда ішек инвагинациясының көп кездесетіні ... түрі.

@аш-тоқ ішектік

@аш-аш ішектік

@тоқ-тоқ ішектік

@тік ішектік

@өрлеуші – көлденең ішектік

~Балалардағы іріңді инфекцияның бір ерекшелігіне ... жатады.

@генерализацияға бейім болуы

@шектелуге бейім болуы

@брадикардия болуы

@қан қысымының көтерілуі

@тыныс ағзаларының қабынуы

~Балада жедел респираторлы инфекция кезінде оң жақ мықын аймағында ауырсыну болса ...

туралы ойлау керек.

@мезаденит

@жедел аппендицит

@панкреатит

@кұрсақ туберкулезі

@энтероколит

~Кіндіктің толық жыланкөзінде операция жасаудың мақсатына ... жатады.

@жыланкөз жолын кесіп алып тастау

@гемопломбамен жыланкөзді жабу

@ішекті кесіп алып тастау

@энтеростоманы шығару

@гастростоманы шығару

~Аппендикс тік ішекке жақын орналасқанда ... әдісі арқылы аппендициттің бар екенін табамыз.

@саусақпен тік ішекті тексеру

@ирригография

@колоноскопия

@ректороманоскопия

@рентгенограмма

~Шап крипторхизмінің себебіне ... жатады.

ONTÜSTIK-QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Педиатрии-1 кафедрасы		
«Балалар хирургиясы» пәні бойынша оқу нәтижелерін қорытынды бағалауға арналған БӨҚ		044-38/19 76 беттің 36 беті

@шап каналының дәнекер ұлпалармен бекітілуі
 @ұрық бауының тамырларының варикозды кеңеюі
 @іш пердесінің вагиналды өсіндісінің облитерациясының болмауы
 @кремастерлі рефлекстің жоғарлауы
 @іш пердесінің вагиналды өсіндісінің абсорциялық қабілетінің жоғарлауы
 ~Балаларда омыртқаның компрессионды сынуы кезіндегі ... ең қолайлы емдеу әдісі.
 @еңкейген жазықтықта күштеп тарту
 @жабық репозиция
 @қаңқалық тарту
 @корсет
 @оперативті
 ~Омыртқаның компрессионды сынуын ... әдіс арқылы анықтайды.
 @рентгенологиялық
 @клиникалық
 @ЭЭГ
 @УДЗ
 @компьютерлі томография
 ~Бронхография үшін қолданылады:
 @верографин
 @билигност
 @пропилюдон
 @сергозин
 @барий
 ~Гидроцелде ... дейін консервативті ем жүргізіледі:
 @2 жыл
 @6 ай
 @3 жыл
 @7 жыл
 @14 жыл
 ~Жамбас сүйектерінің сынуы кезінде жүргізілетін шокқа қарсы іс-шара:
 @Школьников – Селиванов бойынша блокада
 @Шнек бойынша блокада
 @жергілікті жансыздандыру
 @паранефралды блокада
 @крест өрімі блокадасы
 ~Қасаға буыны ажырауы кезінде иммобилизация тәсілі:
 @" гамаке" қалпы
 @скелетті тарту
 @"Волкович" ережесі"
 @кокситті гипсті таңғышын салу
 @тартақысушы жамбас таңғышты салу
 ~Кеуде тінінің воронка тәрізді деформациясы кезінде торакопластикаға көрсеткіші болып табылады:
 @2-3 дәрежелі деформация
 @1 дәрежелі деформация
 @косметикалық ақау
 @аурудың компенсирленген сатысы

ONTÜSTIK-QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Педиатрии-1 кафедрасы		
«Балалар хирургиясы» пәні бойынша оқу нәтижелерін қорытынды бағалауға арналған БӨҚ		044-38/19 76 беттің 37 беті

@физикалық дамудың кідірісінде

~Кеуде қуысының деформациясын емдеудің негізгі әдісі:

@оперативті

@консервативті

@медикаментозды

@сәулелі

@эндоскопиялық

~Полидактилия деп аталады:

@көп саусақтық

@саусақ көлемінің ұлғаюы

@саусақтың болмауы

@саусақ санының азайюы

@барлық саусақтардың бітісуі

~Синдактилия деп аталады:

@саусақтар бітісуі

@қол бітісуі

@саусақ көлемінің ұлғаюы

@қол басы ажырауы

@саусақ санының азаюы

~Жаңа туылған нәрестелерде сан сүйек сынған кезде емдеудің ең тиімді әдісі:

@Шеде бойынша тарту

@Креде-Кефер әдісі

@скелетті тарту

@Шпици әдісі

@гипс таңғыш

~Жамбас басының жарақаттық шығуын емдеуде жиі асқыну:

@басының асептикалық некрозы

@аяқ-қол контрактурасы

@аяқтың қысқаруы

@"соха vara"

@жамбас-сан буынының анкилозы

~Ішек шаншуының анықтауда келесі дифференциалды-диагностикалық белгілер көрсетеді:

1) лейкоцитоздың болмауы

2) алдыңғы құрсақ қабырғасының бұлшықеттерінің кернеуі

3) құрсақ қабырғасының бұлшық ет кернеуінің болмауы

4) тазалау клизмасынан кейін ауырсынудың жоғалуы

5) тазалау клизмасынан кейін ауырсынуды күшеюі

@1;3; 4

@1; 2; 5

@3;4; 5

@2;3; 4

@1; 4; 5

~Жайылмалы перитонитте операция жасалады:

@операция алдындағы дайындықтан кейін 2-3 сағаттан кейін

@операция алдындағы дайындықтан кейін 4-5 сағаттан кейін

@операция алдындағы дайындықтан кейін 6-12 сағаттан кейін

@шұғыл, операция алдындағы дайындықты жүргізубей

ONTUSTIK-QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Педиатрии-1 кафедрасы		
«Балалар хирургиясы» пәні бойынша оқу нәтижелерін қорытынды бағалауға арналған БӨҚ		044-38/19 76 беттің 38 беті

@операция алдындағы дайындықтан кейін 24 сағаттан кейін

~Амбулаторлық жағдайда консервативті ем көрсетілген:

@қарапайым омфалитте

@іріңді омфалитте

@кіндік флегмонасында

@кіндік гангренасында

@уремиялық омфалитте

~Омфалиттің некроздық түрінде көрсетілген:

@гиперемия аймағындағы көптеген кермектер

@кіндікті радикалды кесу

@кіндік бойымен кесу

@радиалды тіліктер

@некроз аймағында бір тілік

~Омфалиттің клиникалық формаларының бірі:

@қарапайым

@хилезді

@буллезді

@геморрагиялық

@экссудативті

~Псевдофурункулез-бұл қабыну:

@тер бездері

@май бездері

@эпидермис

@дерма

@тері асты клетчаткасы

~Псевдофурункулезге тән жергілікті клиникалық белгі болып табылады:

@"бұршақ" түріндегі терінің тығыздануы

@орталығында тері гиперемиясы және флюктуациясы бар шектеулі ісік тәрізді түзілімдер

@географиялық шеттері бар тері гиперемиясы

@анық шекарасыз тері гиперемиясы

@ортасындағы іріңді-некротикалық өзегі бар конус тәрізді инфильтраттар

~Псевдофурункулезді емдеу - бұл:

@барлық қабыну ошақтарын ашу және антибиотиктерді парентеральды енгізу

@сау тіндердің ішінде псевдофурункуларды кесу

@антибиотиктерді энтеральды енгізу

@гиперемия учаскесінде радиалды тіліктер

@жақпа таңғыш және парентеральды антибиотиктер

~Балалардағы некротикалық флегмонның ағымының ерекшелігі:

@процестің жылдам таралуы

@ЭТЖ жоғарылауы

@жоғары температура

@лимфа түйіндерінің инфильтрациясы

@іріңді ыдырау

~Жаңа туылған нәрестелердің некроздық флегмоны үшін тән жергілікті клиникалық белгілері:

@зақымдалған аймақтың ортасында қараңғыланған және қалыс қалған тез таралатын тері гиперемиясы

@терінің тығыздығы (гиперемиясыз), оның бетінен жоғары

ONTÜSTIK-QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Педиатрии-1 кафедрасы		
«Балалар хирургиясы» пәні бойынша оқу нәтижелерін қорытынды бағалауға арналған БӨҚ		044-38/19 76 беттің 39 беті

@ортасында ісіну және флюктуациясы бар тері гиперемиясы
 @нақты "географиялық" шекарасы бар терінің гиперемиясы
 @ортасындағы ірінді-некротикалық өзегі бар конус тәрізді инфильтраттар
 ~Өңеш атрезиясының ең жиі кездесетін түрі болып табылады:
 @жоғарғы соқыр соңы мен төменгі кеңірдек-өңештік жыланкөз
 @төменгі соқыр соңы мен жоғарғы кеңірдек-өңештік жыланкөз
 @жоғарғы және төменгі кеңірдек-өңештік жыланкөздер
 @соқыр жоғарғы және төменгі ұштары
 @"бау" түрі бойынша
 ~Өңеш атрезиясына тән белгі болып табылады:
 @ауыздан көбікті бөлінді
 @өмірдің алғашқы сағаттарынан өкпедегі ылғалды сырылдар
 @туғаннан құсу
 @ішке қарай ойысқан қайық тәрізді іш
 @дене қызуының жоғарылауы
 ~Перзентханада өңеш атрезиясының диагнозын растау үшін жүргізу қажет:
 @асқазанды зондтау әрекеті
 @УДЗ
 @эзофагоскопия
 @асқазанның контрасты зерттеуі
 @ЭЭГ
 ~Өңеш атрезиясы бар жаңа туылған нәрестені балалар хирургиялық бөліміне тасымалдауға дейін бірінші кезекте қажет:
 @ауыз және жұтқыншақ ішіндегісін аспирациялау үшін зондты орнату
 @антибиотиктерді енгізу
 @викасол енгізу
 @оксигенотерапия жүргізу
 @кеуде қуысына УВЧ
 ~Қыз балада жедел аппендицитті ... ажырату керек.
 @аналық без апоплексиясынан
 @бруцеллезден
 @ревматизмнен
 @миокардиттен
 @менингоэнцефалиттен
 ~Пилоростеноздың клиникалық белгісі:
 @пилорустың қалындауы
 @іштің жүрмеуі
 @салмақты жоғалту
 @көп реттік құсу
 @лоқсу
 ~Пилоростеноз кезінде контрасты рентгенологиялық зерттеуді жүргізгенде ... қолданылады.
 @барий сульфаты
 @урографин
 @верографин
 @йодолипол
 @кардиотраст
 ~Балаларда созылмалы іштің қатуы ... болған кезде кездеседі.

ОҢТҮСТІК-ҚАЗАҚСТАН MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Педиатрии-1 кафедрасы		
«Балалар хирургиясы» пәні бойынша оқу нәтижелерін қорытынды бағалауға арналған БӨҚ		044-38/19 76 беттің 40 беті

@Гиршпрунг ауруы

@дизбактериоз

@өт жолдарының дискинезиясы

@аскаридоз

@ішектің жабысқақ ауруы

~Остеомиелиттің ... фазалары бар.

1) интрамедулярлы

2) экстремедулярлы

3) жеңіл

4) орташа

5) ауыр

@1,2

@2,3

@3,4

@4,5

@3,5

~Остеохондропатия кезінде емдеудың ұзақтығы - ...

@2-3 жыл

@3-6 ай

@3-6 жыл

@1-2 жыл

@4-7 ай

~Осгуд-Шляттер аурумен ұл балдардың жиі ауратыны ... шамасы.

@12-13 жас

@5-10 жас

@4-10 жас

@2-5 жас

@1-2 жас

~Остеомиелитке тән белгілерге ... жатады.

1) қатты ауру

2) субфебрилді дене қызуы

3) жайлап басталуы

4) бірден басталуы

5) дене қызуының жоғарылауы

6) сүйектің әр кезде ауыруы

7) ісіну, қызару

@1,4,5,7

@1,2,3,4

@2,3,4,5

@2,3,6,7

@1,2,3,7

~Мегодуоденум дегеніміз - ...

@12-елі ішектің қуысының кеңуі

@Гиршпрунг ауруы

@12-елі ішектің тарылуы

@мекониялық илеус

@тоқ ішектің атрезиясы

ОҢТҮСТІК-ҚАЗАҚСТАН MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Педиатрии-1 кафедрасы		
«Балалар хирургиясы» пәні бойынша оқу нәтижелерін қорытынды бағалауға арналған БӨҚ		044-38/19 76 беттің 41 беті

~Туа біткен пилоростенозға тән белгі:

@2 аптаның соңы немесе 3 аптаның басында кездесетін құрамында өті жоқ құсық

@туа салысымен пайда болған құсық

@алғашқы тәуліктегі өтсіз құсық

@су-тұз тепе-теңдігінің бұзылуынсыз жүретін құсу

@өт араласқан құсық

~Ішек өткізбеушілігі бар балаға құрсақ қуысының жалпы рентгенограммасы жасалады:

@вертикалды жағдайда

@жатқызып

@оң бүйіріне жатқызылып

@сол бүйіріне жатқызылып

@басын төмен қарай салбыратып

~Пилоростенозда құсықтың құрамы ... тұрады.

@іріген сүттен

@сілекейден

@өттен

@қаннан

@нәжістен

~Пилоростеноздың айқын клиникалық белгісіне жатады:

@«фонтан» тәрізді құсу

@олигурия

@сарғаю

@үлкен дәреттің шықпауы

@іштің ұлғаюы

~Жедел аппендицитпен ауырған баланың ең алдымен ... жүйесін тексереміз.

@ас қорыту

@демалу

@тері

@буын-сүйек

@жүрек-тамыр

~Дуглас-абсцесті хирургиялық жолмен емдеу ... арқылы орындалады.

@тік ішек

@алдыңғы құрсақ қабырғасы

@аралық

@қынап

@оң мықын аймағында қиғыш кесу

~Өңеш атрезиясының тән белгілеріне ... жатады.

1) демалуының бұзылуы

2) аузынан көпіршіктің бөлінуі

3) туылғаннан құсу

4) іштің кебуі

5) дене температурасының жоғарылауы

@1,2

@2,3

@3,4

@4,5

@3,5

ONTUSTIK-QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Педиатрии-1 кафедрасы		
«Балалар хирургиясы» пәні бойынша оқу нәтижелерін қорытынды бағалауға арналған БӨҚ		044-38/19 76 беттің 42 беті

~Нәрестенің өңешінің атрезиясын диагностикалау үшін ... қолданылады.

@Элефант сынаамасын

@күрсак қуысының УДЗ

@иригография

@колоноскопия

@кеуде клеткасының рентгенографиясын

~Өңеш атрезиясымен операция болған балалардағы асқынуға ... жатады.

@өңештің стенозы

@асқазан өңеш рефлюсі

@дисфагия

@трахео – өңештік жыланкөздің қайта пайда болуы

@аспирациялық пневмония

~Балаларда шап жарығының пайда болуын ... байланыстырады.

@күрсақтың вагиналды өсіндісінің облитерациясының бұзылуымен

@күрсақтың алдыңғы қабырғасының әлсіздігімен

@шап сақинасының тарылуымен

@жөтелумен

@шап каналының кеңеюімен

~Шап жарығының асқынуын атаңыз.

@қысылу

@іріндеу

@аталық бездің атрофиясы

@қан кету

@жыланкөздің пайда болуы

~... шап жарығының негізгі симптомы болып табылады.

@ішектің құрылдау симптомы

@перкуссия кезінде тұйықтық

@ұманың көлемінің үлкеюі

@диафаноскопия кезіндегі сәулелену

@ұма терісінің қызаруы

~Шап жарығының ... клиникалық түрлері бар:

1) тікелей

2) қиғаш

3) жалған

4) шын

5) аталықтық

@1;2

@3;4

@3;5

@2;4

@4;5

~Қысылған шап жарығында ... белгілері болады.

1) ауырсыну

2) перкуторлық дыбыстың тұйықталуы

3) құсу

4) мазасыздану

5) дене қызуының көтерілуі

ONTUSTIK-QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Педиатрии-1 кафедрасы		
«Балалар хирургиясы» пәні бойынша оқу нәтижелерін қорытынды бағалауға арналған БӨҚ		044-38/19 76 беттің 43 беті

@1;3;4

@1;4;5

@3;4;5

@2;3;4

@1;3;5

~Шап жарығының ... түрі бар.

@шап-ұмалық

@төменгі

@ортанғы

@ендік

@жоғары

~Шап жарығын емдеуде ... әдісі қолданылады.

@Дьюамель

@Фред-Рамштед

@Россо

@Иванисевич

@Долецкий

~Қыз балаларда қысылғаншап жарығына операциялық емді ... жасайды.

@шұғыл түрде

@6-7сағ

@7-8 сағ

@8-12сағ

@12 сағ өткеннен сон

~Туа біткен шап жарығында операцияны балаға ... жасауға болады.

@6-12 айында

@10-12 жасында

@1 – 4 айында

@12-14 жасында

@бірден диагноз қойылғаннан кейін

~Кіндік жарығы кезінде емдеу әдісі ... байланысты.

@наукастын жасына

@баланың жалпы жағдайына

@нәрестенің жынысына

@кіндік сақинасының көлеміне

@жарықтың көлемі және қосарланған ауыр ақауына

~Балалардағы созылмалы іш қатуының негізгі себебі ... болады.

@Гиршпруг ауруы

@гастроэнтерит

@дизентерия

@Меккел дивертикулы

@ферментопатия

~Инвагинацияның асқынуына ... жатады.

@ішектің некрозға ұшырауы

@өкпенің қабынуы

@дизентерия

@дисбактериоз

@дивертикулит

ONTÜSTIK-QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Педиатрии-1 кафедрасы		
«Балалар хирургиясы» пәні бойынша оқу нәтижелерін қорытынды бағалауға арналған БӨҚ		044-38/19 76 беттің 44 беті

~Жоғары ішек өтімсіздігінің төменгімен шекарасы:

@аш ішектің бастапқы бөлімі

@илеоцекальды сағасы

@пилорус

@асқазанның және өңештің арасындағы сағалау

@тоқ ішектің ректосигмоидты бөлімі

~Туа біткен жоғарғы ішек өтімсіздігіне тән клиникалық белгі:

@туғаннан құсу

@іштің кебуі

@эксикоз симптомдарының өсуі

@меконимен нәжістің кідіруі

@құрсақ қабырғасының домбыққандығы

~Перзентханада туа біткен жоғарғы ішек өтімсіздігімен балаға оны тасымалдауға дейін қажет:

@зондты асқазанға енгізу

@викасолды тағайындау

@антибиотиктерді тағайындау

@тазалау клизмаларын жасау

@инфузиялық ем жүргізу

~Туа біткен төменгі ішек өтімсіздігіне тән клиникалық-рентгенологиялық белгісі:

@іштің күрт кебуі және Клойбер тостағандарының болуы

@2 тәуліктің соңынан меконимен құсу және дыбыссыз іш

@ойысқан іш және көптеген Клойбер тостағандары

@іштің ауруы және 1-3 Клойбер тостағандары

@дыбыссыз іш және эксикоз симптомдары өршуі

~Ішектің атрезиясы деп түсінеді:

@ішек саңылауының толық жабылуы

@саңылаудың тарылуы

@іш қуысынан ортаңғы ішектің шығуы

@тұтқыр меконимен ішектің саңылауының бітелуі

@инвагинация

~Ішектің стенозы деп түсінеді:

@ішектің органикалық тарылуы

@ішек саңылауының толық жабылуы

@құрсақ қуысынан ортаңғы ішектің шығуы

@тұтқыр меконимен ішектің саңылауының бітелуі

@инвагинация

~Туа біткен ішек өтімсіздігі кедергі деңгейі бойынша бөлінеді:

@төмен, жоғары

@орташа, төмен

@бастапқы, краниальды

@торакальды, абдоминальды

@ақырғы, соңғы

~Клиникалық ағымы бойынша туа біткен ішек өтімсіздігін ажыратады:

@жедел

@тұрақты

@тұрақсыз

@спецификалық

ONTÜSTIK-QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Педиатрии-1 кафедрасы		
«Балалар хирургиясы» пәні бойынша оқу нәтижелерін қорытынды бағалауға арналған БӨҚ		044-38/19 76 беттің 45 беті

@спецификалық емес

~12 елі ішектің атрезиясы клиникасы мына жаста көрінеді:

@өмірінің 1-2 тәулігінде

@өмірінің 3-5 күні

@өмірінің 6-7 күні

@1 айлықтан кейін

@ақырындап 1 жас ағымында

~Асқазанның препилориялық атрезиясына тән симптомдардың бірі:

@секіру және құсу

@қанды нәжіс

@естен тану

@дене қызуының 39 градусқа дейін көтерілуі

@бауыр мен көкбауырдың ұлғаюы

~Құрсақ қуысының шолу R-граммында препилориялық атрезияға тән:

@газ көпіршігі бар сұйықтықтың бір деңгейі

@газ көпіршігі бар сұйықтықтың екі деңгейі

@Клойбер тостағандары

@дыбыссыз іш

@ішектің құрсақ қуысының оң жартысына ығысуы

~Төменгі ішек өтімсіздігіне жатады:

@аш ішектің атрезиясы

@пилоростеноз

@сақин тәрізді ұйқы безі

@12-елі ішектің атрезиясы

@12-елі ішектің стенозы

~Аш ішектің атрезиясының клиникалық белгілері пайда болады:

@өмірінің 2 тәулігінен бастап

@3 апталық жаста

@2 апталық жастың басында

@1 айлықтың соңында

@туған сәттен бастап

~Мықын ішек атрезиясының симптомдарының бірі болып табылады:

@меконияның болмауы

@меконияның қанмен шығуы

@дене қызуының жоғарылауы

@фонтанды құсу

@тәбеттің жоғарылауы

~Аш ішектің атрезиясында байқалмайды:

@дене салмағының артуы

@бала мазасызданады, кеудеден бас тартады

@енжар, адинамиялық бала

@интоксикацияның өршуі

@жылдам нашарлау

~Аш ішектің атрезиясы кезінде іш жағынан байқалады:

@іштің біркелкі кебуі

@ауырсынатын іш

@эпигастрий аймағының кебуі

ONTÜSTIK-QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Педиатрии-1 кафедрасы		
«Балалар хирургиясы» пәні бойынша оқу нәтижелерін қорытынды бағалауға арналған БӨҚ		044-38/19 76 беттің 46 беті

@тартылған іш

@күсудан кейін іштің көлемінің күрт азаюы

~Балалардағы туа біткен пилоростеноздың себебі:

@пилорустың дұрыс емес иннервациясы

@тамақтандырудың бұзылуы

@ішек түтігінің жетілмеуі

@жедел гастрит

@асқазан жарасы

~Туа біткен пилоростеноз кезінде ең ақпаратты зерттеу:

1) бариймен асқазанды рентгенологиялық зерттеу

2) бариймен клизма

3) наркозбен ішті пальпациялау

4) фиброгастроскопия

5) компьютерлік томография

@1; 3; 4

@2; 4; 5

@3; 4; 5

@2; 3; 4

@1; 2; 5

~Тік ішектің атрезиясының биіктігі анықталады:

@аяқтары жоғары көтерілген қалыпта іш қуысы мен жамбас рентгенографиясы

@вертикальды қалыпта іш қуысы мен жамбас рентгенографиясы

@АІЖ контрасты рентгенологиялық зерттеуі

@наркозбен іштің пальпациясы

@лапароскопия

~Өмірінің алғашқы күндерінде аноректалды ақауды түзетуге көрсеткіш:

@толық атрезияда

@жыланкөздің компенсацияланған формасы бар атрезия кезінде

@шала туған балаларда

@атрезия сыртқы кең жыланкөзбен кезінде

@атрезия басқа органдар мен жүйелердің ақауларымен үйлескен кезінде

~Аноректалды ақаулар этиологиясы:

@тұқымқуалайтын

@травматикалық

@жұқпалы-аллергиялық

@алиментарлы

@жүйке-рефлекторлы

~Қалыпты құрылысты артқы тесікте(анус) жыланкөздер анықталады:

@ұлдардың несеп жүйесінде

@сегізкөз аймағында

@сан аймағында

@қыздардың несеп жүйесінде

@шап аймағында

~Аноректалды аймақтың атрезиясы болады:

@жоғары

@аралық

@вестибулярлы

ОҢТҮСТІК-ҚАЗАҚСТАН MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Педиатрии-1 кафедрасы		
«Балалар хирургиясы» пәні бойынша оқу нәтижелерін қорытынды бағалауға арналған БӨҚ		044-38/19 76 беттің 47 беті

@созылмалы

@жедел

~Тік ішектің атрезиясында жыланкөздер байқалады:

@ұлдардың зәр шығару жүйесінде

@ұлдардың жыныстық жүйесінде

@аш ішекте

@тоқ ішекте

@күрсақ арты кеңістігінде

~Аноректальды ақаулар кезінде туа біткен тарылу жиі кездесетін аймақ:

@тік ішек

@көкбауыр бұрышы

@илеоцекальды бұрыш

@бауыр бұрышы

@көлденең тоқ ішек

~Жыланкөзсіз атрезия жіктеледі:

@аналь тесігі мен тік ішек

@күрсақтық

@вентральды

@шаптық

@сандық

~Анус(артқы тесік) атрезиясы диагностикалануы тиіс:

@туыла салысымен

@1 жаста

@1 айлықта

@пубертантты жаста

@3-5 айлықта

~Анус(артқы тесік) атрезиясы диагностикаланады:

@жалпы қарау кезінде

@фиброгастроскопияда

@флюорографияда

@фиброколоноскопияда

@компьютерлік томографияда

~Тік ішектің атрезиясы симптомдарының бірі болып табылады:

@меконияның болмауы

@ауыз бен мұрыннан көпіршікті бөлініс

@қанмен бірнеше рет құсу

@сарғаю

@тырысулар

~Аноректалды аймақтың атрезиясының жыланкөзсіз формасының кеш диагностика кезінде пайда болады:

@төменгі ішек өтімсіздігі

@жоғарғы ішек өтімсіздігі

@аспирационды пневмония

@тырысулар

@зәрдің жедел кідірісі

~Туа біткен пилоростенозға тән белгі:

@2 аптаның соңы немесе 3 аптаның басында кездесетін құрамында өті жоқ құсық

ONTÜSTIK-QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Педиатрии-1 кафедрасы		
«Балалар хирургиясы» пәні бойынша оқу нәтижелерін қорытынды бағалауға арналған БӨҚ		044-38/19 76 беттің 48 беті

@туа салысымен пайда болған құсық
 @алғашқы тәуліктегі өтсіз құсық
 @су-тұз тепе-теңдігінің бұзылуынсыз жүретін құсу
 @өт араласқан құсық
 ~Анус атрезиясында рентгенография өткізуге ең ыңғайлы уақыт:
 @туылғаннан кейін 15-16 сағаттан соң
 @туылған соң алғашқы сағатта
 @3 жаста
 @асқыныс дамығанда
 @колоноскоп болмаған жағдайда
 ~Жіңішке ішек атрезиясының қай деңгейде екендігін анықтауға қолданылады
 @рентгенография
 @иммунологиялық зерттеу
 @бактериологиялық зерттеу
 @ангиография
 @томография
 ~Тік ішек атрезиясы кезінде жыланкөздер қайда ашылуы мүмкін
 @қуық
 @несепағар
 @кіші түбекшелер
 @тостағанша
 @үлкен түбекше
 ~Анус атрезиясының оперативті еміне витальды көрсеткіш
 @атрезия жыланкөзсіз
 @өтпен құсу
 @айқын сарғаю
 @гиперлейкоцитоз
 @туылу кездегі жаракат
 ~Анус атрезиясының қуыққа ашылған жыланкөзінде қандай клиника көрінеді
 @нәжис пен зәрдің шығуы
 @гипербилирубинемиямен
 @гиперлейкоцитозбен
 @эозинофилиямен
 @уремиямен
 ~Аноректальды ақаулармен көбіне қосарланады
 @зәр шығару жүйесінің ақаулары
 @санның туа пайда болған шығуы
 @косолопость
 @омыртқа дамуының ақауы
 @өкпе ақауы
 ~Анатомиялық ерекшеліктеріне байланысты аноректальды ақау жыланкөзінің ағымы
 @компенсирленген, субкомпенсирленген, декомпенсирленген
 @жедел және созылмалы бүйрек жеткіліксіздігімен
 @жедел, жеделдеу, рецидивирлеуші
 @жақсы ағымды, жаман ағымды
 @жеңіл, орташа, ауыр
 ~Анус атрезиясының зәр шығару жүйесіне ашылған жыланкөзін диагностикалауда ең тиімді әдіс

ONTÜSTIK-QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Педиатрии-1 кафедрасы		
«Балалар хирургиясы» пәні бойынша оқу нәтижелерін қорытынды бағалауға арналған БӨҚ		044-38/19 76 беттің 49 беті

@уретроцистография

@УЗИ

@экскреторлы урография

@инфузионды урография

@Зимницкий бойынша зәр анализі

~Анустың туа пайда болған тарылуының симптомы

@созылмалы іш қату

@қан нәжісте

@жеңілдік әкелмейтін құсу

@зәрдің ауырсынумен шығуы

@нәжіс іріңмен

~Тік ішектің туа пайда болған тарылуын диагностикалауда таңдаулы әдіс

@иригография

@радиоизотопты зерттеу

@УЗИ

@лапароскопия

@КТ

~Анус атрезиясының жіңішке жыланкөзінде операция жасалынады

@туа салысымен

@3 айдан 3 жасқа дейін

@жыныстық даму кезінде

@жоспар бойынша 1 жастан кейін

@жыланкөздің ұзақ бітелмеуі

~Анус атрезиясының зәр шығару жүйесіне ашылған жыланкөздердің асқынысы

@зәр шығару жолдарының жоғары өрлемелі инфекциямен

@куық полипі

@куық дивертикулы

@несепағарды нейробұлшықеттік дисплазиясы

@куық – несепағар рефлюксі

~Анус атрезиясының жіңішке жыланкөзінде дамиды

@мегаколон

@ішек бұратылуы

@нәжісті ұстай алмау

@ішектік қан кету

@парапроктит

~Анус атрезиясының жыланкөздік формасында этап бойынша емін көрсетіңіз:

@колостома, радикалды операция, бужирлеу

@радикалды операция, бужирлеу, колостоманы орнату

@колостоманы орнату, бужирлеу, радикалды операция

@радикалды операция, колостоманы орнату, бужирлеу

@бужирлеу, радикалды операция

~Тік ішектің төменгі атрезиясында қолданылатын ... операциясы.

@шапаралық проктопластика

@Стоун-Бенсон

@Диффенбах

@аноластика

@кұрсақ-шапаралық проктопластика

ONTÜSTIK-QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Педиатрии-1 кафедрасы		
«Балалар хирургиясы» пәні бойынша оқу нәтижелерін қорытынды бағалауға арналған БӨҚ		044-38/19 76 беттің 50 беті

~Тік ішектің жоғарғы атрезиясында қолданылатын операция

@күрсак-шапаралық проктопластика

@анопластика

@жыланкөздермен бужирлеу

@шапаралық проктопластика

@Дюамель

~Анус атрезиясының радикалды операциясының асқынысы

@нәжісті ұстай алмауы

@бейспецификалық колит

@Крон ауруы

@цистит

@ішек инвагинациясы

~Аноректальды ақаудың алғашқы күндері коррекция жасауға көрсеткіштері

1)толық атрезияда

2)сыртқы жыланкөздермен трезияда

3)атрезия мен басқа да жүйелер ақауында

4)шала туылғандарда

5)зәр шығару жолдарына ашылған жыланкөздермен атрезияда

@1,5

@2,4

@3,5

@1,3

@1,4

~Ішпердеішілік жарық анатомиялық құрылымына байланысты болады:

@шынайы, жалған

@қалыптаспаған

@қалыптасқан

@диафрагмаастылық

@ілмекаралық

~Ішпердеішілік жарық даму себебі

@күрсак қуысы мүшелерінің даму ақауы

@ішек қабырғасының қалыптасу ақауы

@K,CL дефициті

@ішек айналымының бұзылысы

@ұйқы безінің кистофиброзы

~Ішпердеішілік жарықтарды емдейді:

@оперативті емнің радикалды әдісімен

@физио ем

@оперативті емнің полиативті әдісімен

@гипербариалық оксигенациямен

@консервативті

~Қысылған шап жарығында жарықты кесудегі ерекшеліктер

1) қысылуды жою үшін жарықтық қапшық кесіледі шап каналын кесуге дейін

2) қысылуды жою үшін жарықтық қапшық кейін кесіледі шап каналын кескен соң

3) жарықтық қапшықта қысылған ілмектердің өміршенділігі бағаланады

4) әкелуші мен әкетуші ілмектердің өміршенділігі бағаланады, сондықтан күрсак қуысының шығарылады

ОҢТҮСТІК-ҚАЗАҚСТАН MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Педиатрии-1 кафедрасы		
«Балалар хирургиясы» пәні бойынша оқу нәтижелерін қорытынды бағалауға арналған БӨҚ		044-38/19 76 беттің 51 беті

5) шап каналының алдыңғы қабырғасының апоневротикалық пластикасы орындалады

@1,4,5

@2,3,5

@1,3,5

@3,4,5

@1,3,4

~Балаларда іштің ақ сызығының жарығы сипатталады

1) іштің ақ сызығының апоневрозының дефектісі

2) кіндіктен жоғары, орнына қойылмайтын, ауырсынатын

3) үлкен дәрет бұзылысымен

4) іштің ісінуімен

5) эпигастрий аймағының ауырсынуымен, құрсақтың алдыңғы қабырғасының тітіркенуімен

@1,2,5

@2,4,5

@1,3,4

@2,3,5

@1,3,5

~Жалған көкет жарығына жатады

1) алдыңғы

2) диафрагма дефектісі

3) диафрагма күмбезі

4) өңештік саңылау

5) френико-перикардальды

@2,5

@1,4

@1,3

@4,5

@3,4

~Тыныс бұзылысымен сипатталатын көкет жарықтарын атаңыз

1) алдыңғы

2) меншікті диафрагмалық, жалған

3) диафрагма күмбезінің көтерілуінің шектелуі

4) диафрагма күмбезінің релаксациясы

5) өңештік саңылау жарығы

@2,4

@2,5

@1,4

@3,5

@1,3

~Дисфагиямен көрінетін көкет жарықтарын атаңыз

@өңештік саңылау

@алдыңғы

@артқы

@диафрагма күмбезі

@френико-перикардальды

~Көкет жарықтарын анықтаудағы ең информативті әдіс

1) асқазан мен тоқ ішекті эндоскопиялық зерттеу

ОҢТҮСТІК-ҚАЗАҚСТАН MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Педиатрии-1 кафедрасы		
«Балалар хирургиясы» пәні бойынша оқу нәтижелерін қорытынды бағалауға арналған БӨҚ		044-38/19 76 беттің 52 беті

2) кеуде қуысының шолу рентгенограммасы

3) кеуде торы томографиясы

4) КТ кеуде торы мен құрсақ қуысы

5) асқазан – ішек трактісін контрасты зерттеу

@2,5

@3,5

@2,3

@1,4

@3,4

~Жиі асфиктикалық қысылуларға әкелетін көкет жарықтары

@меншікті диафрагмалық, жалған

@алдыңғы бөлімінің

@диафрагма күмбезінің көтерілуінің шектелуі

@өңештік саңылау жарығы

@френико-перикардиялы

~Бақылауға бағытталған көкет жарығы

@диафрагма күмбезінің көтерілуінің шектелуі

@алдыңғы бөлімінің

@Богдалеко саңылауы

@диафрагма күмбезінің релаксациясы

@өңештік саңылау

~Балаларда шап жарығының пайда болу себебі

@шажырқайдың қынаптық өсіндісінің облитерациялық бұзылысы

@құрсақтың алдыңғы қабырғасының бұлшықеттерінің әлсіздігі

@құрсақішілік қысым жоғарлауы

@созылмалы іш қатуы

@жөтел

~Инвагинацияның асқынуына тән

@іштің ассиметриялы ісінуі

@газ бен нәжістің тоқтауы

@қанды нәжіс

@түскен іш

@қабылдаған тағаммен құсық

~Қайталамалы инвагинация себебі

@Меккель дивертикулы

@диспепсия

@энтерит

@колит

@атрезия

~Инвагинация диагностикасын ең информативті әдіс

1) құрсақ қуысының шолу рентгенографиясы

2) пневмоирригография

3) ішектегі барий пассажен зерттеу

4) наркоз астында іштің бимануальды пальпациясы

5) жалпы қан анализі

@2,4

@1,3

ONTÜSTIK-QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Педиатрии-1 кафедрасы		
«Балалар хирургиясы» пәні бойынша оқу нәтижелерін қорытынды бағалауға арналған БӨҚ		044-38/19 76 беттің 53 беті

@3,4

@1,5

@2,5

~Операциядан кейін дамыған спайкалық өтімсіздік кеш болып есептеледі мына мерзімнен бастап:

@1 ай

@3 ай

@6 ай

@12ай

@стационардан шыққан

~Ерте және кеш дамыған спайкалық өтімсіздіктің оперативті емінің принципі

@спайкаларды кесу

@ілімелі энтеростомия

@терминальды энтеростомия

@шынайы анус орнату

@күрсақ қуысы санациясы

~Балаларда ішек резекциясынан кейін таңдамалы ішек анастомозы

@соңын соңына

@соңын бүйірге

@бүйірінен бүйіріне

@бүйірінен соңына

@магнитті анастомоз

~Баларда зәр шығару жолдарында тастың дамуында негізгі себебі

@коллоид – кристаллоид балансының бұзылысы

@белок алмасуының бұзылысы

@тұз-су балансының бұзылысы

@туа пайда болған тубулопатия

@электролит балансының бұзылысы

~Зәр – тас ауруының негізгі симптомы

@конкременттердің болуы

@дизурия

@макрогематурия

@микрогематурия

@бүйрек шаншуларының ұстамасы

~Бүйрек шаншуын жою үшін тағайындалмайды

@жедел нефростомия

@Лорен – Эпштейн бойынша блокада

@жылы ванна

@спазмолитиктер

@анальгетиктер

~Пиелолитомия жасалады егер тас орналасса

@түбекшеде

@неспағарда

@бүйректе

@қуықта

@уретрада

~Зәр – тас ауруында ең алғаш дамидын симптом

ONTUSTIK-QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Педиатрии-1 кафедрасы		
«Балалар хирургиясы» пәні бойынша оқу нәтижелерін қорытынды бағалауға арналған БӨҚ		044-38/19 76 беттің 54 беті

@ауырсыну

@гематурия

@пиурия

@дизурия

@дене қызуының жоғарлауы

~Бүйректік шаншуды басу үшін қолданылмайды

@суық ванна

@анальгетиктер

@спазмолитиктер

@жатырдың жұмыр байламы мен тұқымдық арқанша блокадасы

@Лорин – Эпштейн бойынша блокада

~Қуық – несепәғар рефлюкстің екінші дәрежесін қоюға мүмкіндік береді

@микционды цистоуретерография

@цистоскопия

@урофлуорометрия

@цистометрия

@экскреторлы урография

~Қуық – несепәғар рефлюкс себебі

1) созылмалы цистит

2) несепәғар аузының қуықтан тыс эктопиясы

3) несепәғар – қуық соустья жетіспеушілігі

4) пиело – уретеральды соустья обструкциясы

5) инфравезикальды обструкция

@1,3,5

@2,3,4

@3,4,5

@1,3,4

@1,2,4

~Қуық – несепәғар рефлюкстің хирургиялық емі негізделеді

@несепәғарды қуыққа трансплантациялау шырышасты бөлімін ұзартумен

@нефрэктомия

@пиелостомия

@несепәғар басын тарылту

@цистостомия

~Инвагинация ішектің ... бөлігінде көп кездеседі.

@соқыр ішек – мықын ішек

@аш ішек

@көлденен тоқ ішек

@тік ішек

@сигма тәрізді ішек

~Несепәғардың уретеровезикальды сегментінің негізгі функциясы

@бітеулік - эвакуаторлы

@эвакуаторлы

@бітеулік

@фльтрациялық

@абсорбциялық

~Өңеш атрезиясы диагнозын дәлелдеу үшін перзентханада ... қажет.

ONTÜSTIK-QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Педиатрии-1 кафедрасы		
«Балалар хирургиясы» пәні бойынша оқу нәтижелерін қорытынды бағалауға арналған БӨҚ		044-38/19 76 беттің 55 беті

- 1) асқазанға зонд өткізіп көру
 - 2) УДЗ жүргізу
 - 3) көкірек клеткасының жалпы рентгенографиясын жасау
 - 4) өңештің контрастты рентгенографиясын жасау
 - 5) эзофагоскопияны жүргізу
- @1,3
@2,3
@1,2
@1,5
@2,5
- ~Инвагинация ішектің ... бөлігінде көп кездеседі.
- @соқыр ішек – мықын ішек
@аш ішек
@көлденен тоқ ішек
@тік ішек
@сигма тәрізді ішек
- ~Несеп тастар химиялық құрамына қарай жіктеледі, ... оған жатпайды.
- @нитраттар
@фосфаттар
@ураттар
@оксалаттар
@цистиндер
- ~... зәр-тас ауруында ең бірінші кездесетін симптом.
- @Гематурия
@Ауырсыну
@Дене қызуының көтерілуі
@Пиурия
@Дизурия
- ~... зәр-тас ауруына тән негізгі белгі.
- @Бүйрек коликасының ұстамасы
@Тас қиыршықтарының шығуы
@Дизурия
@Микрогематурия
@Макрогематурия
- ~Қуық-зәрағар рефлюксі ... жиі кездеседі.
- @жаңа туған нәрестелерде
@1 жасқа дейін
@1-3 жас аралығында
@4-11 жас аралығында
@12-15 жас аралығында
- ~Қуық – зәрағар рефлюксінің ... түрі болмайды.
- @катаралды және флегмонозды
@туа болатын және жүре пайда болатын
@жедел және созылмалы
@активті және пассивті
@біріншілік және екіншілік
- ~Қуық-зәрағар рефлюксіні анықтау үшін тексеру комплексіне ... әдісін қолдану қажет.

ONTUSTIK-QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Педиатрии-1 кафедрасы		
«Балалар хирургиясы» пәні бойынша оқу нәтижелерін қорытынды бағалауға арналған БӨҚ		044-38/19 76 беттің 56 беті

@экскреторлы урография
 @уродинамикалық тексеру
 @клинико-лабораториялы тексеру
 @радиоизотопты зерттеу
 @магинитті - резонансті томография
 ~Қуық-зәрағар рефлюксінің хирургиялық емі ... аяқталады.
 @зәрағардың дистальды бөлігін қуықтың шырышты қабығыныңастына орналастыруымен
 @нефрэктомиямен
 @пиелостомиямен
 @зәрағар тесіктерін кеңейтумен
 @цистостомиямен
 ~Қуық-зәрағар рефлюксін анықтауда ... ең информативті әдіс болып табылады.
 @цистография
 @ретроградты пиелография
 @бүйрек тамырларының ангиографиясы
 @томография
 @экскреторлы урография
 ~Гидронефрозды анықтау үшін тексеру комплексіне ... әдісін қолдану қажет.
 @экскреторлы урография
 @уродинамикалық тексеру
 @клинико-лабораториялы тексеру
 @радиоизотопты әдістер
 @цистоскопия
 ~Гидронефроздың клиникалық және патоморфологиялық көрінісіне ... жатпайды.
 @дене қызуының көтерілуі
 @реналды гипертония
 @гидронефротикалық трансформацияның өршуі
 @ишурия
 @палакиурия
 ~Гидронефроз кезінде зәр анализінде ... болмайды.
 @никтурия
 @пиурия
 @гипоизостенурия
 @микрогематурия
 @макрогематурия
 ~Гидронефрозбен ауыратын балаларды тексеру үшін ... қолданылмайды.
 @зәрағарды бужирлеу
 @ультрадыбыстық зерттеу
 @экскреторлы урография
 @нефросцинтиграфия
 @клинико-лабораторлы тексеру
 ~Инфузионды урографияға ... көрсеткіш болып саналады.
 @гипостенурия
 @гиперстенурия
 @екі жакты гидронефроз
 @бала жасының 1-ден жоғары болуы
 @бір жакты гидронефроз

ONTÜSTIK-QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Педиатрии-1 кафедрасы		
«Балалар хирургиясы» пәні бойынша оқу нәтижелерін қорытынды бағалауға арналған БӨҚ		044-38/19 76 беттің 57 беті

~Тұрақты ауырсыну, құсу және ісік тәрізді түзілістің бел аймақта болуы ... тән.

@гидронефроздың жабық түріне

@туа пайда болған гидронефрозға

@орын ауыстыратын гидронефрозға

@жүре пайда болған гидронефрозға

@гидронефроздың ашық түріне

~Гидронефрозды ... ажырату диагностикасы жүргізбейді.

@шажырқай кистасымен

@куық-зәрағар рефлюксімен

@эхинококкпен

@Вильямс ісігімен

@уретерогидронефрозбен

~Операциялық емнен кейінгі гидронефроздың асқынуына ... жатады.

@анастомоздың стенозы

@пиелонефрит

@анурия

@полласкиурия

@омегаурия

~Гидронефроз кезінде ... операциясы балаларда өте жиі қолданылады.

@Хайнс - Андерсон

@Фолей

@Бонин

@Иванисевич

@Мартынов

~Бүйрек ақауын табу үшін кең қолданылатын зерттеу әдісі болып ... саналады.

@экскреторлы урография

@Нечипоренко әдісі

@хромоцистоскопия

@цистография

@радиоизотопты зерттеу

~Уретраның артқы клапандары ... арқылы табылады.

1) цистоскопия

2) уретроскопия

3) цистоуретрография

4) экскреторлы урография

5) куықты УДЗ

@1,2

@2,3

@3,4

@4,5

@3,5

~Бүйректің функционалдық жағдайын анықтауда ... пайдалану қажет емес.

@ретроградты пиелографияны

@хромоцистоскопияны

@экскреторлы урографияны

@радиоизотопты ренографияны

@радиоизотопты нейросцинтиграфияны

ONTÜSTIK-QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Педиатрии-1 кафедрасы		
«Балалар хирургиясы» пәні бойынша оқу нәтижелерін қорытынды бағалауға арналған БӨК		044-38/19 76 беттің 58 беті

~... кезіндегі ең тиімді зерттеу әдісіне экскреторлы урография жатады.

@Гидронефроз

@Жедел зәрдің тоқтауы

@Қуық – зәрағар рефлюксі

@Зәрді ұстай алмау

@Нейрогенді қуық

~Құрсақ қуысындағы ісіктің көбіне пайда болуының себебі:

@зәр шығару жүйесінің даму ақаулары

@туылу кезіндегі жарақаттар

@қабыну процесі

@ас қорыту жүйесінің даму ақаулары

@ішек рагы

~Балаларда жедел лимфаденит көбіне ... кездеседі.

@жақ астында

@қолтық астында

@құрсақ қуысында

@кеуде қуысында

@шынтақ буынында

~Лимфаденитті ... ауруымен ажырату диагностикасын жүргізу қажет емес.

@гемонгиома

@туберкулез

@лимфогранулематоз

@лимфома

@«мысықтың тырнауы»

~Гипоспадия диагнозымен операцияға баланы ... жасында алу керек.

@9 ай – 12ай

@6 – 7ай

@0 – 6 ай

@10 – 12ай

@12 – 14ай

~Тотальді эписпадияға тән белгілерді көрсетініз:

1) жыныс мүшесінің деформациясы

2) зәрді ұстай алмауы

3) уретраның төменгі қабырғасының болмауы

4) меатус стенозы

5) уретраның жоғарғы қабырғасының болмауы

@1,2,5

@2,3,4

@1,3,4

@3,4,5

@1,3,5

~Қуық экстрофиясы баланы операцияға ... жасында алу керек.

@туылғаннан соң 2-3 тәулік

@7-10 тәулік

@10-14 тәулік

@14-21тәулік

@21-28тәулік

ONTÜSTIK-QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Педиатрии-1 кафедрасы		
«Балалар хирургиясы» пәні бойынша оқу нәтижелерін қорытынды бағалауға арналған БӨҚ		044-38/19 76 беттің 59 беті

~Жараның шеттерін кеспей тігуге болады егер жара ... болса.

@бетте

@қолда

@бастың түкті бөлігінде

@аяқта

@арқада

~Ашық жарақаттану жағдайларында вакцинация жасалмаған балаларға ... енгізіледі.

@сіріспеге қарсы сары су (сыворотка)

@сіріспеге қарсы анатоксин

@гангренаға қарсы сары су (сыворотка)

@гамма-глобулин

@антирабикалық сары су (сыворотка)

~Тері жамылғыларының жарақаттану жағдайларында вакцинация жасалған балаларға ... енгізіледі.

@сіріспеге қарсы анатоксин

@антирабикалық сары су (сыворотка)

@гамма-глобулин

@гангренаға қарсы сары су (сыворотка)

@сіріспеге қарсы сары су (сыворотка)

~Балаларда ересектерге қарағанда жараны алғашқы хирургиялық өңдеу жүргізу ерекшелігіне ... жатады.

@жара шеттерің үнемдеп кесу

@жара шеттерін үлкен етіп кесу

@жара болған жерді ойып алып тастау

@жараның ішіне майлы дәрілерді енгізу

@жараны асептикалық еретінділермен жуу

~Жаралардың жазылуында ... фазасы бар.

@регенерация

@компенсация

@декомпенсация

@термикалық

@интоксикациялық

~Жаралардың жазылуында ... фазасы бар.

@реорганизация

@компенсация

@декомпенсация

@термикалық

@интоксикациялық

~Жаралардың жазылуында ... фазасы бар.

@кабыну

@компенсация

@декомпенсация

@термикалық

@интоксикациялық

~Жаралардың жіктелуінде ... түрі жоқ.

@қызарған

@кесілген

ONTÜSTIK-QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Педиатрии-1 кафедрасы		
«Балалар хирургиясы» пәні бойынша оқу нәтижелерін қорытынды бағалауға арналған БӨҚ		044-38/19 76 беттің 60 беті

@жаншылған

@соғылған

@инфицирленген

~Жаралардың жіктеуінде ... түрі жоқ

@бозарған

@шағылған

@тесілген

@асептикалық

@іріңді

~Меккел дивертикул жарасынан қан кеткенде ... көрінеді.

@көп мөлшерде қанды нәжіс

@мелена

@көп мөлшерде қанды құсу

@үлкен дәретке отырғанда ауырсыну

@іштің ұлғаюы

~Асқазан жарасы қанаған кезде ... байқалады.

@көп мөлшерде қанды құсық

@үлкен дәретке отырғанда ауырсыну

@көп мөлшерде қанды нәжіс

@жөтелгенде қан аралас қақырық

@қасаға үстінің ауруы

~... Меккел дивертикулының асқынуларына жатпайды

@Обтурациялық өткізбеушілік

@Странгуляциялық өткізбеушілік

@Қан кету

@Қабыну

@Жараның пайда болуы

~Асқазан жарасының асқынуына ... жатпайды.

@пилороспазм

@қан кету

@перфорация

@қабыну

@пенетрация

~... қанды құсық болмайды.

@Өңеш ахалазиясында

@Өңештің халазиясында

@Брадиэзофагуста

@Өңештің дивертикулында

@Өңештің химиялық күйінде

~... кезінде спленэктомия жасауға болмайды.

@Гемофилия

@Верльгоф ауруы

@Гоше ауруы

@Туа болатын гемолитикалық анемия

@Порталды гипертензия

~Келесі ауруларда асқазан-ішек жүйесінде қан кету болады, оған ... жатпайды.

@жабысқақ ауруы

ONTÜSTIK-QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Педиатрии-1 кафедрасы		
«Балалар хирургиясы» пәні бойынша оқу нәтижелерін қорытынды бағалауға арналған БӨҚ		044-38/19 76 беттің 61 беті

@ішек инвагинациясы
 @жаралық энтероколит
 @жедел дизентерия
 @тік ішек полипі
 ~... ішектің қанауы байқалмайды.
 @Ішек лимфангиомасында
 @Дивертикулитте
 @Тік ішектің сызатында
 @Ішектің гемангиомасында
 @Тік ішек полипінде
 ~Асқазан-ішек жүйесіндегі қан кетудің жиі кездесетін түрі ... түрі болады.
 @венозды
 @артериалды
 @капилярлы
 @паренхиматозды
 @аралас
 ~Асқазан жарасы ауруының асқынған түрінде ... көрінбейді.
 @менингеалды белгілер
 @асқазанның дискомфорта
 @гематомезис
 @мелена
 @артериалды қысымның төмендеуі
 ~... мелена байқалады.
 @Меккел дивертикулында
 @Тік ішек гемангиомасында
 @Геморрой кезінде
 @Тік ішек сызатында
 @Тік ішек полипында
 ~Асқазан жарасы қанаған кезде диагнозды нақтылау үшін ... қолданылады.
 @ЭФГДС
 @УЗИ
 @МРТ
 @КТ
 @рентгенография
 ~10 жасар баланы 20 минут бұрын көлік қақты. Бала есінде, бірақ сұрақтарға дұрыс жауап бермейді, дене терісі бозғылт, перифериялық тамыр соғысы өте әлсіз. АҚ 70/40 мм.с.б. Диагноз қойылғаннан кейін ЕҢ қажетті іс - шара:
 @Қан тобымен резус сәйкестігін анықтау
 @Қан мен каналмастырғыларды құю
 @Ауырсынуды басатын препараттар енгізу
 @Құықты катетерлеу арқылы диурез өлшеу
 @Орталық және перифериялық көк тамырларды венесекциясы
 ~Жедел жәрдемнің дәргігерін 6 жастағы балаға шақырылған. Қарағанда жағдайы ауыр, қозған, есі бұзылған, тері жабындары гиперемияленген, қарашықтары күрт кеңейген, жарыққа реакциясы анықталмайды, цианоздың дамуымен, тыныс алудың бұзылуымен жүретін тонико- клониялық тыртысу ұстамалары анықталады. Пульсі 158 рет минутына. АҚҚ – 85/40 мм сын.бағ., Т – 38.

ONȚUSTIK-QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Педиатрии-1 кафедрасы		
«Балалар хирургиясы» пәні бойынша оқу нәтижелерін қорытынды бағалауға арналған БӨҚ		044-38/19 76 беттің 62 беті

Анамнезінен сол күні бала қыдырып жүріп шөп (белена) жегені анықталды. Ең ықтимал болжам диагнозыңыз қандай?

@Жедел улану

@Тыртысу синдромы

@Аллергиялық шок

@Мидің ісінуі

@Бас-ми шайқалуы

~Қабылдау бөліміне 3 жастағы бала жеткізілді. Бала әлсіз, тежелген, сұрақтарға жауап бермейді. Терісі бозғылт, қарашығы тарылған, көздің мөлдір қабық рефлексі жоқ. Гиперсаливация байқалады. Тынысы шулы, пульс минутына 130 рет, АҚ - 60/40 мм сын.бағ., сіңір рефлекстері әлсіз. Анамнезінен бала әжесінің ұйықтататын дәрілерімен ойнағандығы анықталды. Ең тиімді ем шаралардың реттілігі:

@Трахеяны интубациялау, асқазанды жуу, активтелген көмір, тұзды іш жүргізетіндер, оксигенация, қан алмастырғыштар

@Диуретиктер, ЖӨЖ, айналымдығы қан көлемін жоғарылату

@Венаға қаналмастырғыштар, асқазанды жуу

@ЖӨЖ, қан алмастырғыштар құю

@Асқазан зондын енгізу, іш жүргізетін дәрілер, оксигенотерапия, плазма, қан алмастырғыштар құю

~Қарқынды емдеу палатасына кезекші дәрігер 6 айлық баланы екі жақты бронхопневмония диагнозымен ауыстырды. Жүргізіліп жатқан терапияның үстінен балада температурасы 39,0 және қалтырау пайда болды. Науқасм қозған, есі анық емес, тыныс алудың бұзылуымен жүретін тонико-клоникалық тыртысу анықталады. Ерін-мұрын үшбұрышында цианоз, акроцианоз да анықталады. Пульсі 153 рет минутіне, толығы орташа. Ең ықтимал асқынуы:

@Инфузияға пирогенді реакция

@Мидің ісінуі

@Гипертермиялық синдром

@Тырысу синдромы

@Септикалық жағдай

~Жедел жәрдемнің дәргігері 6 жастағы балаға шақырылған. Қарағанда жағдайы ауыр, қозған, есі бұзылған, тері жабындары гиперемияленген, қарашықтары күрт кеңейген, жарыққа реакциясы анықталмайды, цианоздың дамуымен, тыныс алудың бұзылуымен жүретін тонико-клоникалық тырысу ұстамалары анықталады. Пульсі 158 рет минутына. АҚҚ – 85/40 мм сын.бағ., Т – 38,5 Анамнезінен сол күні бала қыдырып жүріп шөп (белена) жегені анықталды. Ең алғашқы көмекті көрсетіңіз?

@Тырысқаққа қарсы шаралар

@Дезинтоксикациялық шаралар

@Ісікке қарсы заттар

@Атропиннің антидоты

@Десинсибилизируеуші заттар

~Наркозбен жедел аппендицитке операция жасау кезінде лоқсу құсу байқалды. Науқасты жүргізу тактикасының Ең қолайлысы қайсы?

@Ауыз қуысын тазалау, ауа өткізгіш енгізу, асқазан зондын енгізу, оң нәтиже болса наркозды тереңдету операцияны жалғастыру

@Операцияны лоқсығанына қарамай жалғастыра беру

@Ауыз қуысын тампонмен, электрлік сорғышпен құсық массасынан тазартып, ауа өткізгіш түтік енгізу

ONTÜSTIK-QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Педиатрии-1 кафедрасы		
«Балалар хирургиясы» пәні бойынша оқу нәтижелерін қорытынды бағалауға арналған БӨҚ		044-38/19 76 беттің 63 беті

@Асқазан зондын енгізу, наркозды тереңдету, ауыз қуысын тазалау

@Ауа өткізгіш енгізу, асқазан зондын енгізу, наркозды жалғастыру

~2 айлық балада арқасындағы көлемі 1х2 см мөлшеріндегі гемангиоманы алып тастау операциясынан кейін 5 сағат өкен соң дене температурасы 39,8С-қа жоғарылады. Терісі бозғылт, бала адинамиялы. Жүйелі емдеу тактикасының ЕН қолайлысы:

@Баланы салқындату, антипиретиктер, литикалық қоспа, организмнің гидратациясы

@Теріні сұрту, антипиретиктер

@Антипиретиктер, инфузиялық терапия, диуретиктер

@Литикалық қоспа, баланы салқындату, инфузиялық терапия

@Венаға 10% глюкоза 50 мл/кг салмағына, диуретиктер, литикалық қоспа

~Бала 4 жаста, еңтікпе, цианоз, тахикардия, парциальды қышқылдың 60-70мм.с.б дейін төмендеуі, рентген суретінде екі жақ бөлікте «снежная буря», өкпелік тіннің инфильтрациясы жоғарыланған. Оттегілік терапия кезіндегі типтік асқынуы.

@ателектаз

@өкпелік эмболия

@бронхтардың обструкциялық бөлінісі

@пневмония

@плеврит

~Аяқ-қол жарақатымен 6 жастағы баланы жедел жәрдем машинасында жарақат алған жерден тасымалдау кезінде балада кенет тері жабындыларының бозаруы, қарашықтарының кеңеюі, кәрі жілік артериясының пульсі анықталмауы байқалды. Сіздің жасайтын шараларының кезектігі:

@жүрекке жабық массаж, біруақытта венесекция және венепункция, реополиглюкин, қан, ауырсынуды басатын заттар, сынған орынға блокада және иммобилизация

@ауырсынуды басатын заттар, новокаинды блокада, жүрекке жабық массаж, инфузиялық терапия

@көктамырға полиглюкин, ауырсынуды басатын заттар, иммобилизация, жүрекке жабық массаж

@аяқ-қолды иммобилизациялау, көктамырға реополиглюкин, қан, ауырсынуды басатын заттар

@сынған орынға новокаинды блокада

~Бала, 5 жаста. Дәрілік перепараттармен уланудан ккейін ес-түссіз жағдайда жатыр. Асқазанды жуу қажет. Неліктен асқазанды жуу тек қана трахеяның интубациясынан кейін жасалу керек?

@аспирация дамуы мүмкін

@патологиялық бронхоспазм дамуы мүмкін

@патологиялық ларингоспазм дамуы мүмкін

@Тренделенбург қалпында бұл қауіпсіз

@Фовлер қалпында бұл қауіпсіз

~ДВС-синдромның 1 сатысында не анықталады:

@қан ұю уақытысының қысқаруы

@қан ұю уақытысының ұзаруы

@қан ұю белгілері өзгермейді

@инъекция жерлерінен қан ағу

@мұрыннан қан ағу

~"Ауызға ауыз" тәсілінің ең тиімді критеріі:

@ауамен үрлеген кезде кеуде қуысының кеңеюі және оның пассивті тыныс шығаруда төмендеуі

@пульстің пайда болуы

@қарашықтың тарылуы

@АҚ жоғарылауы

@АҚ төмендеуі

ONTÜSTIK-QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Педиатрии-1 кафедрасы		
«Балалар хирургиясы» пәні бойынша оқу нәтижелерін қорытынды бағалауға арналған БӨҚ		044-38/19 76 беттің 64 беті

~Этил спиртімін уланғанда ... болады.

@метаболикалық ацидоз

@тыныстық ацидоз

@КЩС-тың аралас бұзылыстары

@тыныстық алкалоз

@метаболикалық алкалоз

~Асқазан зондының ұзындығы ... болады.

@мұрын қанатынан төстің семсер тәрізді өсідісіне дейін

@иектен кіндікке дейін

@5 см/кг баланың салмағына

@иектен қасағаға дейін

@иектен мойындырық ойығына дейін

~Нәрестелердегі жүретін тікелей емес массажы кезінде төс қандай тереңдікке түседі:

@1-2 см

@төстің омыртқа аралығының 1/3

@төстің омыртқа аралығының 1/2

@төстің омыртқа аралығының 2/3

@2-3 см

~Жүрек тоқтауының қорытынды диагнозын ... негізделіп қойылады.

@ЭКГ

@Ұйқы атериясында пульстың болмауы

@Қарашықтың кеңеюі

@ЭЭГ

@Естің болмауы

~Реанимация уақытында ми ісінуінің алдын – алу:

@Басына салқын қою, көк тамырға ГОМК енгізу, альбумин, жасанды өкпе тынысын бастау

@Көк тамырға глюкоза енгізу, тыныс стимуляторларлары

@Допамин тағайындау, жүрек гликозидтері, камфора

@Лазикс енгізу, аспирин, қатырылған плазма енгізу

@Қанын шығару, горчичник қою

~12 жастағы зәбірленушіні 15минуттан кейін салқын судан алып шығады. Негізгі көрсететін көмек:

@Тыныс жолдарынан судан босату, дренаждық қалыпқа жатқызып, жүрек – өкпелік реанимациясын жасау

@Жақын медициналық мекемеге транспортировка жасаған соң реанимациялық шераларды қолдану

@Тыныс жолдарын тазартуға уақыт жоймай, жүрек – өкпелік реанимациясына көшу

@Ешқандай реанимациялық шералар қолданбаймыз

@Жедел жәрдем шақыру

~Бала 3 жаста ЛОР бөлімшесінен реанимация бөлімшесіне түсті. Көмейден бөгде денесі алынды.

Жалпы жағдайы ауыр, айқын цианоз, инспираторлық енгігу. Тыныс алуына көмекші бұлшық еттер қатысады. Артериальды және венозды қысым жоғарланған, тамыр соғысы жиіленген, Өкпеде везикулярлы тынысы әлсіз, құрғақ сырылдар естіледі. Дыбыс естілуі әлсіз. Сіздің диагнозыңыз?

@Көмей ісінуі

@Ателектаз

@Бронхоспазм

ONTÜSTIK-QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Педиатрии-1 кафедрасы		
«Балалар хирургиясы» пәні бойынша оқу нәтижелерін қорытынды бағалауға арналған БӨҚ		044-38/19 76 беттің 65 беті

@Өкпе ісінуі

@Сол қарыншалық жетіспеушілік

~Көбіне парадоксальды тыныстың жиі ... болады.

@Пневмоторакста

@Ателектазда

@Пневмонияда

@Ларингоспазда

@Басқарылмалы вентиляцияда

~Эндотрахеалды интубацияны қойғаннан соң ... іс-әрекет қажет.

@оң және сол өкпені аускультация жасау

@тері жабындысының түсін

@көкірек клеткасының рентгенографиясы

@өкпе ұшын перкуссия жасау

@асқазанды перкуссия және аускультация жасау

~Бір жасқа дейінгі балаларда қанша мөлшерде қан жоғалтқан кезде геморрагиялық шок дамиды.

@5%

@10- 15%

@20- 25%

@25- 30%

@30% және одан жоғары

~Аурухананың қабылдау бөліміне 8 жастағы ұл бала ауыр халде, көру галлюцинациясына, аузының құрғауына, дене қызуының жоғарылауына, тыныс алуының қиындауына шағымданумен келіп түсті. Бала қозған, тыныс алуы хаотипті, беті гиперемияленген, шырышты және тері жамылғысы құрғақ, қарашықтары ұлғайған, жарыққа әсері жоқ, пульсі 140/мин. АҚҚ-60/40мм сын.бағ. Анамнезінен бала макке ұқсас қою сұр түсті дөңдерді жегенін ғана анықтау мүмкін болды. Емдік шаралар:

@асқазанды жуу

@тазарту клизмасы

@активирленген көмірді беру

@тұзды сумен клизма жасау арқылы ішті жібіту

@форсирленген диурез

~Трахеяны интубациялауға қажет құрал-жабдықтар:

@ларингоскоп, эндотрахеальдық түтік, өткізгіш, коннектор

@эзофагоскоп, ауыз кеңейткіш, қайшы

@эндотрахеальды түтік, коннекторлар, қайшы

@коннекторлар, эзофагоскоп, бронхоскоп

@бронхоскоп, өткізгіш, қайшы

~Балалардағы жедел тыныс алу жетімсіздігінің себебі:

@тыныс алу жолдарындағы бөгде заттар

@Рейно ауруы

@«құйғы» (воронка тәрізді кеуде клеткасы)

@«жырық» ерін

@пневмония

~Натрий иондарының плазмадағы концентрациясы:

@135 - 145 ммоль/л

@130 - 135 ммоль/л

@23 - 30 ммоль/л

ONTÜSTIK-QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Педиатрии-1 кафедрасы		
«Балалар хирургиясы» пәні бойынша оқу нәтижелерін қорытынды бағалауға арналған БӨҚ		044-38/19 76 беттің 66 беті

@130 - 142 ммоль/л

@135 - 150 ммоль/л

~Ересек адамдармен салыстырғанда балаларда сынықтардың кездесу жиілігінің кішірек болуы және ауырлығы ... деп түсіндіріледі.

@дене салмағының аздығымен, бала қаңқасының шеміршек ұлпасына бай болуымен, сүйектердің сүйекүсті қабының жақсы дамуымен

@сүйектердің көбірек минерализациялануымен, балалар қаңқасының шеміршек ұлпасына бай болуымен

@балалардың көп қозғалғыштығымен, абайламауымен және аз салмағымен

@сүйектердің көбірек жұқалығымен, көбірек минерализациялануымен

@балалардың көп қозғалғыштығымен, абайламауымен, сүйектердің сүйекүсті қабының жақсы дамуымен

~Төмендегі сынықтардың ... түрі балаларға тән.

@эпифизеолиз және остеоэпифизеолиз

@жарғышақты (оскольчатый)

@бұрыштық ығысумен

@ені бойынша үлкен ығысумен

@сан сүйегі мойнының сынықтары

~Білек сүйектерінің сынығына күдіктену ... инструментальді зерттеуді талап етеді.

@білек сүйектерінің екі проекциядағы рентгенографиясы

@УДЗ

@радиоизотопты зерттеу

@МРТ,КТ

@артроскопия

~Аяқ-қолдың терең үсіктері кезінде алғашқы жәрдемге ... жатады.

@термоизоляциялық таңғыш салу

@жылы суға салу

@қармен, жүнмен укалау

@укалаудан кейін майлы - бальзамды таңғыш салу

@футлярлы новокаинді блокада

~Төменде көрсетілген балалар травматизмінің түрлерінің ... алдын - алу жеңілірек.

@далалық транспорттық, ұйымдастырылған спорттық

@тұрмыстық, далалық, транспорттық

@далалық транспорттық, ұйымдастырылған спорттық

@мектептік, тұрмыстық

@ұйымдастырылмаған спорттық, далалық спорттық

~Балалардағы сүйек жарғышақтарының ығысуының ... түрі мұқият жоюды талап етеді.

@бұрыштық

@ұзындығы бойынша

@ені бойынша

@жарғышақты

@қиғаш

~Балалардағы сүйек жарғышақтарының ығысуының ... түрі мұқият жоюды талап етеді.

@буын ішілік

@ұзындығы бойынша

@жарғышақты

@ені бойынша

ONTÜSTIK-QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Педиатрии-1 кафедрасы		
«Балалар хирургиясы» пәні бойынша оқу нәтижелерін қорытынды бағалауға арналған БӨҚ		044-38/19 76 беттің 67 беті

@иғаш

~Сынықтарды емдеудің ... түрі балаларда көбірек қолданылады.

@қаңқалық және лейкопластрлік тарту

@компрессионды остеосинтез

@интрамедуллярлы остеосинтез

@ашық түзету

@Илизаров аппаратын қолданылатын

~Күйіктік шокты ... шоктың түріне жатқызады.

@гиповолемиялық

@оксикалық

@ауырсынулық (болево́й шок)

@септикалық

@кетацидоздық

~Күйіктік шоктың негізгі еміне ... жатады.

@патологиялық сұйықтық жоғалтуды қалпына келтіруге бағытталған

@инфузионды ем

@ауырсынуды жоятын ем

@антигистаминді және протеолиз ингибиторлерін енгізу

@антибактериальді препараттардың үлкен дозалары

стероидты гормондарды тағайындау

~Білектің ортаңғы үштен бір бөлігінің рентгенограммасында кортикальді қабаттың бұзылуымен бірге екі сүйектің де бұрыштық деформациясы анықталады. Сынықтың түрін анықтаңыз:

@«жасыл шыбық» түрі бойынша сынық

@шыбық сүйектің сүйекүсті астылық сынығы

@білек сүйектерінің эпифизеолизіне

@білек сүйектерінің типті жерінде сынуы

@жасөспірімдік эпифизеолиз

~Шыбық сүйектің метафиз аймағының рентгенограммасында сүйектің кортикальді қабатының деформациясы анықталады. Сынықтың түрін анықтаңыз:

@шыбық сүйектің сүйекүсті астылық сынығы

@«жасыл шыбық» түрі бойынша сынық

@білек сүйектерінің типті жерінде сынуы

@шыбық сүйектің басының жұлынуы

@жасөспірімдік эпифизеолиз

~Білектің төменгі үштен бір бөлігінің рентгенограммасында екі сүйектің де метаэпифиздерінің сүйек енінің жартысына дейін ығысуы бар. Сынықтың түрін анықтаңыз:

@білек сүйектерінің типті жерінде сынуы

@«жасыл шыбық» түрі бойынша сынық

@білек сүйектерінің эпифизеолизіне

@шыбық сүйектің (radius) басының жұлынуы

@білек сүйектерінің диафизді сынығында

~Білек сүйектерінің сынығына күдіктенуде алғашқы көмек ... талап етеді.

@екі буынды фиксациялау арқылы иммобилизациялау

@жергілікті новокаинді блокада

@Дезо таңғышы

@үш буынды фиксациялау арқылы иммобилизациялау

@жергілікті новокаинді блокада, Дезо таңғышы

ОҢТҮСТІК-ҚАЗАҚСТАН MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Педиатрии-1 кафедрасы		
«Балалар хирургиясы» пәні бойынша оқу нәтижелерін қорытынды бағалауға арналған БӨҚ		044-38/19 76 беттің 68 беті

~Жарақаттан кейінгі омыртқалардың сүйір өсінділдерінің пальпациясы кезіндегі ауырсыну ... кезде негізгі симптомға жатады.

@омыртқа денесінің компрессионды сынығы

@арқаның жарасы

@бас-ми жарақаты

@сколиоз

@бүйрек жарақаты

~Арқа жарақаты кезінде келесі зерттеу көрсетілген:

@екі проекциядағы омыртқа рентгенографиясы

@УЗИ

@Теплография

@КТ

@миография

~Жарақат алған балада спондилограммада омыртқа денелерінің биіктігінің кішіреюі ... көрсетеді.

@омыртқа денесінің компрессионды сынығын

@арқа соғылуын

@омыртқа денелерінің жартылай шығуын

@сколиоз

@кифоз

~Есін жоғалту, жалпы гипотония, бозару, профузды терлеу, шырышты қабаттардың ылғалдылығы, ұстама белгілері ... тән.

@гипогликемиялық комаға

@диабеттік комаға

@бас-ми жарақатына

@улануға

@бассүйекішілік аневризманың жарылуына

~Есін жоғалту, сирек, беткей тыныс алу, тахикардия, АҚ жоғарылауы, анизокория, гепипарез, аспен қайталап құсу ... тән белгілер.

@бас-ми жарақатына

@диабеттік кома

@гипогликемиялық кома

@алкогольмен улану

@эпилепсия

~Айқын неврологиялық белгілері жоқ бас-ми жарақатын алған балаға зерттеуді бастаған кезде ... бастау керек.

@бассүйек рентгенографиясы

@ЭКГ

@ЭХО-ЭГ

@МРТ немесе КТ

@контрастілі магнитті-резонансті зерттеуден

~Ұзын түтікті сүйектердің сүйекүсті астылық сынығына ... тән.

@ауырсыну

@патологиялық қозғалыс

@крепитация

@деформация

@гиперемия

~Балаларда ... кезде патологиялық сынықтар болуы мүмкін.

ONTÜSTIK-QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Педиатрии-1 кафедрасы		
«Балалар хирургиясы» пәні бойынша оқу нәтижелерін қорытынды бағалауға арналған БӨҚ		044-38/19 76 беттің 69 беті

@остеобластокластома

@Броди абсцесі

@остеонид остеомасы

@псевдоартроз

@қыртыстық дефект

~Тек қана сыныққа тән клиникалық белгі:

@аяқ-қол осіне остік күш салу кезіндегі ауырсыну

@қан тамыр суретінің айқын болуы

@ісіну, жергілікті ауырсыну, қан тамыр суретінің айқын болуы

@флюктуация, ісіну, жергілікті ауырсыну

@функция бұзылысы, ісіну, жергілікті ауырсыну

~Бас миының шайқалуына ... тән.

@реторградты амнезия

@«жарқын кезеңнің» болуы

@гемипарез

@клонико - тоникалық ұстама

@гемиплегия

~Омыртқа денелерінің компрессионды сынығы ... сипатталады.

@жарақат аймағында бұлшықет жастықшасының болуымен

@Тренделенбург симптомы

@Кернингтің оң симптомы

@омыртқа жотасының сколиоздық деформациясы

@омыртқа жотасының кифоздық деформациясы

~Шыбық сүйегінің басының жартылай шығуына балаларда ... тән.

@шұғыл ауырсынатын білек ротациялық қозғалысы

@крепитация

@патологиялық қозғалу

@шынтақ буынында қозғалыстың болмауы

@шынтақ буынының деформациясы

~Бас ми шайқалуы кезінде балаларда ... көрсетілген.

@седативті және витаминдік ем

@антибактериальды ем

@төсектік режим, құсуға қарсы препараттар, витаминдер

@амбулаторлы қарау және емдеу

@люмбальді пункция арқылы жұлын сұйықтығының санациясы

~Бассүйек негізінің сүйектерінің сынығына тән:

@«көзілдірік» симтпомы

@«жарқын» кезеңнің юолуы

@экстаркранеальді геметомы

@анизокория

@гемипарез

~...күйген түрлерінде тіндердің шағын терең бұзылыстары байқалады.

@ Электр тоғымен

@Жалынмен

@Термиялық

@ Сілтімен

@Қышқылмен

ONTÜSTIK-QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Педиатрии-1 кафедрасы		
«Балалар хирургиясы» пәні бойынша оқу нәтижелерін қорытынды бағалауға арналған БӨҚ		044-38/19 76 беттің 70 беті

~Балаларда күйіктік шоктың негізгі этиопатогенетикалық даму факторлары:

@ауырсыну және плазма жоғалту

@ҚС тепе-теңдіктің бұзылуы

@ОЖЖ функциясының бұзылуы

@қанда электролиттердің бұзылуы

@күсу және тұздарды жоғалту

~Күйікті жараны таңуды қайталап ... жүргізеді.

@шоктан шыққаннан соң

@12 сағаттан соң

@тәуліктен кейін

@алғашқы өңдеуден кейін 5 сағаттан соң

@эпителизацияның басталуынан соң

~Сынық орнын жансыздандыру үшін гематомаға 1%-тік новокаинді 5 жасар балаға қандай мөлшерде енгізу керек:

@5мл

@2 мл

@1мл

@10мл

@10мл дан көп

~5 жасар бала турниктен құлап, жарақат алған, шынтық буынының рентгенограммасында медиальді айдаршыкүстінің латерпозизиясы анықталады. Сіздің тактикаңыз:

@барлық аталғандар

@лейкопластырлік тартуды қолдану

@Киршнер бізі арқылы тарту

@жалімдік таруды қолдану

@гипс лонгетасын қолдану

~Балаларда травматикалық эпифизеолиздер ... болады.

@шыбық сүйегінің басында

@сан сүйектің диафизінде

@Үлкен жіліншік – Tibia метафизінде

@бұғана эпифизінде

@мықын сүйектің қанатында

~Қабылдау бөліміне 13 жасар бала келіп түсті. Шынтақ-білек буынының аймағындағы ауырсынуға (лучезапястного сустава), «штык» тәрізді деформацияға шағымданады. Рентгенограммада шыбық сүйектің (Radius эпифизінің сүйек фрагментімен ығысуы анықталған. Сынық түрін аңқтаңыз.

@шыбық сүйектің остеоэпифизеолизі

@шыбық сүйектің метафизінің сынығы

@шыбық сүйектің дистальді бөлігінің орнынан шығуы

@шыбық сүйектің дистальді эпифизінің эпифизеолизі

@шыбық сүйектің диафизінің сынығы

~6 жасар аяқ-қол жарақаты бар баланы оқиға орнынан транспортировка кезінде жедел жәрдем машинасында кенеттен тері жабындыларының бозаруы, қарашықтардың ұлғаюы, білек артериясында пульс анықталмайды. Сіздің болжамыңыз.

@травматикалық шок

@жүрек жетіспеушілігі

@қан тамыр жетіспеушілігі

ONTÜSTIK-QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Педиатрии-1 кафедрасы		
«Балалар хирургиясы» пәні бойынша оқу нәтижелерін қорытынды бағалауға арналған БӨҚ		044-38/19 76 беттің 71 беті

@жедел тыныс алу жетіспеушілігі

@іштен қан кету

~6 жасар аяқ-қол жарақаты бар баланы оқиға орнынан транспортировка кезінде жедел жәрдем машинасында кенеттен тері жабындыларының бозаруы, қарашықтардың ұлғаюы, білек артериясында пульс анықталмайды. Сіздің жәрдеміңіздің реті.

@жабық жүрек массажы, бір уақытта венесекция және венепункция, реополиглюкинді, қан енгізу, крови, ауырсынуды басатын және сынық орны блокадасы, иммобилизация

@жансыздандыру, новокаиндік блокада

@т/і полиглюкин, жансыздандыру, иммобилизация

@қол-аяқ иммобилизациясы, т/і реополиглюкин, қан, жансыздандыру

@сынық орнын новокаинді блокада

~Сан сүйегінің сынығы бар 6 жасар балада бақылау рентгенограммасында сүйек көлденеңінің 1/3-де сүйек жарғышақтарының ені бойынша ығысуы анықталады. Сіздің ойыңыз.

@ығысу болуы мүмкін

@ығысу болуы мүмкін емес

@ығысу сүйек көлденеңінің 1/2-не дейін бола алады

@ығысу 3/4-ке дейін бола алады

@толық көлденеңі бойынша ығысу бола алады

~Қаңқалық тартуда жатқан иық сүйегінің диафізінің қиғаш сынығы бар 7 жасар балада ұзындығы бойынша 2 см-ге жарғышақтардың ығысуы сақталады. Сіздің ойыңыз.

@салмақ көбейту арқылы ұзындығы бойынша ығысуды жою

@орынша қалдыру

@салмақ азайту арқылы ығысуды жою

@қаңқалық тартуды және қолмен репозицияны жүргізу

@операция жасау

~9 айлық балада сол жақ сан сүйегінің диафізінің сынығы кезінде Шеде бойынша лейкопластырлік тарту 14 күн жалғасуда. Сіздің тактикаңыз.

@консолидацияның клиникалық және рентгенологиялық бақылауы

@аяқтың абсолюттік ұзындығын анықтау

@баланы қаңқалық тартуда қалдыру

@тартуды шешу

@лонгета салу

~Білек сүйектірінің ортаңғы үштен бірінің сынығына және иммобилизациясына 5 күн өтті. Бала 10 жаста. Сіздің тактикаңыз.

@гипстік лонгетаның фиксациясының деңгейін тексеру

@бақылау рентгенограммасы

@гипстік лонгетаны шешу

@гипстік лонгетаны қалдыру

@жаңадан гипстік лонгета қою

~Иық сүйегінің айдаршық арқылы сынығының консолидациясынан кейін гипстік лонгета шешілді, шынтак буынында қозғалыс шектелген. Емдік шараларыңыз:

@жылулық процедуралар, активті және пассивті қозғалыстар, ЛФК

@сынық аймағын массаж

@гипстік лонгетаны шешу ғана

@новокаинмен электрофорез с новокаином

@парафиндік терапия

ONTÜSTIK-QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Педиатрии-1 кафедрасы		
«Балалар хирургиясы» пәні бойынша оқу нәтижелерін қорытынды бағалауға арналған БӨҚ		044-38/19 76 беттің 72 беті

~Иық сүйегінің айдаршық арқылы сынығымен 4 жасар бала ауруханаға түсті. Сүйек жарғышақтарының жабық бір моменттік репозиция жүргізілді, кейін Киршнер стержнімен фиксация және гипстік иммобилизация жасалды.Репозициядан кейін 12 күн өтті. Сіздің тактикаңыз.

@спицаларды алып, буынды қимылдатуды бастау

@жылулық процедуралар тағайындау

@спицаларды алып, иммобилизацияны жалғастыру

@иммобилизацияны жалғастыру

@спицаларды алмай, ЛФК, массаж,жылулық процедуралар

~4 жасар бала жарақат алғаннан соң 5 күннен кейін, тізе буынындағы ауырсыну, тұрақсыздық шағымдарымен түсті. Объективті: тізе буыны аймағындағы ісіну, қозғалыстың шектелуі, ауыспалы алдыңғы қорапша симптомының оң болуы. Тізе буынының рентгенограммасында сынық анықталмайды. Сіздің диагнозыңыз.

@алдыңғы крест тәрізді байламның зақымдалуы

@мениск зақымдалуы

@шеткі байламдардың зақымдалуы

@тізе буынының соғылуы

@артқы крест тәрізді байламның зақымдалуы 5.повреждение задней крестообразной связки

~Жамбас сүйектерінің жамбас сақинасының біртұтастығының бұзылуымен сынықтар кезінде төсек режимінің оптимальді мерзімі ...

@4-6 апта

@2-3 апта

@3-4 апта

@1-2 апта

@10-12 апта

~7 жасар салмағы 28 кг ось бойынша 1,5 см-ге жарғышақтардың ығысуымен сан сүйегінің диафизі сынығы бар балаға қаңқалық тарту қойылды. Сүйек жарғышақтарының ығысуын жою үшін ... салмақ қажет.

@6-7 кг

@1,5-2 кг

@5-4 кг

@5-5 кг

@0,5-1 кг

~Төменгі кеуде және бел омыртқаларының сынығы кезінде корсет ... уақытқа киіледі.

@2-3 апта

@1-1,5 апта

@2-2,5 ай

@3-4 ай

@8-10 ай

~Төменгі кеуде және бел омыртқаларының сына тәрізді сынығы кезінде корсет ... жағдайда салынады.

@жазылу жағдайында

@бүгілу жағдайында

@дененің бүйірге қарай бүгілуі

@орта физиологиялық жағдайда

@дененің бұрылу жағдайында

~Омыртқаның ... тұрақты деп аталады.

ONTÜSTIK-QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Педиатрии-1 кафедрасы		
«Балалар хирургиясы» пәні бойынша оқу нәтижелерін қорытынды бағалауға арналған БӨҚ		044-38/19 76 беттің 73 беті

@омыртқа денесінің алдыңғы бөлігінің сына тәрізді компрессиялы, биіктігінің 1/3-нен кемінің сынығы

@кеуде бөліміндегі омыртқа денесінің сына тәрізді компрессиялы, биіктігінің жартысына дейін сынығы

@снык-шығу

@омыртқа доғаларының сынығы

@буындық өсінділердің сынығы

~Есін жоғалту, тері жабындыларының бозаруы, суық тер, жеген тамақты құсуы, брадикардия ... тән.

@бас ми жарақатына

@диабеттік комаға

@гипогликемиялық комаға

@эпилепсияға

@ми гипоксиясына

~Жамбас-сан буынының аймағында қозғалыс кезіндегі ауырсыну, ақсау кезінде зерттеуді ... бастау керек.

@жамбас-сан буынының рентгенографиясы

@бел аймағының рентгенограммасы

@МРТ, КТ

@радиоизотопты қаңқа зерттеуі

@педиатр консультациясы

~Шыбық-білезік буынының аймағындағы ауырсыну, аздаған ісіну, функциясының бұзылуы ... белгілері.

@шыбық сүйегінің эпифизеолиздің

@«жасыл шыбық» сынығының

@шыбық сүйегінің метадиафизарлы ығысусыз сынығының

@шыбық сүйегінің басының үзілуінің

@Жұмсақ тіндердің соғылуы, гематомасы

~Білектің төменгі 1/3 бөлігінің рентгенограммасында екі сүйектің де метаэпифиздерінің сүйекін жартылай көлденеңіне ығысуы ... тән.

@білек сүйектерінің остеоэпифизеолизіне

@шыбық сүйегінің сүйек қабы асты сынығы

@«жасыл шыбық» сынығы

@білек сүйектерінің эпифизеолизіне

@шыбық сүйегінің басының жұлынуы

ОҢТҮСТІК-ҚАЗАҚСТАН MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ SKMA -1979-  SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»	
Педиатрии-1 кафедрасы	
«Балалар хирургиясы» пәні бойынша оқу нәтижелерін қорытынды бағалауға арналған БӨҚ	044-38/19 76 беттің 74 беті

ОҢТҮСТІК-ҚАЗАҚСТАН MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ SKMA -1979- SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»	
Педиатрии-1 кафедрасы	044-38/19
«Балалар хирургиясы» пәні бойынша оқу нәтижелерін қорытынды бағалауға арналған БӨҚ	76 беттің 75 беті

ОҢТҮСТІК-ҚАЗАҚСТАН MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ  SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»	
Педиатрии-1 кафедрасы	
«Балалар хирургиясы» пәні бойынша оқу нәтижелерін қорытынды бағалауға арналған БӨҚ	044-38/19 76 беттің 76 беті