

Педиатрия-1 кафедрасы

38 / 11

Бақылау өлшеу құралдары

12 беттің 1 беті

БАҚЫЛАУ ӨЛШЕУ ҚҰРАЛДАРЫ

Бағдарламаның 1 аралық бақылауға арналған сұрақтары

Пәні: «Ірінді хирургия».

Пән коды: R-ІН

ББ шифры мен атауы: 7R01123 «Балалар хирургиясы»

Оқу сағаты/кредит көлемі: 30 кредит

Оқу курсы мен семестрі: 1 курс

Педиатрия-1 кафедрасы
Бақылау өлшеу құралдары

38 / 11
12 беттің 2 беті

Шымкент 2025

Құрастырған: ассистент Н.С. Нарходжаев

Кафедра меңгерушісі:



PhD, қауымд.проф.Кемельбеков К.С.

Хаттама №

2

Күні

25. 09. 25

ONTÜSTIK QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Педиатрия-1 кафедрасы Бақылау өлшеу құралдары		38 / 11 12 беттің 3 беті

1) Науқас ұл бала 16 жаста ойнап жүріп құлап сол аяғын жарақатап алған жедел жәрдеммен қабылдау бөліміне жеткізілді. Тері астылық анықталды.

Үлкен тері астылық сан гематомасы болғанда бірінші кезекте қандай әдіс амалы жүргізіледі?

- a) пункция жасау
- b) тілу
- c) қысып тұратын байлау жасау
- d) құрғақ жылу басу
- e) мұз басу

2) 3 айлық қыз баланың кіндік сақинасында жұмсақ консистенциялы мөлшері 1,5х1,5 см іш қуысына оңай енетін, ауырсынусыз түзіліс байқалады. Кіндіктің толық жыланкөзінде операция жасаудың мақсатына қандай әдіс амал жатады?

- a) жыланкөз жолын кесіп алып тастау
- b) гемопломбамен жыланкөзді жабу
- c) ішекті кесіп алып тастау
- d) энтеростоманы шығару
- e) гастростоманы шығару

3) Науқас, 13 жаста. Шағымдары: оң жақ мықын аймағында және іштің төменгі бөліктерінде ауырсыну, жүрек айну, құсу, дене температурасының 38° С жоғарылауы 2 тәулік ауырады. Тілі құрғақ. Іші пальпацияда төменгі бөлімдерінде ауырсыну, осы жерде Щеткин-Блюмберг симптомы оң Ректальды тексеру кезінде тік ішектің ауырсынуы, Аппендикс тік ішекке жақын орналасқанда қандай әдіс арқылы аппендициттің бар екенің таба аламыз?

- a) саусақпен тік ішекті тексеру
- b) ирригография
- c) колоноскопия
- d) ректороманоскопия
- e) рентгенограмма

4) Бала 9 жаста. Хирургия бөлімінде сол жақ балтырдың жедел гематогенді остеомиелиті бойынша ем қабылдаған. 2 айдан кейін сол жақ балтырдың ортаңғы 1/3 бөлігінде патологиялық қозғалыс, деформация анықталады.

Жіті гематогенді остеомиелитке тән ерте рентгенологиялық белгілер болып табылады:

- 1) ұя остеопорозы
- 2) біркелкі остеопороз
- 3) остеосклероз
- 4) сүйектің кортикальды қабатының ақаулары
- 5) периостальды реакция

- a) 1;5
- b) 2;5
- c) 1;3
- d) 1;4
- e) 3;5

5) Перзантахан бөлімінде жаңа туған нәрестелерде іріңді хирургиялық аурулар қоздырғыштарының құрылымындағы салыстырмалы салмағы бойынша микроорганизмдерді өлтіретін ретпен атаңыз:

- 1) стрептококктар
- 2) ішектаяқшасы

ONTÜSTIK QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Педиатрия-1 кафедрасы Бақылау өлшеу құралдары		38 / 11 12 беттің 4 беті

3) стафилококктар

4) анаэробты инфекция

5) араласинфекция

a)3;1;2;4;5

b)1;2;3;4;5

c)5;4;1;2;3

d)3;2;1;4;5

e)3;2;5;4;1

6)Перзантахан бөлімінде жаңа туған нәрестелерде іріңді хирургиялық аурулар қоздырғыштарының құрылымындағы салыстырмалы салмағы бойынша микроорганизмдерді Нәрестенің ағзасына хирургиялық инфекцияның енуінің себебі қандай?

a)балада жергілікті иммунитет тапшылығы

b)ана ауруы

c)жасанды тамақтандыру

d)жаңа туылған нәрестеде жұқтырудың қосымша жолдарының болуы

e)мерзімінен артық жүктілік

7)6 жастағы Т деген бала ауруханаға ауруы басталғаннан кейін 3 – ші тәулікте келіп қаралды.Шағымдары дене қызуының жоғарылауы, бас ауруы, жауырын аймағындағы ауру сезімі. Қарау кезінде ісік тәрізді түзіліс, қызарған эрозирленген бетімен, жергілікті гиперемия, сонымен қатар бірнеше жыланкөздерден іріңді бөлініс шығып тұр.Қан сынамасында эр-3,5, Нв-125 г/л,ЭТЖ-18 мм/сағ.

Колонизация деп не аталады?

a)жаңа туылған нәрестенің ағзасында микробты флораның қоныстануы және сіңуі

b)жаңа туылған нәрестенің микробтық флорамен ұрықтануы

c)Петри тостағанына себілгеннен кейін микроорганизмдер колонияларының болуы

d)перзентхананың микробтық ауа спектрі

e)баланы сотталған анасымен колонияға орналастыру

8)Науқас 16 ж, хирургиялық бөлімшеге аппендикулярлыинфилтрат клиникасымен түсті. Соңғы тәулікте ауырсыну күшейген, қалтырау және 39⁰С дейін температурасы көтерілген. Аппендикулярлы инфилтраттың ең тән симптомы болып табылады?

a)іштің оң жағында тығызданудың болуы

b)лейкоцитоз

c)перистальтиканың болмауы

d)Щеткин оң симптомы

e)Воскресенский

9)Науқас 16 ж, хирургиялық бөлімшеге аппендикулярлыинфилтрат клиникасымен түсті. Соңғы тәулікте ауырсыну күшейген, қалтырау және 39⁰С дейін температурасы көтерілген. Аппендикулярлы инфилтратты абсцедирлеу белгісі болып қандай симптом табылады?

a)гектикалық қызба

b)қызба

c)дезинтоксикациялық және қабынуға қарсы терапиядан әсердің болмауы

d)бірнеше рет құсу

e)нәжіс пен газ кідірісі

10)Науқас, 13 жаста. Шағымдары: оң жақ мықын аймағында және іштің төменгі бөліктерінде ауырсыну, жүрек айну, құсу, дене температурасының 38° С жоғарылауы 2 тәулік ауырады Тілі құрғақ Іші пальпацияда төменгі бөлімдерінде ауырсыну, осы жерде Щеткин–Блюмберг симптомы оң Ректальды тексеру кезінде тік ішектің ауырсынуы, қабырғаларының

салбырауынсыз ЖҚА: лейкоциттер – 13×10^9 /л, гемоглобин – 118 г/л, ЭТЖ – 12 мм/час

Аппендикулярлы абсцессті емдеу әдісі болып қандай әдіс табылады?

- a) түзіліс үстінде ірінді ашу және дренаждау
- b) кең лапаротомия әдісі
- c) лапароскопиялық абсцессті дренаждау әдісі
- d) құрсақ қабырғасы арқылы абсцесстің пункциясы әдісі
- e) тік ішек арқылы абсцесстің пункциясы жасау әдісі

11) Ішек аралық абсцеске тән клиникалық белгісі болып қай симптомдары табылады?

- 1) тұрақты қызба
- 2) тұрақсыз нәжіс
- 3) бірнеше рет құсу
- 4) нәжіс пен газдың кідіруі
- 5) жоғары лейкоцитоз

a) 1,5

b) 2,3

c) 2,4

d) 1,3

e) 4,5

12) Дуглас кеңістігінің абсцессіне тән клиникалық белгісі болып қандай симптом табылады:

- 1) шырышпен жиі нәжіс және тенезмдер
- 2) ішектің тітіркену симптомы
- 3) нәжіс пен газдың кідіруі
- 4) бірнеше рет құсу
- 5) ректальді саусақпен зерттеу кезінде ауырсыну тығыздығының болуы

a) 1,5

b) 2,4

c) 1,3

d) 4,5

e) 2,3

13) жедел жәрдеммен 15 жаста қыз бала жеткізілді. Шағымдары: оң жақ мықын аймағында және іштің төменгі бөліктерінде ауырсыну, жүрек айну, құсу, дене температурасының 38°C жоғарылауы 2 тәулік ауырады. Тілі құрғақ. Іші пальпацияда төменгі бөлімдерінде ауырсыну, осы жерде Щеткин–Блюмберг симптомы оң Ректальды тексеру кезінде тік ішектің ауырсынуы, қабырғаларының салбырауынсыз

Дуглас кеңістігінің абсцесінде хирургиялық емдеу қай мүше арқылы ашу жүргізіледі?

- a) тік ішекті
- b) алдыңғы құрсақ қабырғасы
- c) қасаға
- d) қынап
- e) оң жақ мықын аймағында қиғаш кесінді

14) Диафрагма асты абсцеске тән клиникалық белгісі болып қандай рентген көрінісі табылады?

- a) рентгенограммада диафрагманың жоғары тұруы және өкпенің төменгі бөлімдеріндегі ылғалды сырылдар
- b) айқын білінетін ентігу
- c) нәжіс пен газ кідірісі
- d) бірнеше рет құсу
- e) құрғақ жөтел

ONTÜSTIK QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Педиатрия-1 кафедрасы Бақылау өлшеу құралдары		38 / 11 12 беттің 6 беті

15)Науқас ұл бала 17жаста, температураның көтерілуіне, демікпеге, қабырғаастында және көкіректің оң жақ жартысында ауырсынуға шағымданып қабылдау бөлімшесіне хирургке қаралды. Анамнезде: ай бұрын жұмыста жарақат алған. Объективті тексерісте ауырсынған ұлғайған бауыр, оң жақ бұғана үсті ауырсыну, диафрагманың оң жақ күмбезінің жоғары тұруы және гектикалық безгектік болған.

Диафрагма асты абсцессті емдеу әдісі болып қандай операциялық жол тиімді болып табылады?

- а)плеврадан тыс кіру, қабырға аралық кеңістікте ашу және дренаждау әдісі
- б)кең лапаротомия
- с)абсцесстің қайталанған пункциясы
- д)плевра қуысы арқылы ашу
- е)консервативті емдеу

16)Пневмония кезінде абдоминалды синдромы бар балада жедел аппендицитті болдырмау немесе растау үшін зерттеудің шешуші әдісі болып қандай әдіс табылады?

- а)іштің табиғи немесе медикаментозды ұйқы жағдайында пальпациясы жасау
- а)ректалды зерттеу
- б)іш қуысы мүшелерінің шолу рентгенографиясы
- с)Іш қуысының УДЗ
- д)компьютерлік томография

17)Қабылдау бөліміне ауру басталғанына бір тәуліктей болған жедел аппендицит диагнозымен 2 жасар бала жеткізілді. Ауру дене қызуының 38,6°С-қа дейін күрт көтерілуімен, түшкірумен, жөтелмен басталған. Айқын ентікпе. Тынысы қатқыл, жекеленген ылғалды сырылдар естіледі. Тілі ылғалды. Пульсі 106 рет/мин. Бала қарауға қарсылық білдіреді, жылайды, ішін тартады. Тексеру әдісі жіті аппендицитті растайды Жаңа туылған нәрестелерде жедел аппендицит кезінде аппендэктомия қандай тәсілмен қолданылады?

- а)лигатуралық тәсілмен
- б)кисетті тігіске культяны батыру
- с)табынды таңумен және оны кисетті және S тәрізді тігістерге батыру
- д)табынды таңумен және оны кисеттік тігіске батырып
- е)кисетті тігіс салу

18)Науқас 16 жаста Шағымдары: іштің барлық бөліктерінің ауырсынуы, көбінесе оң жақтан, ауыздың құрғауы, жүрек айну Іші ауырсынумен, тақтай тәрізді қатайған, Щеткин – Блумберг симптомы барлық бөліктерінде оң, көбінесе оң жақ бөлігінде Құрт тәрізді өсіндіні алып тастаудың заманауи әдісі болып табылады?

- а)лапараскопиялық
- б)батырылған
- с)фиброколоноскопиялық
- д)инвагинациялық
- е)ретроградты

19)Науқас 16 жаста Шағымдары: іштің барлық бөліктерінің ауырсынуы, көбінесе оң жақтан, ауыздың құрғауы, жүрек айну Іші ауырсынумен, тақтай тәрізді қатайған, Щеткин – Блумберг симптомы барлық бөліктерінде оң, көбінесе оң жақ бөлігінде Жіті аппендицитке тән оң симптом?

- а)Филатова
- б)Ортнер симптомы
- с)Валя симптомы
- д)Кохер симптомы
- е)Кулекамф симптомы

ONTÜSTIK QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Педиатрия-1 кафедрасы Бақылау өлшеу құралдары		38 / 11 12 беттің 7 беті

20)Науқас 16 жаста Шағымдары: іштің барлық бөліктерінің ауырсынуы, көбінесе оң жақтан, ауыздың құрғауы, жүрек айну Іші ауырсынумен, тақтай тәрізді қатайған, Щеткин – Блумберг симптомы барлық бөліктерінде оң, көбінесе оң жақ бөлігінде Жайылмалы перитонитте операция қай уақытта жасалады?

- a)операция алдындағы дайындықтан кейін 2-3 сағаттан кейін
- b)операция алдындағы дайындықтан кейін 7-8 сағаттан кейін
- c)операция алдындағы дайындықтан кейін 6-12 сағаттан кейін
- d)шұғыл, операция алдындағы дайындықтан10 сағаттан кейін
- e)операция алдындағы дайындықтан кейін 24 сағаттан кейін

21)Жайылған перитонитте операциялық араласудың қандай принципті сәті болып табылады?

- a)кең орта лапаротомия
- b)оң жақ мықын аймағында кең қисық тілік
- c)мықын аймағына екі микроирригаторларды орнату
- d)санация жүргізбей іріңді экссудатты жою
- e)құрсак қабырғасын тампонға дейін тігу

22)Жаңа туған нәрестенің перитонитінде ең ақпараттық рентгенологиялық зерттеу болып табылады?

- a)вертикальды шолу рентгенографиясы арқылы
- b)латеропозициядағы іш қуысының шолу рентгенографиясы
- c)бариймен ирригография
- d)ауамен ирригография
- e)арқадағы қалыпта іш қуысының шолу рентгенографиясы

23)Екіншілік перитониттің рентгенологиялық белгілеріне тән болады?

- a)іштің төменгі бөліктеріндегі гомогенді қараюлар белгілері
- b)Клойбердің көптеген ұсақ тостағандары
- c)ішекте газ кедейлігі
- d)Клойбердің кең көп емес тостағандары
- e)іштің жоғарғы бөліктерінде қараюлар

24)Жаңа туған нәрестелердің перитонитінде операцияға абсолюттік көрсеткіш болып қандай перитонит түрі табылады?

- a)екіншілік перитонит
- b)перитониттің кез келген түрі
- c)біріншілік перитонитті
- d)жергілікті перитонитті
- e)жайылған перитонитті

25)Ішектің некрозымен кең таралған перитонит кезінде операция қандай әдсін жасайды?

- a)Қосэнтеростомасалынуменішекрезекциясы
- b)ішек анастомозы
- c)энтеростоманы салу
- d)колостоманы салу
- e)гастростомды салу

26)Жаңа туған нәрестелерде операцияғаабсолютті көрсеткіш болып табылады?

- a)екіншілік (перфоративтік) перитонит
- b)перитониттің кез келген түрі
- c)бастапқы (перфоративтік емес) перитониті
- d)жергілікті перитониті
- e)жайылған перитониті

ONTÜSTIK QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Педиатрия-1 кафедрасы Бақылау өлшеу құралдары		38 / 11 12 беттің 8 беті

27) Стафилококты жаралы-некротикалық энтероколит кезінде пайда болған перфоративті перитонитте оперативтік емдеу көрсеткіші болып табылады?

- 1) құрсақ қуысына микроирригаторларды орнату
- 2) тоқ ішектің перфорациясын тігу
- 3) «соңы-соңына» анастомозды салумен ішектің зақымданған бөлігін резекциялау
- 4) лапаростомия
- 5) ішектің екі шетін шығара отырып, ішектің зақымданған бөлігін резекциялау

- a) 1; 5
- b) 1; 2
- c) 3; 4
- d) 1; 3
- e) 2; 5

28) 2 айлық бала ауырғаннан соң 16 сағаттан кейін келіп түсті. Анасының айтуынша, баланың шағымдары мазасыздыққа, оң жақ шап аймағындағы ісік тәрізді түзіліс. Баланың жалпы жағдайы орташа ауырлықта. Дене қызуы қалыпты. Жергілікті қарау кезінде оң жақ шап аймағында ұрық бауы бойымен ұмаға түсетін, көлемі 1.0x1.5 см болатын, пальпацияда қатты ауырсынатын, қатты эластикалық құрылымды және құрсақ қуысына енбейтін ісік тәрізді түзіліс анықталады.

Амбулаторлық жағдайда консервативті ем көрсетілген:

- a) қарапайым омфалитте
- b) іріңді омфалитте
- c) кіндік флегмонасында
- d) кіндік гангренасында
- e) уремиялық омфалитте

29) 2 айлық бала ауырғаннан соң 16 сағаттан кейін келіп түсті. Анасының айтуынша, баланың шағымдары мазасыздыққа, оң жақ шап аймағындағы ісік тәрізді түзіліс. Баланың жалпы жағдайы орташа ауырлықта. Дене қызуы қалыпты. Жергілікті қарау кезінде оң жақ шап аймағында ұрық бауы бойымен ұмаға түсетін, көлемі 1.0x1.5 см болатын, пальпацияда қатты ауырсынатын, қатты эластикалық құрылымды және құрсақ қуысына енбейтін ісік тәрізді түзіліс анықталады.

Омфалиттің некроздық түрінде қандай белгілермен көрсетілген?

- a) гиперемия аймағындағы көптеген кермектер
- b) кіндікті радикалды кесу
- c) кіндік бойымен кесу
- d) радиалды тіліктер
- e) некроз аймағында бір тілік

30) Псевдофурункулез-бұл қандай бездердің қабынуы болып табылады?

- a) тер бездердері
- b) май безі
- c) эпидермис
- d) дерма
- e) тері асты клетчаткасы

31) Псевдофурункулезге тән жергілікті клиникалық белгі болып табылады?

- a) "бұршақ" түріндегі терінің тығыздануы
- b) орталығында тері гиперемиясы және флюктуациясы бар шектеулі ісік тәрізді түзілімдер
- c) географиялық шеттері бар тері гиперемиясы
- d) анық шекарасыз тері гиперемиясы
- e) ортасындағы іріңді-некротикалық өзегі бар конус тәрізді инфильтраттар

32) Псевдофурункулезді емдеу – бұл қандай жолмен іске асырылады?

- a) барлық қабыну ошақтарын ашу және антибиотиктерді парентеральды енгізу
- b) сау тіндердің ішінде псевдофурункулдарды кесу
- c) антибиотиктерді энтеральды енгізу
- d) гиперемия учаскесінде радиалды тіліктер
- e) жақпа таңғыш және парентеральды антибиотиктер

33) Балалардағы некротикалық флегмонның ағымының ерекшелігі?

- a) процестің жылдам таралуы
- b) ЭТЖ жоғарылау
- c) жоғары температура
- d) лимфа түйіндерінің инфильтрациясы
- e) ірінді ыдырау

34) Жаңа туылған нәрестелердегі адипонекроз бұл – қай тіннің зақымдалуы?

- a) тері асты май клетчаткасының асептикалық некрозы
- b) тері асты май клетчаткасының септикалық некрозы
- c) маз безінің некрозы
- d) тер безінің некрозы
- e) сілекей безінің некрозы

35) Жаңа туған нәрестелерде адипонекроз емдеу әдісі қандай?

- a) жергілікті емдеуді қажет етпейді
- b) консервативті, Вишневский майымен таңғыш
- c) УФО
- d) УВЧ
- e) жапсырмалар

36) Жаңа туылған нәрестелердің некротдық флегмоны үшін тән жергілікті клиникалық белгілері қандай?

- a) зақымдалған аймақтың ортасында қараңғыланған және қалыс қалған тез таралатын тері гиперемиясы
- b) терінің тығыздығы (гиперемиясыз), оның бетінен жоғары
- c) ортасында ісіну және флюктуациясы бар тері гиперемиясының
- d) нақты "географиялық" шекарасы бар терінің гиперемиясының
- e) ортасындағы ірінді-некротикалық өзегі бар конус тәрізді инфильтраттар

37) Науқас 10 жаста Шағымдары: іштің барлық бөліктерінің ауырсынуы, көбінесе оң жақтан, ауыздың құрғауы, жүрек айну Іші ауырсынумен, тақтай тәрізді қатайған, Щеткин – Блюмберг симптомы барлық бөліктерінде оң, көбінесе оң жақ бөлігінде

Аппендициттің флегмонозды түрі гангренозды түрге өзгергенде қандай белгілер байқалады?

- a) интоксикацияның жоғары болуы
- b) жүрегінің айнуы
- c) көп рет құсуы
- d) сұйық нәжістің болуы
- e) еңтігу

38) 13 жасар қыз балада үш күннен бері іші ауырады, дене қызуының көтерілуі, құсу болған.

Қарағанда қыз бала бозарған, солғын, іш ауырсынуына шағымдануда. Дене қызуы 37,9С. Іші кеппеген, пальпацияда оң жақ мықын аймағында қозғалыссыз өлшемі 6х6 см ауырсынатын түзіліс байқалады. Щеткин-Блюмберг симптомы оң. Лейкоцитоз $16,2 \times 10^9/\text{л}$.

Аппендикулярлы инфильтрат кезінде қандай ем қолданылады?

- a) консервативті ем
- b) экстремді операция

с)поллативті операция

d)2 күннен соң операция жасау

e)7 күннен соң операция жасау

39)Науқас 16 жаста, жұқпалы аурулар ауруханасынан жеткізілді Ол жерде іш сүзегіне байланысты емделген 20 күні кешке таман іште қатты ауырсыну қайталамалы құсу болды
Объективті: температура 38,6 С, жағдайы ауыр, емі бұлыңғыр, пульс 120 рет минутына, тілі және бетінің шырышты қабаты құрғақ Іші желденген Оң жақ мықын аймағында іштің тым қатаюы және ауырсынуы көрініс береді Щеткин – Блюмберг симптомы іштің барлық бөліктерінде айқын

Жедел аппендициттің асқынуларына қандай қабыну жатпайды?

a)энтерит

b)инфильтрат

c)абсцесс

d)жайылған перитонит

e)перитонит

40)Науқас ұл бала 17жаста, температураның көтерілуіне, демікпеге, қабырғаастында және көкіректің оң жақ жартысында ауырсынуға шағымданып қабылдау бөлімшесіне хирургке қаралды. Жедел аппендицит патогенезін түсіндіретін теорияға қандай теория жатпайды?

a)жарақатты

b)механикалық

c)эмболиялық

d)нервті-рефлекторлық

e)инфекциялық

41)Қабылдау бөлімшесіне 7 күндік бала келіп түседі. Әлсіз. Терісі бозғылт, акроцианоз.

Тынысы жиі, беткей. Жүрек тондары тұйық. Ішінің қатты кепкені және ауру сезімділігі көңіл аудартады. Тері асты вена торы кеңейген. Перистальтикасы естілмейді. Перкуторлы - бауыр тұйықтығы жоқ

Қыз балада жедел аппендицитті қандай нозологиямен ажырату керек?

a)аналық без апоплексиясынан

a)бруцеллездан

b)ревматизмнен

c)миокардиттен

d)менингоэнцефалиттен

42)Ересек балаларда жедел гематогенді остеомиелиттің қандайтүрі жиі кездеседі?

a)диафизді

b)эпифиздік

c)апофиздік

d)метафиздік

e)буындық

43)Төменде көрсетілгендерден жедел гематогенді остеомиелитпен жиізақымдалатын сүйектерді көрсетіңіз?

1)иық сүйегі

2) шыбық сүйегі

3) бұғана

4) шынтак сүйегі

5) сансүйегі

a)1,5

b)1,2

с)4,5

д)2,4

е)3,4

44)Өкпеабсцессінконсервативтіемінеқандай әдістержатады.

1)постуральды дренаж

2)бронхтыңкатетеризациясы

3) көкірекклеткасына электрофорез жасау

4) оксигенотерапия

5) күштепжөтелдіру

а)1,5

б)1,3

с)1,4

д)1,2

е)2,3

45)Мектеп жасындағы балаларда жедел аппендициттің басты симптомдарының біріне жатпайды?

а)құсықтың жасыл түсті болуы

б)жергілікті ауырсыну

с)іштің бұлшық еттерінің қатаюы

д)лейкоцитоз

е)дене қызуының көтерілуі

46)3 айлық қыз баланың кіндік сақинасында жұмсақ консистенциялы мөлшері 1,5х1,5 см іш қуысына оңай енетін, ауырсынусыз түзіліс байқалады. «Кіндік жарығы» - деген диагноз қойылды.

Кіндіктің толық жыланкөзінде оперативті ем жасау қанша жасында жасалады?

а)толық 1 жас шамасында

б)6 айлығында

с)диагнозын анықтағаннан кейін

д)туылған күннен бастап 1 айдан дейін

е)диагнозын анықтағаннан соң 2 айдан кейін

47)Аппендицитке тән негізгі үш белгіні атаңыз?

1)ауырсыну сезімі

2) көп рет құсу

3) гипертермия

4) пассивті дефанс

5) Щеткин-Блюмберг симптомы

6) іштің өгуі

а)1,4,5

б)1,3,6

с)2,3,6

д)1,3,4

е)4,5,6

48)Аппендициттіңсебептеріне жатады не жатады?

1) аскаридоз

2) аллергия

3) жарақат

4) гипертермия

5) ішекке бөгде заттың түсуі

a)1,5

b)1,3

c)3,4

d)4,5

e)1,4

49)Нәрестеде аппендицит дамуыныңсебебіненежатады?

1) перинатальды гипоксия

2)кіндігінің ұзын кесілуі

3) сүтті ембеуі

4) вакцина алмағаны

5) баланың шала туылуы

a)1,5

b)3,4

c)4,5

d)3,5

e)1,4

50)3 жасқа дейінгі балалардағы аппендициттің ерекшеліктеріне қандай симптомдар жатады?

1) интоксикацияның жергілікті симптомдарға қарағанда басымдылығы

2) құсудың болмауы

3)денесінде бөрітпелердің пайда болуы

4) дене қызуының көтерілмеуі

5) тексерукезінде бала тынышсызболуы

a)1,5

b)2,3

c)3,4

d)4,5

e)1,4