

ОҢТҮСТІК-ҚАЗАҚСТАН MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ	 SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Кафедра «Топографиялық анатомия және гистология» Бақылау өлшеу құралдары	56 беттің 1 беті

БАҚЫЛАУ ӨЛШЕУ ҚҰРАЛДАРЫ

1 (2) аралық бақылауға немесе аралық аттестаттауға арналған техникалық сипаттама және тестілік тапсырмалар (аралық бақылауға билет сұрақтары немесе басқа тапсырмалар)

Пәні: Бас пен мойынның топографиялық анатомиясы

Пән коды: ВМТА3303

ББ атауы және шифры: 6В10117 «стоматология»

Оқу сағаты/кредит көлемі: 4


Оқу курсы мен семестрі: 3курс/ V

Дәріс көлемі:8

Шымкент 2025ж.

ОҢТҮСТІК-ҚАЗАҚСТАН MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Кафедра «Топографиялық анатомия және гистология» Бақылау өлшеу құралдары		56 беттің 1 беті

1. Құрастырғандар:



Мурзанова Д.А.
Оспанов Д.Т.
Керімбекова М.О.
Анарматов С.В.
Юсупова А.Б.

Кафедра меңгерушісі к.м.н., и.о. проф.



Мурзанова Д.А.

Хаттама № 2 от «26» 09 2025 г.

ОҢТҮСТІК-ҚАЗАҚСТАН MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ	 SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Кафедра «Топографиялық анатомия және гистология» Бақылау өлшеу құралдары	56 беттің 1 беті

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН МЕДИЦИНА АКАДЕМИЯСЫ

Бекітемін

Кафедра меңгерушісі _____ Мурзанова Д. А.

_____ 2025 г.

Пән бойынша: топографиялық анатомия және оперативті хирургия

Мамандығы: Стоматология

Курс-3

1-Аралық аттестаттауға арналған бағдарлама сұрақтары

1. Самай аймағының шекараларын атаңыз.
2. Бет нерві бас сүйегінен қай тесік арқылы шығады?
3. Шайнау тобына қандай бұлшықеттер кіреді?
4. Бастың сыртқы жабындарынан веноздық қанның ағып шығу жолдары қандай?
5. Мойындырық тесіктен не өтеді?
6. Үш қарыншалы түйіннің (trigeminalе торабын) топографиясы қандай?
7. Еріндерден лимфа қандай лимфа түйіндеріне ағады?
8. Ірің беттен бас қуысына қандай жарықтар (саңылаулар) арқылы таралуы мүмкін?
9. Жоғарғы жақ нервінің қандай тармақтары жоғарғы тістерді иннервациялайды?
10. Мұрын аймағының сыртқы бағдарларын атаңыз.
11. Бастың негізгі клетчаткалық кеңістіктерін сипаттаңыз.
12. Кезбе нервінің зақымдануының клиникалық маңызы қандай?
13. Бастың үстіңгі фасциясының құрылыс ерекшеліктерін сипаттаңыз.
14. Бас сүйегінің сыртқы негізінің тесіктерін атаңыз.
15. Төменгі жақасты лимфа түйіндері қайда орналасады?
16. Сүйек күмбезінің жұмсақ тіндерін қанмен қамтамасыз етуге қандай артериялар қатысады?
17. Шайнау аймағының шекараларын анықтаңыз.
18. Бет нервінің бас сүйегі негізіндегі топографиясын сипаттаңыз.
19. Бастың шашты бөлігінен лимфа ағуының ерекшеліктері қандай?
20. Бет флегмоналарында қандай клиникалық асқынулар пайда болады?
21. Үштік түйін (trigeminal node) қайда орналасады?
22. Беттің лимфа жүйесін сипаттаңыз.
23. Бет нервінің тармақтарын және олардың қызметтерін атаңыз.
24. Шайнау бұлшықеттерінің артериялық қанмен қамтамасыз ету көзі қандай?
25. Беттен инфекция қандай веналар арқылы бас қуысына өтуі мүмкін?
26. Тіл-жұтқыншақ нервінің (IX) топографиясын сипаттаңыз.
27. Құлақмаңы-шайнау аймағын қандай фасциялар құрайды?
28. Құлақмаңы өрімі (plexus parotideus) қайда орналасады?

ОҢТҮСТІК-ҚАЗАҚСТАН MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Кафедра «Топографиялық анатомия және гистология» Бақылау өлшеу құралдары		56 беттің 1 беті

29. Кезбе нервiнiң бастың және мойынның аймағындағы жүрiсiн сипаттаңыз.
30. Сопақша тесiк қайда орналасқан және ол арқылы қандай құрылымдар өтедi?
31. Беттің терісінiң сезiмталдығын қай нерв қамтамасыз етедi?
32. Фасциялар аралық саңылаулар деген не және олардың клиникалық маңызы қандай?
33. Бас күмбезінің сыртқы бағдарларын сипаттаңыз.
34. Кезбе нервiнiң жоғарғы және төменгi түйiндерi қайда орналасады?
35. Құлақмаңы аймағынан лимфа қалай ағады?
36. Беттің негiзгi фасцияларын және олардың маңызын атаңыз.
37. Бас сүйегінің негiзгi бөлімдерін және олардың топографиялық маңызын атаңыз.
38. Көзасты нервi бетте қай жерде орналасқан?
39. Операцияларда бет нервiнiң жүрiсiн білудің клиникалық маңызы қандай?
40. Бет инфекциялары неге кавернозды синус тромбозына әкелуі мүмкін?
41. Қатты ми қабығының веноздық қойнауларының ерекшеліктерін сипаттаңыз.
42. Мойын аймағында кезбе нервiнiң қандай тармақтары шығады?
43. Беттің шекараларын атаңыз.
44. Ірің бастың фасциялық кеңістіктерi арқылы қалай таралуы мүмкін?
45. Мидан мойындырық венаға веноздық ағып шығу қандай жолдар арқылы жүзеге асады?
46. Тіл-жұтқыншақ нервi қандай бұлшықеттерді иннервациялайды?
47. Бет пен иек аймағын қандай артериялар қанмен қамтамасыз етедi?
48. Иек лимфа түйiндерi қайда орналасады?
49. Үштік нерв тармақтарының беттегі проекциясын сипаттаңыз.
50. Бас сүйегінің сыртқы негiзіндегi қандай тесiктер невралгияларда клиникалық маңызға ие?
51. Шайнау бұлшықетінің топографиялық орналасуы қандай?
52. Бет аймағынан веноздық ағып шығуды қамтамасыз ететін тамырларды атаңыз.

ОҢТҮСТІК-ҚАЗАҚСТАН MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ	 SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Кафедра «Топографиялық анатомия және гистология» Бақылау өлшеу құралдары	56 беттің 1 беті

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН МЕДИЦИНА АКАДЕМИЯСЫ

Бекітемін

Кафедра меңгерушісі _____ Мурзанова Д. А.

_____ 2025 г.

Пән бойынша: топографиялық анатомия және оперативті хирургия

Мамандығы: Стоматология

Курс-3

2-Аралық аттестаттауға арналған бағдарлама сұрақтары

1. Қандай бұлшықеттер ауыз қуысының түбін түзеді?
2. Беттің терең аймағының шекараларын атаңыз.
3. Мұрын қуысының артериялық торабы (Киссельбах аймағы) қандай?
4. Көзасты нервті қалай өтеді және ол бетке қай жерде шығады?
5. Самай-төменгі жақ буынында қандай қозғалыстар мүмкін?
6. Беттің терең аймағының тамыр-нерв шоғырының құрамына не кіреді?
7. Самай-төменгі жақ буыны қандай сүйектік элементтерден тұрады?
8. Тұрақты тістердің анатомиялық формуласын атаңыз.
9. Тіласты аймағынан инфекция мойын кеңістіктеріне қалай өте алады?
10. Қанаттәрізді веноздық өрім қайда орналасады және оның маңызы қандай?
11. Көз шарасының қабырғаларын атаңыз.
12. Құлақмаңы сілекей безінің қалыңдығында қандай құрылымдар өтеді?
13. Тістердің топографиялық формуласы деген не?
14. Самай-төменгі жақ буынынан веноздық ағып шығу қалай жүзеге асады?
15. Мұрын қалқандарының қызметі қандай?
16. Қанаттәрізді шұңқырда жоғарғы жақ артериясының қандай тармақтары өтеді?
17. Мұрын маңы қосалқы қуыстарын атаңыз.
18. Жақ-тіласты (m. mylohyoideus) бұлшықетінің қызметі қандай?
19. Шайнау кезінде самай-төменгі жақ буынында қандай қозғалыстар орын алады?
20. Инфекция құлақмаңы безінен самай аймағына қалай таралуы мүмкін?
21. Қанат-тандай шұңқырында қандай құрылымдар өтеді?
22. Сүт тістерінің анатомиялық формуласын атаңыз.
23. Ауыз қуысының түбінен лимфа қайда ағады?
24. Қанаттәрізді аймақтан инфекция бас қуысына қандай саңылаулар арқылы түсуі мүмкін?
25. Көз алмасының қабықтары қандай?
26. Тіс формуласында I, C, P, M әріптері нені білдіреді?
27. Қай бұлшықеттер көзді қозғайды және оларды не иннервациялайды?

ONTÜSTIK-QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Кафедра «Топографиялық анатомия және гистология» Бақылау өлшеу құралдары		56 беттің 1 беті

28. Бет және көз шарасы веналары арасындағы анастомоздардың клиникалық маңызы қандай?
29. Ауыз қуысының түбін қандай артерия қанмен қамтамасыз етеді?
30. Самай-төменгі жақ буынының буын дискісі қандай және оның қызметі қандай?
31. Мұрын қуысының бөлімдерін атаңыз.
32. Ауыз қуысы түбінің клетчаткалық кеңістіктерін қандай фасциялар түзеді?
33. Көру нерві деген не және ол қайда өтеді?
34. Көзасты аймағының шекараларын атаңыз.
35. Тіласты безінің иннервациясы қандай?
36. Қанатаралық кеңістіктің қабырғаларын қандай бұлшықеттер түзеді?
37. Инфекция тіласты кеңістігінен төменгі жақасты кеңістігіне қалай таралуы мүмкін?
38. Бетті қанмен қамтамасыз етуге қатысатын сыртқы ұйқы артериясының тармақтарын атаңыз.
39. Торлы лабиринт жасушаларының тыныстаудағы қызметі қандай?
40. Төменгі жақты алға жылжытуға жауап беретін бұлшықет қандай?
41. Сыртқы мұрын неден тұрады?
42. Мұрын шырышты қабығының иіс сезу бөлімі қайда орналасқан?
43. Беттің терең аймағының негізгі веноздық коллекторларын атаңыз.
44. Терең бет аймағы құлақмаңы-шайнау аймағынан немен бөлінеді?
45. Көзасты нервінің зақымдануында қандай клиникалық көріністер байқалады?
46. Тұрақты тістермен салыстырғанда сүт тістерінде қандай тістер жоқ?
47. Маңдай қойнауының қызметі қандай?
48. Самай-төменгі жақ буынын нығайтатын негізгі байламдарды атаңыз.
49. Ауыз қуысының түбін қандай бұлшықеттер түзеді?
50. Одонтогенді абсцесстерде қанаттәрізді аймақтың клиникалық маңызы қандай?
51. Тіс формуласы деп нені атайды және ол не үшін қажет?
52. Инфекция көз шарасынан қандай жолдармен таралуы мүмкін?
53. Төменгі жақ нервінің қанатаралық кеңістіктегі топографиясы қандай?
54. Самай-төменгі жақ буыны қандай артериялармен қанмен қамтамасыз етіледі?
55. Ауыз қуысы түбінен веноздық ағып шығу қай бағытқа жүзеге асады?
56. Самай-жақ аймағының шекаралары қандай?
57. Жоғарғы жақ қойнауы мұрын қуысына қалай ашылады?
58. Тіласты және төменгі жақасты кеңістіктерін қандай фасциялар түзеді?
59. Көзасты аймағының қанмен қамтамасыз етілу ерекшеліктері қандай?

ONTÜSTIK-QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Кафедра «Топографиялық анатомия және гистология» Бақылау өлшеу құралдары		56 беттің 1 беті

60. Самай-төменгі жақ буынының буын дискісі қандай қызмет атқарады?
61. Самай-төменгі жақ буынын түзуге қандай сүйектер қатысады?
62. Ауыз қуысы түбінде қандай клетчаткалық кеңістіктер түзіледі?
63. Тіласты безін тіл артериясының қандай тармақтары қанмен қамтамасыз етеді?
64. Қанаттәрізді аймақтың шекаралары қандай?
65. Сүт тістерінің тұрақты тістерге ауысуы қай жаста жүреді?

Тестілік тапсырмалар:

«Бас пен мойынның топографиялық анатомиясы»(360)

- <question> «Рихтер қайшылары» хирургиялық аспабы былай көрінеді:
- <variant> бір жазықтықта жатқан симметриялы жүздері бар қайшылар
- <variant> бойлық ось бойымен иілген қайшылар
- <variant> жазықтық бойымен иілген қайшылар
- <variant> түзу, ұшы доғал қайшылар
- <variant> көзге арналған қайшылар
- <question> Иілген және түзу қысқыштар қолданылады:
- <variant> уақытша қан тоқтату үшін
- <variant> сүйекқабықты сүйектен ажырату үшін
- <variant> қан кетуді түпкілікті тоқтату үшін
- <variant> ірі тамырлардың астына лигатура өткізу үшін
- <variant> фасцияларды кескенде ірі тамырларды қорғау үшін
- <question> Мойын өрімінің тері тармақтары мойын фасциясының беткей табақшасының астынан шығады:
- <variant> төс-бұғана-еміздікше бұлшықетінің артқы шетінің ортасы мен бұғананың ортасын қосатын сызық бойымен
- <variant> төс-бұғана-еміздікше бұлшықетінің артқы шетінің ортасында
- <variant> төс-бұғана буыны деңгейінде
- <variant> кіші бұғаналық ойықта
- <variant> қалқанша шеміршектің жоғарғы жиегі деңгейінде ұйқы үшбұрышында
- <question> Беткей фасция жабады:
- <variant> теріасты бұлшықетін
- <variant> теріні
- <variant> теріасты шелмайын
- <variant> төс-бұғана-еміздікше бұлшықетін
- <variant> қалқанаасты бұлшықеттерді
- <question> Мойын фасциясының қалқаналды (трахеалды) пластинкасы жабады:
- <variant> қалқанаасты бұлшықеттерді
- <variant> төс-бұғана-еміздікше бұлшықетін
- <variant> қалқанүсті бұлшықеттерді
- <variant> трапеция тәрізді бұлшықетті
- <variant> мойынның тамыр-жүйке шоғырын
- <question> Мойын фасциясының бұл пластинкасы ұйқы қынабын түзеді –
- <variant> омыртқаалды
- <variant> париеталды
- <variant> беткей
- <variant> қалқаналды (трахеалды)
- <variant> висцералды

ОҢТҮСТІК-ҚАЗАҚСТАН MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Кафедра «Топографиялық анатомия және гистология» Бақылау өлшеу құралдары		56 беттің 1 беті

- <question> Ретровисцералдық кеңістік орналасады:
- <variant> өңештің артқы қабырғасын жауып тұрған висцералдық фасция мен мойын фасциясының омыртқаалды пластинкасының арасында
- <variant> висцералдық фасция мен мойынның тамыр-жүйке шоғырларының арасында
- <variant> омыртқаалды фасцияның астында
- <variant> мойын фасциясының беткей және қалқаналды пластинкаларының арасында
- <variant> висцералдық фасция жапырақшаларының арасында
- <question> Мойынның беткей (сезімтал) нервтерінің түзілу көзі:
- <variant> мойын өрімі
- <variant> симпатикалық бағанның мойын бөлігі
- <variant> кезеген нерв
- <variant> көкет (диафрагмалық) нерв
- <variant> үштік нерв
- <question> Мойын өрімін құрайтын жұлын нервтері:
- <variant> C1–C4
- <variant> C1–C8
- <variant> C1–C6
- <variant> C1–C2
- <variant> C1–Th2
- <question> Төменгі жақасты сілекей безінің қанмен қамтамасыз ету көздерін көрсетіңіз:
- <variant> бет артериясы
- <variant> үстінгі жақ артериясы
- <variant> жоғарғы қалқанша артерия
- <variant> беткей самай артериясы
- <variant> көтеріле жатқан жұтқыншақ артериясы
- <question> Тіласты сілекей безінің қанмен қамтамасыз ету көздері:
- <variant> тіл артериясы
- <variant> бет артериясы
- <variant> самай артериясы
- <variant> беткей самай артериясы
- <variant> көтеріле жатқан жұтқыншақ артериясы
- <question> Жақасты және тіласты сілекей бездерінің сезімтал иннервациясын қамтамасыз етеді:
- <variant> үштік нерв (V)
- <variant> бет (VII) нерві
- <variant> барабандық жығылыс
- <variant> тіласты (XII) нерв
- <variant> кезеген (X) нерв
- <question> Тіл-жұтқыншақ нервінің (IX) қозғалтқыш талшықтары қай ядродан басталады:
- <variant> қосарлы
- <variant> жалғыз жол
- <variant> төменгі сілекей бөлу
- <variant> жоғарғы сілекей бөлу
- <variant> дорсалды
- <question> Тіл-жұтқыншақ нерві (IX) бассүйектен қай тесік арқылы шығады:
- <variant> үлкен
- <variant> мойындырық
- <variant> біз-еміздікше
- <variant> жыртқық
- <variant> дөңгелек
- <question> Тіл-жұтқыншақ нервінің (IX) сезімтал жолының 1-ші нейроны орналасқан:
- <variant> тіл-жұтқыншақ нервінің жоғарғы және төменгі түйіндерінде

ОҢТҮСТІК-ҚАЗАҚСТАН MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Кафедра «Топографиялық анатомия және гистология» Бақылау өлшеу құралдары		56 беттің 1 беті

- <variant> жалғыз жол ядросында
- <variant> тілдің шырышты қабатында
- <variant> құлақ түйінінде
- <variant> жоғарғы мойын түйінінде
- <question> Барабан өрімінің түзілуіне тіл-жұтқыншақ нервiнiң (IX) қай тармағы қатысады:
- <variant> барабандық нерв
- <variant> синус тармағы
- <variant> жұтқыншақ тармағы
- <variant> бадамша тармақтары
- <variant> тіл тармақтары
- <question> Барабандық нерв иннервациялайды:
- <variant> барабан қуысының шырышты қабатын
- <variant> жұтқыншақтың шырышты қабатын
- <variant> құлақ қалқаны мен сыртқы есту жолының терісін
- <variant> барабан жарғағын керетін бұлшықетті
- <variant> көмейдің шырышты қабатын
- <question> Барабандық нерв барабан қуысынан шыққан соң айналады:
- <variant> кіші тас жол
- <variant> үлкен тас жол
- <variant> барабандық жығылыс
- <variant> құлақ-самай
- <variant> үлкен құлақ
- <question> Тіл-жұтқыншақ нервiнiң (IX) тілдік тармақтары тілдің шырышты қабатын иннервациялайды:
- <variant> тілдің артқы 1/3 бөлігін
- <variant> тіл түбірін көмей қақпақшасы маңында
- <variant> тілдің алдыңғы 2/3 бөлігін
- <variant> тілдің бүйір беттерін
- <variant> тілдің астыңғы бетін
- <question> Кезеген нерв (X) бассүйектен қай тесік арқылы шығады:
- <variant> жыртық
- <variant> мойындырық
- <variant> сопақша
- <variant> үлкен
- <variant> дөңгелек
- <question> Жоғарғы көмей нервiнiң сыртқы тармағы иннервациялайды:
- <variant> сақина-қалқанша бұлшықетін
- <variant> дауыс саңылауының үстіндегі көмейдің шырышты қабатын
- <variant> дауыс саңылауының астындағы көмейдің шырышты қабатын
- <variant> тіл түбірінің шырышты қабатын
- <variant> дауыс бұлшықетін
- <question> Кезеген нервтің (X) жұтқыншақ тармақтары иннервациялайды:
- <variant> жұтқыншақтың шырышты қабатын және бұлшықеттерін
- <variant> барабан қуысының шырышты қабатын
- <variant> қатты ми қабығын
- <variant> көмей бұлшықеттерін
- <variant> көмейдің шырышты қабатын
- <question> Тіласты нервтің (XII) қозғалтқыш ядросы орналасқан:
- <variant> жұлында
- <variant> сопақша мида
- <variant> көпірде

ONTÜSTIK-QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Кафедра «Топографиялық анатомия және гистология» Бақылау өлшеу құралдары		56 беттің 1 беті

- <variant> ортаңғы мида
- <variant> аралық мида
- <question> Тіласты (XII) нерв жұбының бассүйектен шығу орны:
- <variant> Canalis hypoglossalis
- <variant> Canalis condilaris
- <variant> Canalis caroticus
- <variant> Foramen magnum
- <variant> Foramen lacerum
- <question> Мойын ілмегінің төменгі түбірі, мойын өрімінен шығып, қай нервпен қосылады:
- <variant> тіласты (XII)
- <variant> тілдік
- <variant> тіл-жұтқыншақ (IX)
- <variant> көкет (диафрагмалық)
- <variant> кезеген (X)
- <question> Ұйқы қынабын түзеді:
- <variant> мойын фасциясының омыртқаалды пластинкасы
- <variant> мойын фасциясының беткей пластинкасы
- <variant> висцералдық фасция
- <variant> беткей фасция
- <variant> мойын фасциясының қалқаналды пластинкасы
- <question> Жалпы ұйқы артериясының бифуркация деңгейін көрсетіңіз:
- <variant> қалқанша шеміршектің жоғарғы жиегі
- <variant> төменгі жақ бұрышы
- <variant> төменгі жақ мойыны
- <variant> сақина тәрізді шеміршектің жоғарғы жиегі
- <variant> қалқанша без бөлігінің жоғарғы полюсі
- <question> Мойын фасциясының қалқаналды пластинкасы жабатын бұлшықеттер:
- <variant> қалқанасты
- <variant> қалқанүсті
- <variant> алдыңғы, ортаңғы, артқы сатылы бұлшықеттер
- <variant> мойынның ұзын бұлшықеті
- <variant> төс-бұғана-еміздікше
- <question> Мойындырық веналық бұрыш түзілген кезде қосылатын тамырлар:
- <variant> ішкі мойындырық және бұғанаасты веналары
- <variant> сыртқы және ішкі мойындырық веналар
- <variant> ішкі мойындырық және иық-бас веналары
- <variant> бұғанаасты және қол-бас веналары
- <variant> оң, сол қол-бас және жоғарғы қуыс веналары
- <question> Мимикалық бұлшықеттердің даму көздерін атаңыз:
- <variant> екінші желбезек доғасы
- <variant> бірінші желбезек доғасы
- <variant> үшінші желбезек доғасы
- <variant> төртінші желбезек доғасы
- <variant> бесінші желбезек доғасы
- <question> Мимикалық бұлшықеттерді иннервациялайтын нерв:
- <variant> бет (VII)
- <variant> көзқимылдатқыш (III)
- <variant> үштік (V)
- <variant> кезеген (X)
- <variant> қосымша (XI)

ONTÜSTIK-QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Кафедра «Топографиялық анатомия және гистология» Бақылау өлшеу құралдары		56 беттің 1 беті

<question> Бет нервiнiң мойындық тармағы иннервациялайды:

<variant> Мойынның терiасты бұлшықетiн

<variant> Көздiң айналма бұлшықетiн

<variant> Ауыздың айналма бұлшықетiн

<variant> Ұрт бұлшықетiн

<variant> Иек бұлшықетiн

<question> Шайнау бұлшықеттерiнiң дамуының көзi:

<variant> Бiрiншi желбезек доғасы

<variant> Екiншi желбезек доғасы

<variant> Үшiншi желбезек доғасы

<variant> Төртiншi желбезек доғасы

<variant> Бесiншi желбезек доғасы

<question> Шайнау бұлшықеттерiнiң қанмен қамтамасыз етiлу көзi:

<variant> Жақасты (жоғарғы жак) артериясы

<variant> Тiл артериясы

<variant> Бет артериясы

<variant> Жоғарғы қалқанша артериясы

<variant> Ишкi ұйқы артериясы

<question> Шайнау бұлшықеттерiнiң иннервация көзi:

<variant> Үшкiл нерв (V)

<variant> Бет нервi (VII)

<variant> Мойын өрiмi

<variant> Кезбе нерв (X)

<variant> Әкетушi нерв (VI)

<question> Жұтқыншақ маңы кеңiстiгi алдыңғы және артқы бөлiмдерге мына перде арқылы бөлiнедi:

<variant> Шиложұтқыншақтық (Жонеско)

<variant> Жұтқыншақ-омыртқалық (Шарпи)

<variant> Шиломыртқалық

<variant> Жұтқыншақ-емiзiкшелiк

<variant> Шилотөменгiжақтық

<question> «Қаз табаны» мынамен түзiледi:

<variant> Ұрт нервiмен (buccalis)

<variant> Бет нервiмен (facialis)

<variant> Көзүстiлiк нервiмен (supraorbitalis)

<variant> Иек нервiмен (mentalis)

<variant> Құлақсамай нервiмен (auriculotemporalis)

<question> Мұрын қуысының жоғарғы қабырғасы мынамен түзiледi:

<variant> Торлы сүйектiң тесiктi пластинкасы

<variant> Мұрын сүйектерi

<variant> Маңдай қойнауы

<variant> Жоғарғы жақтың бет сүйек өсiндiсi

<variant> Торлы сүйектiң денесi

<question> Жұмсақ таңдай бұлшықеттерiне жатады:

<variant> Таңдай-тiл бұлшықетi

<variant> Тiласты-тiл бұлшықетi

<variant> Шило-тiл бұлшықетi

<variant> Тiлдiң төменгi бойлық бұлшықетi

<variant> Тiлдiң жоғарғы бойлық бұлшықетi

<question> Мұрын қуысының алдыңғы бөлiмдерiн қанмен қамтамасыз етедi:

<variant> Алдыңғы торлы артерия

ОҢТҮСТІК-ҚАЗАҚСТАН MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Кафедра «Топографиялық анатомия және гистология» Бақылау өлшеу құралдары		56 беттің 1 беті

<variant> Мұрын-таңдай артериясы

<variant> Үлкен таңдай артериясы

<variant> Кіші таңдай артериясы

<variant> Таңдай артериясы

<question> Мұрын қуысының орта бөлімдерін қанмен қамтамасыз ететін артерия:

<variant> Артқы торлы

<variant> Таңдай

<variant> Алдыңғы торлы

<variant> Кіші таңдай

<variant> Үлкен таңдай

<question> Төменгі мұрын жолына ашылатын құрылым:

<variant> Жоғарғы жақ қойнауы

<variant> Мұрын-көз жасы өзегі

<variant> Маңдай қойнауы

<variant> Торлы сүйек қойнауы

<variant> Сына тәрізді қойнау

<question> Жоғарғы мұрын жолына ашылатын құрылым:

<variant> Маңдай қойнауы

<variant> Сына тәрізді қойнау

<variant> Жоғарғы жақ қойнауы

<variant> Торлы сүйектің алдыңғы жасушалары

<variant> Мұрын-көз жасы өзегі

<question> Тіласты нервiнiң iлмегiнiң тармақтары иннервациялайды:

<variant> Мойынның алдыңғы топ бұлшықеттерiн

<variant> Қалқанша безiн

<variant> Көмей

<variant> Өңеш

<variant> Кеңірдек

<question> Бет венасын жоғарғы көз венасымен қосатын вена:

<variant> Бұрыштық

<variant> Жақтық

<variant> Ұрттық

<variant> Тiлдiк

<variant> Жақартылық

<question> Шипо үшбұрышының бет нервiне шектесегiн жағы:

<variant> Алдыңғы

<variant> Артқы

<variant> Төменгі

<variant> Жоғарғы

<variant> Сыртқы

<question> Конфлюенске құйылмайтын синус:

<variant> Тiк

<variant> Сигма тәрізді

<variant> Көлденең

<variant> Шүйде

<variant> Жоғарғы сагиталды

<question> Эмиссарлық веналар реттейді:

<variant> Ішкі бас қысымын

<variant> Сүйектің коректенуін

<variant> Артерио-веноздық анастомоздардың қызметін

ОҢТҮСТІК-ҚАЗАҚСТАН MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Кафедра «Топографиялық анатомия және гистология» Бақылау өлшеу құралдары		56 беттің 1 беті

<variant> Мидың қанмен қамтамасыз етілуін

<variant> Мидың беткі қабаттарының қанмен қамтамасыз етілуін

<question> Бет нервiнiң төменгi ерiн бұлшықеттерiн иннервациялайтын тармақтары:

<variant> Төменгi жақтың қырлы тармағы

<variant> Ұрттық көз артериялары

<variant> Алдыңғы торлы артериялар

<variant> Артқы торлы артериялар

<variant> Көру нервтері

<question> Қанат-тандай шұңқырынан көз шарасына өтетін саңылау:

<variant> Төменгi көз саңылауы

<variant> Жоғарғы көз саңылауы

<variant> Қанатты-жоғарғы жақ саңылауы

<variant> Сына-жоғарғы жақ саңылауы

<variant> Үлкен тандай каналы

<question> Қанат-тандай шұңқырынан мұрын қуысына өтетін тесік:

<variant> Сына-тандай тесігі

<variant> Сопак тесік

<variant> Дөңгелек тесік

<variant> Қанатты канал

<variant> Қанатты-жоғарғы жақ саңылауы

<question> Көмекші шайнау бұлшықеттерінен бөлек нағыз шайнау бұлшықетіне жататын бұлшықет:

<variant> Самай бұлшықеті

<variant> Екіқарынды

<variant> Жақасты-тіласты

<variant> Иекасты-тіласты

<variant> Қалқанша-тіласты

<question> Құлақмаңы сілекей безінің қалыңдығында өтетін артерия:

<variant> Сыртқы ұйқы артериясы

<variant> Бет артериясы

<variant> Ішкі ұйқы артериясы

<variant> Шүйде артериясы

<variant> Жақасты артериясы

<question> Бет артериясының тармақтары:

<variant> Иек, жоғарғы және төменгі еріндік, бұрыштық

<variant> Самай, бет, мұрын-ерін

<variant> Мұрын-тандай, бұрыштық

<variant> Құлақ, самай, канат-тандай

<variant> Төменгі еріндік, бет

<question> Жоғарғы жақ артериясы ... артериясының соңғы тармағы болып табылады:

<variant> Сыртқы ұйқы

<variant> Бет

<variant> Тіл

<variant> Жоғарғы көмекей

<variant> Жоғарғы қалқанша

<question> Жоғарғы алдыңғы ұяшықтық артериялар мына артерияның тармақтары:

<variant> Көзасты

<variant> Жақасты

<variant> Тіл

<variant> Бет

<variant> Жоғарғы көмекей

ОҢТҮСТІК-ҚАЗАҚСТАН MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Кафедра «Топографиялық анатомия және гистология» Бақылау өлшеу құралдары		56 беттің 1 беті

<question> Жоғарғы артқы ұяшықтық артериялар мына артерияның тармақтары:

- <variant> Көзасты
- <variant> Жақасты
- <variant> Бет
- <variant> Жоғарғы көмекей
- <variant> Тіл

<question> Шайнауға қосалқы болып табылатын бұлшық етті көрсетіңіз:

- <variant> жақ-тіласты бұлшықеті
- <variant> самай бұлшықеті
- <variant> шайнау бұлшықеті
- <variant> латералды қанатша бұлшықеті
- <variant> медиалды қанатша бұлшықеті

<question> Бұғанаасты тамырлары мен иық өрімі қай үшбұрышта өтеді:

- <variant> жауырын-бұғана үшбұрышы
- <variant> жақасты үшбұрышы
- <variant> жауырын-тіласты үшбұрышы
- <variant> жауырын-көмей (трахея) үшбұрышы
- <variant> жауырын-трапециялы үшбұрышы

<question> Кеңірдектің мойын бөлігін қанмен қамтамасыз ететін артерия:

- <variant> төменгі қалқанша артериясы
- <variant> жоғарғы қалқанша артериясы
- <variant> көтеріле беретін жұтқыншақ артериясы
- <variant> тіл артериясы
- <variant> шүйде (желке) артериясы

<question> Қалқанша безінің сыртқы қапшығын түзетін мойынның фасциясын көрсетіңіз:

- <variant> өз фасциясының терең жапырақшасы
- <variant> ішкі ағзалық фасция
- <variant> беткей фасция
- <variant> өз фасциясының беткей жапырақшасы
- <variant> омыртқаалды фасция

<question> Жоғарғы қалқанша артериялары қайдан бастау алады:

- <variant> сыртқы ұйқы артериясынан
- <variant> иық-бас сабағынан
- <variant> бұғанаасты артериясынан
- <variant> жалпы ұйқы артериясынан
- <variant> ішкі ұйқы артериясынан

<question> Мойынның қай үшбұрышында мойын өрімінің тармақтары шығады:

- <variant> жауырын-трапециялы үшбұрыш
- <variant> жақасты үшбұрышы
- <variant> жауырын-тіласты үшбұрышы
- <variant> жауырын-көмей үшбұрышы
- <variant> жауырын-бұғана үшбұрышы

<question> Кеудеден жоғары апоневрозаралық кеңістікті алдыңғы жағынан шектейтін мойын фасциясы:

- <variant> өз фасциясының терең трахеяалды жапырақшасы
- <variant> беткей фасция
- <variant> өз фасциясының беткей жапырақшасы
- <variant> ішкі ағзалық фасция
- <variant> омыртқаалды фасция

<question> Париеталды және висцералды жапырақшалары бар мойын фасциясы:

- <variant> ішкі ағзалық фасция

ОҢТҮСТІК-ҚАЗАҚСТАН MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Кафедра «Топографиялық анатомия және гистология» Бақылау өлшеу құралдары		56 беттің 1 беті

<variant> беткей фасция

<variant> өз фасциясының беткей жапырақшасы

<variant> өз фасциясының терең жапырақшасы

<variant> омыртқаалды фасция

<question> Көз ұясын түзетін сүйек түзілісін көрсетіңіз:

<variant> маңдай сүйегі

<variant> емізікше сүйегі

<variant> шүйде сүйегі

<variant> төбе сүйегі

<variant> самай сүйегі

<question> Ретровисцералды кеңістікті алдыңғы жағынан шектейтін фасция:

<variant> ішкі ағзалық фасция

<variant> беткей фасция

<variant> өз фасциясының беткей жапырақшасы

<variant> өз фасциясының терең жапырақшасы

<variant> омыртқаалды фасция

<question> Пирогов үшбұрышы мойынның қай үшбұрышында орналасқан:

<variant> жақасты үшбұрышы

<variant> жауырын-тіласты үшбұрышы

<variant> жауырын-бұғана үшбұрышы

<variant> жауырын-трапециялы үшбұрышы

<variant> жауырын-көмей үшбұрышы

<question> Көмейді қай бас ми жүйке жүйкесі иннервациялайды:

<variant> кезбе (вагус) жүйкесі

<variant> үштік жүйке

<variant> бет жүйкесі

<variant> тіласты жүйкесі

<variant> тіл-жұтқыншақ жүйкесі

<question> Пирогов үшбұрышын үстінен шектейтін жүйкені көрсетіңіз:

<variant> тіласты жүйкесі

<variant> кезбе жүйке

<variant> бет жүйкесі

<variant> тіл-жұтқыншақ жүйкесі

<variant> үштік жүйке

<question> Пирогов үшбұрышының түбін құрайтын бұлшық ет:

<variant> иек-тіл бұлшықеті

<variant> жақ-тіласты бұлшықеті

<variant> тіласты-тіл бұлшықеті

<variant> біз-тіл бұлшықеті

<variant> иек-тіласты бұлшықеті

<question> саты-омыртқа үшбұрышында орналасатын анатомиялық түзілістерді атаңыз:

<variant> бұғанаасты артериясының бастапқы бөлігі, кеуде лимфа өзегінің доғасы, симпатикалық жүйкенің төменгі және аралық түйіндері

<variant> ұйқы артериясы мен кезбе жүйке

<variant> қолтық артериясы мен иық өрімі

<variant> қолтық артериясы, қолтық венасы және иық өрімі

<variant> мойындырық вена, кеуде лимфа өзегі

<question> Бұғанаасты артериясының бірінші бөлігінен тарайтын артерияларды атаңыз:

<variant> омыртқа артериясы, қалқанша-мойын сабағы және ішкі көкірек (кеуде) артериясы

<variant> жоғарғы қалқанша және омыртқа артериялары

<variant> ұйқы артериясы

ОҢТҮСТІК-ҚАЗАҚСТАН MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Кафедра «Топографиялық анатомия және гистология» Бақылау өлшеу құралдары		56 беттің 1 беті

<variant> қолтық артериясы

<variant> қолқа

<question> Ортаңғы бас сүйек шұңқырымен шектесетін мұрын қуысының қойнауы:

<variant> маңдай қойнауы

<variant> сына тәрізді қойнау

<variant> жоғарғы жақ қойнауы

<variant> торлы лабиринт

<variant> емізікше қойнауы

<question> Жұмсақ тандай бұлшықеттеріне жататын:

<variant> тандай-тіл бұлшықеті

<variant> тіласты-тіл бұлшықеті

<variant> біз-тіл бұлшықеті

<variant> тілдің төменгі бойлық бұлшықеті

<variant> тілдің жоғарғы бойлық бұлшықеті

<question> Жұтқыншақты қай жүйкелер иннервациялайды:

<variant> тіл-жұтқыншақ жүйкесі

<variant> әкетуші жүйке

<variant> симпатикалық жүйке

<variant> блок жүйкесі

<variant> тіл жүйкесі

<question> Мойын лимфа тармақтарының тармақшасын көрсетіңіз:

<variant> жақасты

<variant> құлақ маңы

<variant> бұғанаасты

<variant> төстің қасы

<variant> көкірекаралық

<question> Мойынның ішкі үшбұрышын шектейтін анатомиялық түзілісті атаңыз:

<variant> төс-бұғана-емізікше бұлшықеті

<variant> бет доғасы

<variant> шүйде сызығы

<variant> бұғана

<variant> трапециялы бұлшықет

<question> Мойынның сыртқы үшбұрышын шектейтін анатомиялық түзілісті атаңыз:

<variant> трапециялы бұлшықет

<variant> төс-бұғана-емізікше бұлшықетінің алдыңғы жиегі

<variant> бет доғасы

<variant> ортаңғы сызық

<variant> төменгі жақ

<question> Мұрын-тандай жүйкесі өтетін тандай тесігін көрсетіңіз:

<variant> үлкен тандай тесігі

<variant> альвеолды (тіс ұясы) тесігі

<variant> кіші тандай тесігі

<variant> иек тесігі

<variant> төменгі жақ тесігі

<question> Қанатшааралық саңылау беттегі қандай клетчаткалық кеңістікте орналасады:

<variant> самайасты шұңқырында

<variant> фасцияаралық

<variant> жақ артындағы

<variant> жұтқыншақ маңындағы

<variant> жұтқыншақ артындағы

<question> Құлақ маңы сілекей безінің өзектері ауыз қуысында қай жерде ашылады:

ОҢТҮСТІК-ҚАЗАҚСТАН MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Кафедра «Топографиялық анатомия және гистология» Бақылау өлшеу құралдары		56 беттің 1 беті

- <variant> тіласты емізигінде
- <variant> ауыздың кіреберісінде
- <variant> тіласты қатпары бойындағы кілегейлі қабықта
- <variant> жұмсақ таңдайда
- <variant> ауыз қуысының түбінде
- <question> Тілдік бадамша қай жерде орналасқан:
- <variant> тіл түбінде
- <variant> тіл денесінде
- <variant> тілдің төменгі бетінде
- <variant> тіл жүгеншесінде
- <variant> тілдің үстіңгі бетінде
- <question> Тері апоневрозбен берік байланысқан аймақ:
- <variant> маңдай-төбе-шүйде аймағы
- <variant> самай аймағы
- <variant> мойын
- <variant> бет бөлімі
- <variant> құрсак қабырғасы
- <question> Бас сүйек күмбезінің сүйек қабығы сүйекпен тығыз бітісіп кеткен бөліктерін атаңыз:
- <variant> маңдай-төбе-шүйде аймағының жіктері бойында
- <variant> самай аймағында
- <variant> шипо үшбұрышында
- <variant> төбе сүйегі бойында
- <variant> торлы сүйектің тесікті пластинкасы бойында
- <question> Бетте қозғалтқыш қызмет атқаратын жүйкені атаңыз:
- <variant> бет жүйкесі
- <variant> үштік жүйкенің екінші тармағы
- <variant> мойын өрімі
- <variant> тіл жүйкесі
- <variant> әкетуші
- <question> Емізікше сүйектің құрылысы:
- <variant> қосқабатты
- <variant> пневматикалық
- <variant> астында диплоэті зат орналасқан пластинка
- <variant> бірқабатты
- <variant> қабыршақты
- <question> Көру өзегінен өтетін:
- <variant> көру жүйкесі
- <variant> үштік жүйке
- <variant> көзқимылдатқыш жүйке
- <variant> әкетуші жүйке
- <variant> көз шарасының венасы
- <question> Беттің бөлігін атаңыз:
- <variant> маңдай
- <variant> бүйір
- <variant> ми бөлігі
- <variant> шүйде
- <variant> негіз
- <question> Бас сүйектің ми бөлігі:
- <variant> бет
- <variant> күмбез
- <variant> маңдай

ONTÜSTIK-QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Кафедра «Топографиялық анатомия және гистология» Бақылау өлшеу құралдары		56 беттің 1 беті

<variant> төбе

<variant> бүйір

<question> Бас сүйек күмбезінің маңдай аймағын қанмен қамтамасыз ететін артериялар:

<variant> қас үсті артерия (Arteria supraorbitalis (лат.))

<variant> шүйде артериясы

<variant> бет артериясы

<variant> төбе артериясы

<variant> көзасты артериясы

<question> Бас сүйек күмбезінің ерекшелігі, ол келесі қабаттардан тұрады:

<variant> апоневротикалық пластинкалар

<variant> фиброзды пластинкалар

<variant> әйнек тәрізді пластинкалар

<variant> шеміршекті пластинкалар

<variant> сүйек қабықты пластинкалар

<question> Тіл жүйкесінің доғасы орналасқан жер:

<variant> тіласты-тіл бұлшықетінің астында

<variant> ауыз қуысының түбінде

<variant> қатты тандайда

<variant> ауыз қуысының кіреберісінде

<variant> жұмсақ тандайда

<question> Самай апоневрозы қайда бекітіледі:

<variant> жоғарғы самай сызығына

<variant> төменгі жаққа

<variant> төменгі жақтың тәж өсіндісіне

<variant> жоғарғы жақта

<variant> көз ұясында

<question> Бетті қанмен қамтамасыз етуге қатысатын:

<variant> жоғарғы жақ артериясы

<variant> беткей самай артериясы

<variant> көз шарасының артериясы

<variant> артқы құлақ артериясы

<variant> шүйде артериясы

<question> Ішкі есту тесігінен өтетін:

<variant> бет жүйкесі

<variant> кезбе жүйке

<variant> шүйде жүйкесі

<variant> ішкі ұйқы артериясы

<variant> бет артериясы

<question> Мойындырық тесігінен өтетін:

<variant> ішкі мойындырық венасы (jugularis interna)

<variant> бет артериясы

<variant> ішкі ұйқы артериясы

<variant> бет жүйкесі

<variant> тіласты артериясы

<question> Қатты ми қабығының синустары, ішкі шүйде төмпешігінде қосылады:

<variant> тік синус

<variant> төменгі сагитталь синус

<variant> үлкен қанаты

<variant> сигма тәрізді синус

<variant> үңгірлі) синус

ОҢТҮСТІК-ҚАЗАҚСТАН MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ	SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Кафедра «Топографиялық анатомия және гистология» Бақылау өлшеу құралдары	56 беттің 1 беті

<question> Бет жүйкесі иннервациялайтын:

<variant> мойынның теріасты бұлшықеті

<variant> самай бұлшықеті

<variant> латералды қанатша бұлшықеті

<variant> кивательді бұлшықет

<variant> көздің сыртқы тік бұлшықеті

<question> Мұрын қуысына жататын қосымша қойнаулар:

<variant> сына тәрізді қойнау

<variant> шүйде қойнауы

<variant> емізікше үңгірі

<variant> емізікше қойнауы

<variant> дабыл қуысы

<question> Пирогов үшбұрышының бір шекарасын атаңыз:

<variant> қосқарыншалы бұлшықеттің сіңірі

<variant> иек-тіл бұлшықеті

<variant> қолтық жүйкесі

<variant> бет артериясы

<variant> бет венасы

<question> Мойында орналасқан ағза:

<variant> өңеш

<variant> мұрын-жұтқыншақ

<variant> ауыз-жұтқыншақ

<variant> құлақ маңы безі

<variant> гипофиз

<question> Ұйқы үшбұрышы шегінде сыртқы ұйқы артериясынан тарайтын тармақтар:

<variant> жоғарғы қалқанша артериясы

<variant> омыртқа артериясы

<variant> жоғарғы жақ артериясы

<variant> төменгі қалқанша артериясы

<variant> бұғанаасты артериясы

<question> Қай бас сүйек жүйкесі көмейге иннервация жасайды:

<variant> кезбе

<variant> үшкіл

<variant> симпатикалық

<variant> тіласты

<variant> тіл-жұтқыншақ

<question> Сопакша тесік арқылы өтетіні:

<variant> үшкіл жүйкенің үшінші тармағы

<variant> үшкіл жүйкенің бірінші тармағы

<variant> үшкіл жүйкенің екінші тармағы

<variant> қатты ми қабығының ортаңғы артериясы

<variant> сигма тәрізді синус

<question> Алдыңғы бас сүйек шұңқырындағы соқыр тесік жоғарғы бойлық синусты қандай венозды өріммен байланыстырады:

<variant> мұрын қуысының

<variant> көз ұясының

<variant> қанатаралық беткей

<variant> жұтқыншақтың

<variant> ортаңғы құлақтың

<question> Самай доғасынан жоғары тұйық кеңістік неден түзіледі:

ONTÜSTIK-QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Кафедра «Топографиялық анатомия және гистология» Бақылау өлшеу құралдары		56 беттің 1 беті

- <variant> самай бұлшықеті мен самай апоневрозынан
- <variant> самай апоневрозының екі жапырақшасынан
- <variant> самай бұлшықетінің екі қабатынан
- <variant> бет фасциясының сыртқы жапырақшасының екі қабатынан
- <variant> бет фасциясының терең жапырақшасынан
- <question> Самай аймағының теріасты шел қабатында орналасатыны:
- <variant> құлақ- самай жүйкесі (n. auriculotemporalis)
- <variant> терең самай артериясы (a. temporalis profunda)
- <variant> терең самай венасы (v. temporalis profunda)
- <variant> бет жүйкесі (n. facialis)
- <variant> қатты ми қабығының ортаңғы артериясы (a. meningea media)
- <question> Науқаста бет артериясынан қан кету анықталды. Қан ағуын тоқтату үшін хирург артерияны саусақпен басуы керек. Бет артериясын басу нүктесі қай жерде орналасқан?
- <variant> шайнау бұлшықетінің алдыңғы жиегіндегі төменгі жақтың орта тұсында
- <variant> бет сүйек доғасынан 1 см төмен
- <variant> құлақтың қалқаншасынан 1 см төмен
- <variant> көз ұясының төменгі жиегінен 0,5–1 см төмен
- <variant> төменгі жақ бұрышының артында
- <question> Науқаста ірінді паротит анықталды. Хирург дренаж жасау үшін тілік жасау қажет. Ірінді паротит кезінде тілік бағытын қалай дұрыс тандау керек?
- <variant> бет нервiнiң тармақтарын ескеріп, құлақ қалқаншасынан радиалды бағытта
- <variant> ең үлкен флюктуация нүктесі арқылы кез келген бағытта
- <variant> құлақ қалқаншасынан 1 см алға қарай тік бағытта
- <variant> доға тәрізді тілік
- <variant> ай тәрізді тілік
- <question> Науқасқа жоғарғы жақтың артқы аймағында хирургиялық немесе стоматологиялық манипуляция жасау жоспарланды. Операция алдында дәрігер тандайлық анестезия жасады. Осы кезде қай жүйке жансызданады?
- <variant> үлкен тандай жүйкесі
- <variant> төменгі альвеолярлық жүйке
- <variant> тілдік жүйке
- <variant> тіл асты жүйке
- <variant> үстіңгі альвеолярлық жүйке
- <question> Науқасқа жоғарғы жақтың артқы тістеріне хирургиялық араласу жоспарланды. Операция алдында дәрігер тубералдық анестезия жасады. Осы кезде қай нерв(тер) блокадаланады?
- <variant> жоғарғы артқы альвеолярлық нервтер
- <variant> жоғарғы ортаңғы альвеолярлық нервтер
- <variant> қанат-тандай түйіні
- <variant> мұрын-тандай нервi
- <variant> үлкен тандай
- <question> Науқасқа үстіңгі жақтың қатты тандай аймағына хирургиялық немесе стоматологиялық манипуляция жасау жоспарланды. Операция алдында дәрігер үлкен тандай тесігі арқылы анестезия жасады. Осы кезде қай жүйке(лер) блокадаға ұшырайды?
- <variant> үлкен тандай жүйкесі
- <variant> мұрын-тандай жүйкесі
- <variant> жоғарғы ортаңғы тіс өрімшесі
- <variant> үлкен және ортаңғы тандай жүйкелері
- <variant> мұрын-тандай және үлкен тандай жүйкелері
- <question> Науқаста тыныс жолының бітелуіне байланысты жедел трахеостомия жасау қажет болды. Хирург кеңірдек сақиналарына тілік жасамақшы. Осы кезде скальпельді қалай дұрыс ұстау керек?

ONTÜSTIK-QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ	 SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Кафедра «Топографиялық анатомия және гистология»	56 беттің 1 беті
Бақылау өлшеу құралдары	

<variant> «қаламсап» тәрізді

<variant> жүзін жоғары қаратып

<variant> «доға» тәрізді

<variant> «ас үй пышағы» сияқты

<variant> жұдырықта ұстап

<question> Стоматолог науқасқа таңдайлық жансыздандыру жасауды жоспарлап отыр.

Анестетикті дұрыс енгізу орнын таңдау қажет. Таңдайлық жансыздандыру жасау кезінде анестетикті қай аймаққа дұрыс енгізу керек?

<variant> қатты таңдайдың шырышты қабатына, екінші премоляр деңгейінде қызыл иектен 1 см шегініп

<variant> қатты таңдайдың шырышты қабатына, қызыл иектен 1 см шегініп

<variant> жұмсақ таңдайдың шырышты қабатына, екінші моляр деңгейінде қызыл иектен 1 см шегініп

<variant> қатты таңдайдың шырышты қабатына, бірінші премоляр деңгейінде қызыл иектен 1 см шегініп

<variant> қатты таңдайдың шырышты қабатына, қызыл иектен 1 см шегініп

<question> Науқаста тіл аймағындағы қатты қан кетуді тоқтату мақсатында хирург жакасты үшбұрышында Пирогов үшбұрышын бағдарлық нүкте ретінде пайдаланып, тамырды байламақшы. Осы үшбұрыштың ішкі бағдарлық нүктесі арқылы қандай құрылымға қолжеткізуге болады?

<variant> a. lingualis

<variant> a. facialis

<variant> v. lingualis

<variant> n. hypoglossus

<variant> n. facialis

<question> Жол-көлік оқиғасынан кейін науқаста бас сүйегінің жарақаты анықталды. Қарау кезінде сыртқы есту жолынан қан кету және ликворея байқалды. Мұндай белгілер көбінесе қай сүйек сынған кезде пайда болады?

<variant> самай сүйегі

<variant> қанаттәрізді сүйек

<variant> үстіңгі жақ сүйегі

<variant> шүйде сүйегі

<variant> тор сүйегі

<question> Хирургиялық операция кезінде дәрігер тері киындысын және бұлшықеттерді ажыратып алғаннан кейін сүйекке жетті. Осы сәттен кейін ол распаторды қолданбақшы. Распаторды қолданудың көрсеткіші қандай жағдайда болады?

<variant> сүйектен сүйекқабығын ажыратуға

<variant> сүйекті кесуге

<variant> сүйек шығыңқыларын қыршып алуға

<variant> сүйек қуыстарын қыруға

<variant> бассүйекті трепанациялау кезінде кіретін тесіктерді қалыптастыруға

<question> Науқаста қатты қан кетуді тоқтату үшін хирург сыртқы ұйқы артериясын байлау операциясын жоспарлады. Операция барысында тамырға жету үшін тілік қай жерде жасалады?

<variant> төменгі жақ сүйегінің бұрышынан төмен 5–6 см-ге дейінгі аймақта төс-бұғана-емізікше бұлшықетінің алдыңғы жиегі бойымен тілік

<variant> төменгі жақ сүйегінің бұрышынан оның негізіне параллель 5–6 см ұзындықтағы тілік

<variant> төс-бұғана буынынан сыртқа қарай 1–2 см қашықтықта, бұғананың үстінде жауырынның қармақтәрізді өсіндісіне дейінгі тілік

<variant> бұғана алдыңғы бетімен 10–14 см көлденең тілік

<variant> төс-бұғана-емізікше бұлшықетінің артқы жиегі бойымен 6–8 см тілік

ONTÜSTIK-QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Кафедра «Топографиялық анатомия және гистология» Бақылау өлшеу құралдары		56 беттің 1 беті

<question> Науқаста мойын аймағындағы іріңді инфекция ұйқы қынабы аймағына таралғаны анықталды. Дәрігер инфекцияның ары қарай таралу бағытын болжауы қажет. Ұйқы қынабы арқылы инфекцияның таралуы мүмкін негізгі бағытты көрсетіңіз:

- <variant> ретровисцералдық кеңістік
- <variant> жоғарғы ортаңғы көкірек
- <variant> жақасты безінің фасциялық қапшығы
- <variant> төс-бұғана-еміздікше бұлшықетінің фасциялық қапшығы
- <variant> висцерал алдындағы кеңістік

<question> Науқас төменгі жақ аймағынан жарақат алып, төменгі жақ сүйегінің сынуы анықталды. Дәрігер сүйек фрагменттерінің ығысу бағытын болжауы қажет. Төменгі жақ сынған жағдайда фрагменттердің ығысу бағытын анықтау үшін қандай негізгі факторды ескеру керек?

- <variant> Жеке бұлшықеттердің тартылу бағыты
- <variant> Механикалық соққы күші
- <variant> Науқастың жасы
- <variant> Контрфорстардың бағыты
- <variant> Тамыр-нерв шоғырларының бағыты

<question> Автокөлік апатынан кейін науқаста бас сүйегінің ортаңғы шұңқырының сынуы анықталды. Жарақаттан кейін науқаста жүйкелік бұзылыстар байқала бастады. Ортаңғы бас сүйек шұңқыры сынғанда қандай жүйкелік бұзылыстардың пайда болуы мүмкін?

- <variant> ішкі көз қиғаштығы (ішкі страбизм)
- <variant> тіл бұлшықеттерінің салдануы
- <variant> мойынның алдыңғы бөлігінде сезімталдықтың жоғалуы
- <variant> дәм сезудің жоғалуы
- <variant> көкет (диафрагма) парезі

<question> Науқас басына жарақат алып, бас сүйек күмбезінің терісінде кең көлемді скальпингтік жара анықталды. Хирург жараның тез таралу себебін түсіндіруі керек. Бас сүйек күмбезінің терісінің скальпингтік жараларының негізгі себебі неде?

- <variant> тері мен апоневротикалық қалқан арасында дәнекер тін талшықтарының болуы
- <variant> сүйектердің ерекше құрылысы
- <variant> теріасты шел қабатындағы тамыр-жүйке түзілістері
- <variant> сүйек қабығы астындағы көп мөлшердегі клетчатка
- <variant> теріасты шел қабатындағы веналық синустардың болуы

<question> Науқаста жұтқыншақ абсцессінен кейін мойынның терең кеңістіктеріне қабыну таралу белгілері байқалды. Дәрігер өңеш артындағы клетчатканың анатомиялық орналасуын және одан қабынудың таралу бағытын анықтауы қажет. Өңеш артындағы клетчатка қай жерде орналасады және одан қабыну қай бағытта таралуы мүмкін?

- <variant> 5 пен 4 арасында, жоғарыға – жұтқыншақ артындағы кеңістікке, төменге – артқы ортаңғы көкірекке
- <variant> 2 мен 3 арасында, жоғарыға – жұтқыншақ алдындағы кеңістікке, төменге – алдыңғы көкірекке
- <variant> 3 пен 4 арасында қалады
- <variant> 1 мен 2 арасында, кеңірдек артына

<variant> 4-ші шандырдың париеталдық және висцералдық жапырақшалары арасында

<question> Төменгі азу тісті жұлу кезінде науқаста қанаттәрізді-жақасты кеңістігінің абцесі пайда болды. Мұндай асқыну көбінесе қай анестезиядан кейін дамиды?

- <variant> төменгі жақтық
- <variant> төмпешік
- <variant> кеуделік
- <variant> инфильтрациялық
- <variant> инфраорбитальдық

ОҢТҮСТІК-ҚАЗАҚСТАН MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ	 SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Кафедра «Топографиялық анатомия және гистология»	56 беттің 1 беті
Бақылау өлшеу құралдары	

<question> Науқасқа бет аймағында анестезия жасау жоспарланды. Қандай анестезия түрін қолдану кезінде қанаттәрізді веноздық өрімді жарақаттау ықтималдығы жоғары?

- <variant> төмпешік
- <variant> инфраорбитальдық
- <variant> кеуделік
- <variant> тандайлық
- <variant> инфильтрациялық

<question> Науқаста ірінді паротит дамыды. Эрозиялық қан кету байқалуда. Қай артериядан қан кетуі мүмкін екенін клиникалық жағдайда дұрыс анықтаңыз:

- <variant> бет артериясы
- <variant> жоғарғы жақ артериясы
- <variant> ішкі ұйқы артериясы
- <variant> терең самай артериясы
- <variant> шүйде артериясы

<question> Науқасқа төменгі азу тістерін жұлу немесе стоматологиялық манипуляция жасау алдында төменгі жақтық анестезия жасалды. Осы кезде қай нерв тармақтары жансыздандырылады?

- <variant> төменгі альвеолярлық нерв
- <variant> жоғарғы артқы альвеолярлық нервтер
- <variant> жоғарғы алдыңғы альвеолярлық нервтер
- <variant> үлкен тандайлық нерв
- <variant> кіші тандайлық нерв

<question> Науқасқа төменгі жақ аймағында күрделі стоматологиялық манипуляция жасау қажет. Қандай анестезия кезінде төменгі альвеолярлық, тілдік және ұрт нервтерінің өткізгіштігі бір уақытта ажыратылады?

- <variant> төменгі жақтық
- <variant> кеуделік
- <variant> инфраорбитальдық
- <variant> төмпешік
- <variant> сопақша тесікте

<question> Науқасқа жоғарғы жақ немесе төменгі жақ аймағында стоматологиялық манипуляция жасау жоспарланды. Сопақ тесігі аймағында қай жүйкенің анестезиясы жасалады?

- <variant> төменгі жақ жүйкесі
- <variant> бет жүйкесі
- <variant> тіл-жұтқыншақ жүйкесі
- <variant> көз шарасы жүйкесі
- <variant> үстіңгі жақ жүйкесі

<question> Сіз науқасқа инцизивтік анестезия жасадыңыз. Осыдан кейін қандай аумақтың жансызданатынын дұрыс анықтаңыз:

- <variant> кескіш тістер аймағындағы қызыл иек, шырышты қабық, қатты тандайдың сүйекқабығы
- <variant> азу тістер аймағындағы шырышты қабық
- <variant> қатты тандайдың алдыңғы бөлімінің шырышты қабығы
- <variant> қатты тандайдың артқы бөлімінің шырышты қабығы
- <variant> жоғарғы жақ тістері

<question> Вагосимпатикалық блокада жасау қажет болған науқасқа Вишневский әдісі бойынша дұрыс позиция қандай? Мысалы, науқасқа мойын - иық аймағында операция жасау жоспарлануда.

- <variant> шалқасынан жату
- <variant> оң қырымен жату
- <variant> сол қырымен жату
- <variant> хирургке караған күйде отыру
- <variant> хирургке арқасын беріп отыру

ОҢТҮСТІК-ҚАЗАҚСТАН MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Кафедра «Топографиялық анатомия және гистология» Бақылау өлшеу құралдары		56 беттің 1 беті

<question> Науқасқа стоматологиялық операция алдында Уваров әдісі бойынша үшкіл нервке өткізгіштік анестезия жасау қажет болды. Инені дұрыс орналастыру үшін қай аймақты тандайды?

<variant> құлақ қалқанының (козелок) алдында 2 см жерде

<variant> бет сүйек доғасының ортасынан жоғары

<variant> бет сүйек доғасының ортасынан төмен

<variant> бет сүйек доғасының ортасынан 2 см жоғары

<variant> құлақ қалқанының тура алдында

<question> Науқаста маңдай-төбе-шүйде аймағында жара бар және алғашқы хирургиялық өңдеу қажет. Жұмсақ тіндерді қалай тілу керек?

<variant> бастың жоғарғы нүктесіне қатысты радиальді бағытта

<variant> бойлық бағытта

<variant> көлденең бағытта

<variant> жараны айқыш тәрізді тіледі

<variant> скальпирлейді

<question> Науқаста тоңып қалудан кейін беттегі бір жақ мимикалық бұлшықеттердің салдануы байқалды, бұл қабынуды көрсетеді:

<variant> бет нерві

<variant> үшкіл нерв

<variant> жоғарғы жақ нерві

<variant> төменгі жақ нерві

<variant> көзасты нерв

<question> Науқасқа жарақаттан кейін төменгі жақ сүйегінің сынығы диагнозы қойылды.

Сынықтардың ығысуы көбінесе неге байланысты болады?

<variant> бұлшықеттер тартылысының бағытына

<variant> соққы бағытына

<variant> төменгі жақ сүйегінің пішініне

<variant> тістесудің (прикус) түріне

<variant> самай-төменгі жақ буынының қозғалғыштығына

<question> Науқасқа жоғарғы тістерді туберальды анестезиямен жансыздандыру қажет. Бұл жағдайда жоғарғы альвеолалық нервтердің қайсысы бөгеледі?

<variant> артқы

<variant> ортаңғы

<variant> алдыңғы

<variant> артқы, ортаңғы

<variant> ортаңғы, алдыңғы

<question> Науқастың төменгі тістерін емдеу үшін ішкі ауыз арқылы аподактильдік әдіспен мандибулярлық анестезия жасау қажет. Инені дұрыс енгізу үшін қандай анатомиялық бағдар қолданылады?

<variant> қанат-жақ қатпары

<variant> тіс артындағы ойық

<variant> өтпелі қатпар

<variant> самай қыры

<variant> төменгі жақ тесігі

<question> Науқасқа торустық анестезия әдісімен жансыздандыру қажет. Бұл әдісте қандай нервтер бөгеледі?

<variant> тілдік, ұрттық және төменгі альвеолалық

<variant> жоғарғы артқы альвеолалық тармақтар

<variant> тілдік және ұрттық

<variant> тілдік және төменгі альвеолалық

<variant> тілдік, төменгі альвеолалық және иек

ОҢТҮСТІК-ҚАЗАҚСТАН MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Кафедра «Топографиялық анатомия және гистология» Бақылау өлшеу құралдары		56 беттің 1 беті

<question> Науқасқа жоғарғы жақтың артқы бөлігінде стоматологиялық анестезия жасалуда. Туберальдық анестезия кезінде қай құрылымдар бөгеледі?

- <variant> жоғарғы артқы альвеолалық нервтер
- <variant> жоғарғы ортаңғы альвеолалық нервтер
- <variant> қанат-тандай түйіні
- <variant> мұрын-тандай нерві
- <variant> үлкен тандай нерві

<question> Науқасқа жоғарғы тістерді жансыздандыру үшін инфраорбиталды анестезия жасалуда. Қай нысана нүктесін пайдаланады?

- <variant> жоғарғы жақтың алдыңғы бетінде орналасқан көзасты тесігі
- <variant> жоғарғы жақ төмпегі, ондағы тесіктерімен
- <variant> үлкен тандай тесігі
- <variant> күрек тісі тесігі
- <variant> қанат-тандай ойысы

<question> Науқаста тыныс алу жолын тез ашу қажет болғанда коникотомия жасалуда. Қалқансақина тәрізді байламды кесу қандай бағытта жүргізіледі?

- <variant> бойлық
- <variant> көлденең
- <variant> қиғаш
- <variant> W-тәрізді
- <variant> X-тәрізді

<question> Науқаста бетке хирургиялық тілік жасау жоспарлануда. Қай нервтің тармақтарын зақымдамау үшін тілік бағытын ескеру қажет?

- <variant> бет нерві
- <variant> көз нерві
- <variant> жоғарғы жақ нерві
- <variant> төменгі жақ нерві
- <variant> тіл-жұтқыншақ нерв

<question> Науқас қатты ісіну салдарынан (Квинке ісігі) жедел тыныс жетіспеушілігіне түсті. Жедел түрде тыныс жолын қалпына келтіру үшін хирург трахеяға операция жасады: алдыңғы мойын қабаттары ашылып, кеңірдек қуысына арнайы канюля енгізілді. Бұл процедураның негізгі мақсаты мен жүзеге асырылу әдісі қалай аталады?

- <variant> Кеңірдекті ашып, оның қуысына канюля енгізу (трахеостомия)
- <variant> Асфиксияны болдырмау үшін көмейді ашу,
- <variant> Ұйқы қынабын ашу
- <variant> Сақина-қалқанша байланысын (коникотомия) ашу
- <variant> Жасанды өкпе вентиляциясын жүргізу

Түсіну

<question> Мойын өрімінің құрылымын зерттегенде оның қандай жұлын-ми нервлерінің тармақтарынан түзілуін анықтауға болады?

- <variant> алдыңғы
- <variant> артқы
- <variant> менингеальдық
- <variant> қосқыш
- <variant> афференттік

<question> Мойын өрімінің сезімтал тармақтары тері астына шығып, бет пен мойынның сезімін қамтамасыз етеді. Бұл тармақтар қай жерден шығады?

- <variant> төс-бұғана-емізікше бұлшықетінің артқы қырының ортасынан бұғана ортасына дейін жүргізілген сызық бойымен
- <variant> төс-бұғана-емізікше бұлшықетінің артқы қырының ортасынан
- <variant> құлақ қалқанының аралық қыры ойығында

ОҢТҮСТІК-ҚАЗАҚСТАН MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Кафедра «Топографиялық анатомия және гистология» Бақылау өлшеу құралдары		56 беттің 1 беті

<variant> кішкене бұғанаүсті шұңқыршасында

<variant> қалқан шеміршегінің жоғарғы мүйізі деңгейінде

<question> Мойын өрімінің аралас тармақтарын зерттегенде, олардың қайсысы қозғалыс пен сезімталдық функцияларын бірге жүзеге асырады?

<variant> үлкен құлақ нерві

<variant> көкет (диафрагмалық) нерві

<variant> кіші шүйде нерві

<variant> мойынның көлденең нерві

<variant> мойын ілмегінің артқы түбірі

<question> Мойын ілмегі (ansa cervicalis) қандай бұлшықеттерді иннервациялайды, яғни олардың қозғалысын қамтамасыз етеді?

<variant> тіл асты астындағы бұлшықеттерді

<variant> көкетті

<variant> төс-бұғана-емізікше бұлшықетін

<variant> тіл асты үстіндегі бұлшықеттерді

<variant> терең бұлшықеттерді

<question> Қос бұлшықет аралық кеңістіктің майлы кеңістігін қоршап, оның шекарасын анықтайтын қандай бұлшықеттер бар?

<variant> жақасты-тіласты және иекасты-тіласты

<variant> жақасты-тіласты және екіқарындының алдыңғы құрсақшасы

<variant> иекасты-тілдік және тіласты-тілдік

<variant> жақасты-тіласты және тіласты-тілдік

<variant> оң және сол иекасты-тілдік

<question> Трахеостомия кезінде кеңірдектің саңылауын кесудің ұзындығы қандай критерий бойынша таңдалуы керек?

<variant> Трахеостомиялық канюляның диаметріне сәйкес

<variant> Кеңірдек кеңейткішінің диаметріне сәйкес

<variant> Бронхоскоптың диаметріне сәйкес

<variant> Жара кеңейткішінің диаметріне сәйкес

<variant> Науашық зондтың диаметріне сәйкес Түсіну деңгейіне сай сұрақты былай өзгертуге болады:

<question> Өнеш аплазиясы дегеніміз не және ол қандай өзгерісті білдіреді?

<variant> Өнештің толық немесе ішінара болмауы

<variant> Өнештің толық бітеу (облитерациясы)

<variant> Өнештің ішінара бітеуі

<variant> Өнештің қысқаруы

<variant> Өнештің қосарлануы

<question> Қатты ми қабығының қойнауынан қан кету өздігінен тоқтамайтын себебі неде?

<variant> Веналық қысымның жоғары болуына байланысты

<variant> Қойнаудың үшбұрышты пішініне байланысты

<variant> Қанның ұюының төмендеуіне байланысты

<variant> Жұлын сұйықтығы қысымының жоғары болуына байланысты

<variant> Артериялық қысымның жоғары болуына байланысты

<question> Жарада жоғарғы жақ артериясынан қан кетуді тоқтату мүмкін болмаған жағдайда, қан ағымын қандай тамырды байлау арқылы бақылауға алады?

<variant> Сыртқы ұйқы артериясын

<variant> Бет артериясын

<variant> Төменгі альвеолалық артерияны

<variant> Ішкі ұйқы артериясын

<variant> Мойындырық венаны

ONTÜSTIK-QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Кафедра «Топографиялық анатомия және гистология» Бақылау өлшеу құралдары		56 беттің 1 беті

<question> Бетке жасалатын тіліктерді радиалды бағытта жасаудың негізгі мақсаты неде?

<variant> Бет нервiнiң тармақтарына зақым келтiрмеу

<variant> Ең кең қолжетiмдiлiктi алу

<variant> Үшкiл нервтiң тармақтарына зақым келтiрмеу

<variant> Бет артериясының тармақтарына зақым келтiрмеу

<variant> Құлақманы безi өзегiне зақым келтiрмеу

<question> Науқтаста көз айналмалы бұлшықетiнiң қызметi бұзылған, бет асимметриясы және ерiн бұрышының салбырауы байқалады. Бұл белгiлер қай нервтiң зақымданғанын көрсетедi?

<variant> Бет нервi

<variant> Үшкiл нервтiң үшiншi тармағы

<variant> Үшкiл нервтiң екiншi тармағы

<variant> Шүйде нервi

<variant> Қосымша нерв

<question> Операциялық хирургия қандай аспектілерді зерттейді және оның негізгі мақсаты неде?

<variant> Адамның анатомиялық аймақтарының қабат-қабат құрылысын зерттеу

<variant> Хирургиялық операциялар техникасын зерттеу

<variant> Ағзалардың жүйелер бойынша құрылысын зерттеу

<variant> Ағзалардың топографиясының, көлемінің және формасының жасқа байланысты айырмашылықтарын зерттеу

<variant> Ағзаның патологиялық жағдайдағы морфологиясын зерттеу

<question> Топографиялық анатомия нені зерттейді және бұл зерттеудің негізгі мақсаты неде?

<variant> Адам денесінің аймақтары бойынша ағзалардың өзара орналасуы мен қарым-қатынасын зерттеу

<variant> Ағзалардың вариантты құрылысын зерттеу

<variant> Ағзалардың көлемі мен формасының жасқа байланысты айырмашылықтарын зерттеу

<variant> Ағзалар жүйелерін зерттеу

<variant> Ағзалардың және оларды қоршаған құрылымдардың патологиялық жағдайдағы морфологиясын зерттеу

<question> Операциялық қолжетім дегеніміз не және оның мақсаты неде?

<variant> Операция кезеңі, ол ағзаны хирургиялық араласу жасау үшін ашуды қамтамасыз етеді

<variant> Тіндердің бүтіндігін қалпына келтіру

<variant> Науқасты операцияға дайындау

<variant> Осы патология кезінде операцияның нақты нұсқасын қолдану

<variant> Зақымданған ағзадағы операцияның негізгі кезеңі

<question> Операциялық әдіс дегеніміз не және ол не үшін қолданылады?

<variant> Патологиялық ошақты жоюдың таңдалған тәсілі

<variant> Хирургиялық араласу жасау үшін ағзаны ашу

<variant> Тіндердің зақымдануын азайтып, жансыздандыруды қамтамасыз ететін тәсіл

<variant> Берілген операция техникасының ерекшеліктері

<variant> Науқасты операцияға дайындау

<question> Жараның алғашқы хирургиялық өңделуі дегеніміз не және оның мақсаты неде?

<variant> Қабыну белгілері дамымай тұрып жараға жасалатын алғашқы араласу

<variant> Жара жиектерін сау тіндер шегінде кесіп алып тастау

<variant> Жара құрамын 24 сағатқа дейінгі кезеңде алу

<variant> Жарадан бөгде денелерді алып тастау

<variant> Жараны жаракаттан кейін бірден өңдеу

<question> Инфильтрациялық анестезияның негізгі мақсаты және әдісі неде?

<variant> Жұмсақ тіндерді анестетик ерітіндісімен қабат-қабат тығыз инфильтрациялау

<variant> Препаратты шырышты қабықтарға немесе теріге жағу

<variant> Анестезия ерітіндісін фасция астына енгізу

ONTÜSTIK-QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Кафедра «Топографиялық анатомия және гистология» Бақылау өлшеу құралдары		56 беттің 1 беті

- <variant> Анестетикті инфильтратка енгізу
- <variant> Анестетикті жүйке сабағына енгізу
- <question> Аппликациялық анестезия қалай жүзеге асады және оның мақсаты неде?
- <variant> Препаратты шырышты қабықтарға немесе теріге жағу арқылы
- <variant> Анестетикті жүйке сабағына енгізу арқылы
- <variant> Жұмсақ тіндерді тығыз қабат-қабат инфильтрациялау арқылы
- <variant> Анестетикті инфильтратка енгізу арқылы
- <variant> Анестезия ерітіндісін фасция астына енгізу арқылы
- <question> Өткізгіштік анестезия қалай жүзеге асады және оның негізгі мақсаты неде?
- <variant> Жүйке сабақтары мен өрімдерін инфильтрациялау арқылы
- <variant> Жұмсақ тіндерді тығыз қабат-қабат инфильтрациялау арқылы
- <variant> Препаратты шырышты қабықтарға немесе теріге жағу арқылы
- <variant> Ағзаға қапшық түзетін фасция астына анестезия ерітіндісін енгізу арқылы
- <variant> Анестетикті инфильтратка енгізу арқылы
- <question> Жараға екінші реттік тігістер қашан салынады және бұл процедураның мақсаты неде?
- <variant> Ірінді жараны емдеу аяқталғаннан кейін
- <variant> Жараның алғашқы хирургиялық өңделуінен кейін
- <variant> Үстірт жараны (тері шегінде) тіккенде
- <variant> Жараны жарақаттан кейін 24 сағаттан асқан соң хирургиялық өндегенде
- <variant> Жараны жарақаттан кейін 48 сағаттан асқан соң хирургиялық өндегенде
- <question> Жалпы ұйқы артериясы проекциялық сызық бойынша қалай өтеді және бұл ақпарат не үшін маңызды?
- <variant> Төс-бұғана буынынан құлақ қалқанының аралық ойығына дейін, бұл ақпарат артерияның анатомиялық орналасуын клиникалық және хирургиялық мақсатта дәл табуға мүмкіндік береді
- <variant> Төс-бұғана-еміздікше бұлшықетінің артқы шетінің ортасы мен бұғананың ортасын қосатын сызық бойымен, бұл ақпарат артерияның анатомиялық орналасуын клиникалық мақсатта дәл табуға мүмкіндік береді
- <variant> Төс-бұғана-еміздікше бұлшықетінің артқы шеті бойымен, маңыздылығы жоқ
- <variant> Қалқанша шеміршектен кіші бұғаналық ойыққа қарай, бұл ақпарат артерияның анатомиялық орналасуын клиникалық және хирургиялық мақсатта дәл табуға мүмкіндік береді
- <variant> Қалқанша шеміршектің жоғарғы жиегі деңгейінде, ұйқы үшбұрышында, бұл ақпарат артерияның анатомиялық орналасуын хирургиялық мақсатта дәл табуға мүмкіндік береді
- <question> Мойынның ақ сызығы қандай анатомиялық құрылымдардың бітісуінен түзіледі және оның маңызы неде?
- <variant> Мойын фасциясының беткей және қалқаналды пластинкаларының бітісуінен, маңызы: хирургиялық жол көрсеткіш, анатомиялық бағдар, қауіпсіздік
- <variant> Беткей фасцияның екі жапырақшаға ажырауынан, маңызы жоқ
- <variant> Беткей және омыртқаалды пластинкаларының бітісуінен маңызы: хирургиялық жол көрсеткіш, анатомиялық бағдар, қауіпсіздік
- <variant> Қалқаналды және омыртқаалды пластинкалардың бітісуінен, маңызы: хирургиялық жол көрсеткіш, анатомиялық бағдар
- <variant> Ұйқы қынабының висцералдық фасциямен бітісуінен маңызы: хирургиялық жол көрсеткіш, қауіпсіздік
- <question> Шықшыт сілекей безінің шығару өзегінің беттегі проекциясы қалай орналасады және бұл ақпарат клиникада не үшін маңызды?
- <variant> Құлақ қалқаны мүжінің (мочка) негізін ауыз бұрышымен қосатын сызық, маңызы:клиникалық бағыттауыш
- <variant> Төменгі жақ бұрышын көздің ішкі бұрышымен қосатын сызық, маңызы жоқ
- <variant> Құлақ қалқаны мүжінің негізін көздің ішкі бұрышымен қосатын сызық, маңызы:клиникалық бағыттауыш

ONTÜSTIK-QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Кафедра «Топографиялық анатомия және гистология» Бақылау өлшеу құралдары		56 беттің 1 беті

- <variant> Самай доғасына параллель сызықтан 1 см жоғары, маңызы:клиникалық бағыттауыш
- <variant> Сыртқы есту жолын мұрын қанатымен қосатын сызық, маңызы:жок
- <question> Контрфорс дегеніміз не және ол сүйек тінінде қандай қызмет атқарады?
- <variant> Кеуекті сүйек тінінің қалындаған аймағы, маңызы:қолдауыш
- <variant> Кеуекті сүйек тініндегі сәулелік бағыттағы аймақ, маңызы:қолдауыш
- <variant> Механикалық әсерге әлсіз қарсыласатын сүйек тіні аймағы, маңызы:қолдауыш
- <variant> Тесігі жоқ сүйек аймағы, маңызы:жок
- <variant> Бет сүйектерінің қосылу орны, маңызы:жок
- <question> «Қаз табандары» деп аталатын жүйке өрімі қандай жүйкелердің тармақтарынан түзіледі және оның қызметі неде?
- <variant> Бет жүйкесі (facialis), қызметі: бет бұлшықеттерін қозғалтатын жүйке өрімі
- <variant> Көз үсті жүйкесі (supraorbitalis), қызметі: бет мимикасының негізгі моторлық тірегі
- <variant> Бет (щек) жүйкесі (buccalis), қызметі: бет бұлшықеттерін қозғалтатын жүйке өрімі
- <variant> Иек жүйкесі (mentalis), қызметі: мимика
- <variant> Құлақ-самай жүйкесі (auriculotemporalis), қызметі: мимика
- <question> Кронляйн сызбасына сәйкес қатты ми қабығының ортаңғы артериясының дінінің орналасу бағдарлары қай жерде және бұл ақпарат хирургияда не үшін маңызды?
- <variant> Алдыңғы вертикальдың төменгі горизонтальмен қиылысуы, маңызы: анатомиялық нүкте
- <variant> Алдыңғы вертикаль мен жоғарғы горизонталь қиылысуы, маңызы: анатомиялық нүкте
- <variant> Ортаңғы және артқы вертикальдың арасында, маңызы: анатомиялық нүкте
- <variant> Артқы вертикальдың сагитталы сызықпен қиылысуы, маңызы:жок
- <variant> Артқы вертикальдың төменгі горизонтальмен қиылысуы, маңызы:жок
- <question> Көру артериясының аневризмасында қандай неврологиялық жағдай дамиды және оның себебі неде?
- <variant> Аневризма жағындағы көздің соқырлығы, себебі: локальды қысым және қан жеткіліксіздігі
- <variant> Қарама-қарсы жақтың соқырлығы, себебі: локальды қысым және қан жеткіліксіздігі
- <variant> Бет жүйкесінің салдануы, себебі: локальды қысым
- <variant> Есту қабілетінің жоғалуы ,себебі: қан жеткіліксіздігі
- <variant> Мұрын-ерін қатпарының тегістелуі, себебі: локальды қысым және қан жеткіліксіздігі
- <question> Алдыңғы бас сүйек шұңқыры аймағындағы сынудың клиникалық белгілері қандай болып табылады?
- <variant> Мұрыннан қан кету
- <variant> Мимикалық бұлшықеттердің салдануы
- <variant> Естудің бұзылуы
- <variant> Шайнау бұлшықеттерінің салдануы
- <variant> Құлақтан қан кету
- <question> Самай сүйегінің пирамидасы зақымданғанда қандай клиникалық бұзылулар байқалады?
- <variant> Шайнау бұлшықеттерінің салдануы
- <variant> Мимикалық бұлшықеттердің салдануы
- <variant> Мұрыннан қан кету
- <variant> Көрудің бұзылуы
- <variant> Конъюнктиваға қан құйылу
- <question> Ортаңғы құлақтың созылмалы қабынуы қандай көршілес құрылымдарға таралуы мүмкін?
- <variant> Емізікше өсіндісінің үңгіріне
- <variant> Самайасты бұлшықетінің астына
- <variant> Алдыңғы бас сүйек шұңқырына
- <variant> Қуысты синусқа
- <variant> Ұйқы артериясының каналына

ONTÜSTIK-QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Кафедра «Топографиялық анатомия және гистология» Бақылау өлшеу құралдары		56 беттің 1 беті

<question> Ортаңғы бас сүйек шұңқыры зақымдалғанда қандай клиникалық белгілер пайда болуы мүмкін?

- <variant> Құлақтан қан кету
- <variant> Мұрыннан қан кету
- <variant> Мұрын-жұтқыншақтан қан кету
- <variant> Көздің соққылап (пульсация) шығып тұруы
- <variant> Асқазаннан қан кету

<question> Бас сүйек күмбезінің синустары қандай веналық анастомоздар арқылы байланысады?

- <variant> Беткей самай венасының төбе тармағы эмиссарий арқылы жоғарғы сагитталды синуспен
- <variant> Беткей самай венасының маңдай тармағы шүйде венасымен
- <variant> Көзүстілік венасы беткей самаймен
- <variant> Сыртқы ұйқы артериясының тармақтары ішкі ұйқы артериясымен
- <variant> Көзүстілік венасы шүйде артериясымен

<question> Бас сүйек күмбезінің теріасты қабатының қабыну үрдісі қалай таралады?

- <variant> Төгілген сипатта
- <variant> Шектелген сипатта
- <variant> Сүйек шегінде шектелген
- <variant> Сіңірлі қалқан шегінде таралады
- <variant> Бұлшықет шегінде шектелген

<question> Жұтқыншақ арты абсцесі қандай сипатта болуы мүмкін?

- <variant> Біржақты
- <variant> Екіжақты
- <variant> Фасцияаралық
- <variant> Трахеаалдық
- <variant> Омыртқа алдындағы

<question> Бас сүйек күмбезінің теріасты шел қабатындағы тамырлар кесілген кезде неге ашық қалады?

- <variant> Анастомоз желісінің айқын болуына байланысты
- <variant> Адвентициясының дәнекер тін талшықтарымен бітісіп кеткендігіне байланысты
- <variant> Тамырлардың ірі калибрлі болуына байланысты
- <variant> Тамыр қабырғаларының жұқалығына байланысты
- <variant> Қан ағысының жылдамдығының үлкен болуына байланысты

<question> Қай нерв зақымданғанда беттің терісінің сезімталдығы бұзылады?

- <variant> Үшкіл нерв
- <variant> Бет нерві
- <variant> Тіл нерві
- <variant> Тіл асты нерві
- <variant> Кезеген нерв

<question> Мұрынның жоғарғы жақ қосалқы қуысының қабыну процесі қалай аталады?

- <variant> Гайморит
- <variant> Фронтит
- <variant> Арахноидит
- <variant> Синусит
- <variant> Этмоидит

<question> Жоғарғы еріннің фурункулы дамыған жағдайда қандай асқынулар пайда болуы мүмкін?

- <variant> Ми абсцесі
- <variant> Дерматит
- <variant> Жақасты үшбұрыштың абсцесі
- <variant> Паротит
- <variant> Стоматит

ONTÜSTIK-QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Кафедра «Топографиялық анатомия және гистология» Бақылау өлшеу құралдары		56 беттің 1 беті

<question> Жұлын сұйықтығында қанның болуы қандай жағдайға тән?

<variant> Субарахноидальді қан құйылуға

<variant> Мидың шайқалуына

<variant> Мидың соғылуына

<variant> Эпидуральді гематомаға

<variant> Субдуральді гематомаға

<question> Бас сүйек ойыстарына ірінді қабыну процестері қандай жолдар арқылы таралуы мүмкін?

<variant> Көз ұясы арқылы

<variant> Кеңірдек арқылы

<variant> Өңеш арқылы

<variant> Тіл арқылы

<variant> Ауыз қуысы арқылы

<question> Қатты ми қабығының қоймаларынан қан кету неге өздігінен тоқтамайды?

<variant> Жоғары веноздық қысым салдарынан

<variant> Қойманың үшбұрышты формасына байланысты

<variant> Қанның ұюының төмендеуінен

<variant> Ликвор қысымының жоғары болуынан

<variant> Жоғары артериялық қысымға байланысты

<question> Скальптың (бас терісінің) құрамына қандай тіндер кіреді және олардың құрылымдық ерекшелігі неде?

<variant> тері, теріасты клетчатка және сіңірлі қалқан, ол бірнеше қабаттан тұрады

<variant> тері және теріасты клетчатка, ол бірнеше қабаттан тұрады,

<variant> барлық жұмсақ тіндер, соның ішінде сүйек қабығы ол бірнеше қабаттан тұрады,

<variant> маңдай-төбе-шүйде аймағының жұмсақ тіндері, ол бірнеше қабаттан тұрады

<variant> бас сүйек күмбезінің сүйек элементтері, ол бірнеше қабаттан тұрады

<question> Ортаңғы ми қабығының артериясы жыртылғанда оның анатомиялық орналасуына байланысты ең жиі қандай асқынудың дамуын дұрыс түсіндіріңіз:

<variant> эпидуралдық гематома түзілуі

<variant> қансыраулық шок

<variant> мидың қатты қабығының қанмен қамтамасыз етілуінің бұзылуы

<variant> ми самай бөлігінің қанмен қамтамасыз етілуінің бұзылуы

<variant> ми маңдай бөлігінің қанмен қамтамасыз етілуінің бұзылуы

<question> Маңдай-төбе-шүйде аймағының теріасты клетчаткасындағы ірінді процесс қатты ми қабығына қалай таралуы мүмкін және бұл қай анатомиялық жол арқылы жүреді?

<variant> бет аймағының веналары арқылы

<variant> фасцияаралық көпірлер арқылы

<variant> самай және төбе артериялары арқылы

<variant> лимфа тамырлары арқылы

<variant> самай және төбе веналары арқылы

<question> Мұрын-ерін қатпарының фурункулды кезінде инфекция қан арқылы қай веналық қоймаға таралуы мүмкін?

<variant> sinus cavernosus

<variant> sinus sagittalis inferior

<variant> sinus sigmoideus

<variant> sinus rectus

<variant> sinus sagittalis superior

<question> Инфраорбитальдық анестезиядан кейін көзасты аймақ терісінің ишемиясы қандай артерияның спазмына байланысты дамиды?

<variant> a. infraorbitalis

<variant> a. transversa faciei

ONTÜSTIK-QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ	SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Кафедра «Топографиялық анатомия және гистология» Бақылау өлшеу құралдары	56 беттің 1 беті

<variant> a. buccalis

<variant> a. facialis

<variant> a. Supraorbitalis

<question> Құлақ маңы сілекей безінің шығару өзегінің проекциясын анықтау үшін қандай сызық жүргізіледі?

<variant> құлақ қалқаншасының түбінен мұрын қанатына дейін

<variant> сыртқы есту жолынан мұрын қанаты мен ауыз бұрышы аралығының ортасына дейін

<variant> төменгі жақтың орта сызығы бойымен

<variant> құлақ қалқаншасының түбінен ауыз бұрышыға дейін

<variant> жақ бұрышынан ауыз бұрышыға дейін

<question> Мұрын қуысы қанат-таңдай шұңқырымен қай тесік арқылы жалғасады?

<variant> негізгі-таңдай тесігі

<variant> жыртқы тесік

<variant> сопақ тесік

<variant> дөңгелек тесік

<variant> бет жүйкесінің каналы

<question> Қанат-таңдай шұңқыры бас қуысына (тікелей) қай тесік арқылы байланысады?

<variant> үстіңгі көз шаралық саңылау

<variant> дөңгелек тесік

<variant> сопақ тесік

<variant> инелік тесік

<variant> мойындырық тесік

<question> Бас сүйек күмбезінің жұмсақ тіндерінде шүйде сүйегіне сәйкес аймақты қамтитын гематома қай қабатта орналасады?

<variant> апоневроз астындағы клетчаткада

<variant> сүйекқабығы астындағы клетчаткада

<variant> теріасты майлы клетчаткада

<variant> апоневроз үстіндегі клетчаткада

<variant> апоневроз аралық клетчаткада

<question> Үлкен ми жарты шарларынан веналық қан мен қатты ми қабығы синустары қай тамыр арқылы ағып шығады?

<variant> ішкі мойын венасы

<variant> сыртқы мойын венасы

<variant> бет венасы

<variant> қанат веналық синусы

<variant> үстіңгі самай венасы

<question> Тұрақты эмиссарлық веналар бас сүйектегі қандай қызмет үшін қажет?

<variant> бассүйек ішілік қысымды реттеу

<variant> сүйекті қоректендіру

<variant> теріасты клетчаткасын қанмен қамтамасыз ету

<variant> бұлшықеттерді қанмен қамтамасыз ету

<variant> сүйекқабығын қанмен қамтамасыз ету

<question> Эмиссарлық веналар қандай веналық құрылымдар арасында байланыс жасайды?

<variant> беткі веналар мен қатты ми қабығы синустары арасында

<variant> диплоикалық және беткі веналар арасында

<variant> қатты ми қабығы синустары мен ми веналары арасында

<variant> беткі веналар мен ми веналары арасында

<variant> теріасты веналарының оң және сол жақтары арасында

<question> Емізікше өсіндінің үңгірі (sinus mastoideus) проекцияланатын аймақ қай квадрантқа сәйкес келеді?

<variant> артқы-үстіңгі квадрант

ОҢТҮСТІК-ҚАЗАҚСТАН MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Кафедра «Топографиялық анатомия және гистология» Бақылау өлшеу құралдары		56 беттің 1 беті

<variant> алдыңғы-төменгі квадрант

<variant> алдыңғы-үстіңгі квадрант

<variant> артқы-төменгі квадрант

<variant> самай сүйегінің қабыршағы

<question> Емізікше өсінді аймағында бет жүйкесінің сүйек каналы проекцияланатын аймақ қай квадрантқа сәйкес келеді?

<variant> артқы-төменгі квадрант

<variant> артқы-үстіңгі квадрант

<variant> үстіңгі квадрант

<variant> алдыңғы-төменгі квадрант

<variant> самай сүйегінің қабыршағы

<question> Эпидуральды гематома қай қабаттар арасында орналасады?

<variant> қатты ми қабығы мен сүйек арасында

<variant> қатты ми қабығы мен өрмекші қабық арасында

<variant> өрмекші қабық пен жұмсақ қабық арасында

<variant> қатты ми қабығының қабаттарының арасында

<variant> жұмсақ ми қабығының астында

<question> Құлақманы сілекей безінің қапшығында әлсіз жерлер қай аймақтарда орналасады?

<variant> бездің шығару өзегі бойында

<variant> бездің жұтқыншақ өсіндісінде

<variant> сыртқы ұйқы артериясы бойында

<variant> төменгі көзұялық саңылауда

<variant> бет нерві тармақтары бойында

<question> Жоғарғы көз ұясының медиальді және ортаңғы үштен бір бөлігінен тік төмен түскен сызық бойымен қай нервтің сезгіш тармақтары шығады?

<variant> үшкіл

<variant> бет

<variant> тіл

<variant> көзқимылдатқыш

<variant> көру

<question> Мойынның алдыңғы аймағының сыртқы бағдарлық нүктелеріне қайсысы жатпайды?

<variant> қалқанша без

<variant> төменгі жақтың төменгі жиегі

<variant> бұғана

<variant> қалқанша шеміршек

<variant> төс-бұғана-емізікше бұлшықеті

<question> Жақасты үшбұрышында m. mylohyoideus пен m. hyoglossus арасындағы саңылаудан қай анатомиялық құрылым өтпейді?

<variant> a. lingualis

<variant> n. lingualis

<variant> v. lingualis

<variant> n. hypoglossus

<variant> ductus submandibularis

<question> Жақасты сілекей безінің фасциялық төсегін қандай құрылым түзеді?

<variant> меншікті фасцияның терең жапырақшасы

<variant> меншікті фасцияның үстіңгі және терең жапырақшасы

<variant> үстіңгі фасция

<variant> мойыншілік фасция

<variant> омыртқаалды фасция

<question> Мойынның негізгі тамыр-нерв шоғынында ішкі мойын венасы жалпы ұйқы артериясына қатысты қай жағында орналасқан?

ОҢТҮСТІК-ҚАЗАҚСТАН MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Кафедра «Топографиялық анатомия және гистология» Бақылау өлшеу құралдары		56 беттің 1 беті

<variant> латеральді

<variant> медиальді

<variant> артында

<variant> алдында

<variant> серіксіз

<question> Мойынның негізгі тамыр-нерв шоғынында кезбе нерв (n. vagus) жалпы ұйқы артериясы мен ішкі мойын венасына қатысты қай жерде орналасады?

<variant> артында, артерия мен венаның арасында

<variant> ішкі мойын венасының алдында

<variant> ішкі мойын венасының латеральді жағында

<variant> алдында, артерия мен венаның арасында

<variant> жалпы ұйқы артериясының медиальді жағында

<question> Мандай-төбе-шүйде аймағының терісінің аз қозғалмалылығы қай құрылымның бітісіне байланысты дамиды?

<variant> бұлшықет-апоневроз қабатымен

<variant> апоневрозасты жасушалы қабатпен

<variant> сүйеккабығымен

<variant> сүйекпен

<variant> фасциямен

<question> Жалпы ұйқы артериясының фасциалды қапшығы қандай фасция қабатынан түзіледі?

<variant> меншікті фасцияның терең жапырағынан

<variant> мойынішілік фасциядан

<variant> мойынның үстіңгі фасциясынан

<variant> меншікті фасцияның үстіңгі жапырағынан

<variant> омыртқаалды фасциядан

<question> Ортаңғы ми қабығының артериясы жыртылғанда оның анатомиялық орналасуына байланысты ең жиі қандай асқынудың дамуын дұрыс түсіндіріңіз:

<variant> эпидуралдық гематома түзілуі

<variant> қансыраулық шок

<variant> мидың қатты қабығының қанмен қамтамасыз етілуінің бұзылуы

<variant> ми самай бөлігінің қанмен қамтамасыз етілуінің бұзылуы

<variant> ми мандай бөлігінің қанмен қамтамасыз етілуінің бұзылуы

<question> Бас сүйек күмбезіне бағытталған жарақаттар кезінде ми қабығының қай веналық синусы жиі зақымдалады және қан кету қаупі неден туындайды?

<variant> жоғарғы сагиталды

<variant> төменгі сагиталды

<variant> тік

<variant> көлденең

<variant> қуысты (кавернозды)

<question> Бас сүйек күмбезі сынған кезде сүйектің қай қабаты жиі зақымдалады және оның клиникалық маңызы неде?

<variant> сыртқы тактайша, қорғаныс

<variant> ішкі тактайша, қорғаныс

<variant> барлық қабаттар, қорғаныс

<variant> кеуекті зат, маңызы жоқ

<variant> бас сүйектің ішкі астары, маңызы жоқ

<question> Емізікше өсіндіні трепанациялағанда қай ми қабығының веналық синусы зақымдалуы мүмкін?

<variant> сигма тәрізді

<variant> сагиталды

<variant> кавернозды

ONTÜSTIK-QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Кафедра «Топографиялық анатомия және гистология» Бақылау өлшеу құралдары		56 беттің 1 беті

<variant> үлкен тас тәрізді

<variant> тік

<question> Лимфа түйіндерінің негізгі қызметі қандай және бұл қызметтің иммунологиялық маңызы неде?

<variant> микробтар мен токсиндерді залалсыздандыру

<variant> лимфоциттер түзілуі

<variant> тромбоциттер синтезі

<variant> лимфоциттерді жинау және тасымалдау

<variant> лимфоциттерді айдау

<question> Төменгі көзұялық саңылау көз ұясын қай қуыстармен байланыстырады және бұл байланыс клиникалық тұрғыда не үшін маңызды?

<variant> қанат-таңдай, жақасты және самай шұңқырларымен, анастомоз

<variant> ортаңғы бас сүйек шұңқырымен, маңызы жоқ

<variant> торлы сүйектің алдыңғы ұяшықтарымен, анастомоз

<variant> торлы сүйектің артқы ұяшықтарымен, маңызы жоқ

<variant> төменгі мұрын жолымен, маңызы жоқ

<question> Мұрын-көз жасы каналы көз ұясын қай құрылыммен байланыстырады және бұл байланыс клиникалық тұрғыда қандай маңызға ие?

<variant> төменгі мұрын жолымен, дренаж

<variant> қанат-таңдай шұңқырымен, қорғаныш

<variant> торлы сүйектің алдыңғы ұяшықтарымен, қолдау

<variant> торлы сүйектің артқы ұяшықтарымен, қолдау

<variant> ортаңғы мұрын жолымен, дренаж

<question> Бет майлы денесі (Биша) қай құрылымдардың арасында орналасады және бұл орналасу оның клиникалық рөліне қалай әсер етеді?

<variant> ұрт бұлшықеті мен ұрт-жұтқыншақ фасциясының арасында, амортизатор

<variant> ұрттың кілегей қабығы мен ұрт бұлшықетінің арасында, буфер

<variant> ұрт-жұтқыншақ фасциясы мен жұқа фасциялы пластинка арасында, қорғаныс

<variant> бет сүйек бұлшықеттері мен платизманың арасында, ролы жоқ

<variant> тері мен платизманың арасында, қорғаныс

<question> Мойынның қай жасушалы кеңістігінің флегмонасы артқы медиастинитке әкелуі мүмкін және бұл асқынудың себебі неде?

<variant> артқы висцералды, себебі бұл кеңістік кеуде қуысына тікелей жалғасып, инфекцияның төменгі медиастиnumға таралуына жол береді

<variant> төсүсті-аралықапоневрозды, төсүсті-аралықапоневрозды, себебі бұл кеңістік инфекцияның кеуде үсті аралық кеңістігіне таралуына бейім

<variant> алдыңғы висцералды, себебі бұл кеңістік инфекцияның алдыңғы медиастиnumға таралуына бейім

<variant> параангиальды, себебі жоқ

<variant> сатылы-төстік, себебі бұл кеңістік инфекцияның кеуде және медиастиnumге түсуіне жол ашады

<question> Мойынның тамыр-жүйке шоғыр қынабында қабыну процесі дамыған жағдайда инфекция әдетте қай бағытқа таралады және бұл қандай клиникалық асқынға әкелуі мүмкін?

<variant> артқы көкірекаралық кеңістікке, себебі бұл бағыт арқылы инфекция төменгі медиастиnumға таралып, өмірге қауіп төндіруі мүмкін

<variant> алдыңғы көкірекаралық кеңістікке, себебі бұл кеңістік арқылы инфекция төменгі медиастиnumға немесе кеуде қуысына таралуы мүмкін

<variant> ауыз қуысына, себебі тамыр-жүйке шоғыр қынабы ауыз қуысына тікелей жалғасып, инфекцияның жоғары қарай таралуына мүмкіндік береді

<variant> кеудеден жоғары клетчаткалық кеңістікке, себебі бұл бағыт арқылы инфекция жоғары

ONTÜSTIK-QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ	 SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Кафедра «Топографиялық анатомия және гистология»	56 беттің 1 беті
Бақылау өлшеу құралдары	

қарай таралып, бет және мойын аймағына әсер етуі мүмкін

<variant> қабыну процесі шектелген болып қалады

<question> Беттегі карбункул немесе фурункул кезінде инфекцияның ми қабықтарына таралуы және венозды синустардың флебиттерінің қалай пайда болуы мүмкін, оның себебі неде?

<variant> Бет веналары мен қатты ми қабығының венозды синустары арасында анастомоздардың болуы

<variant> Инфекцияның ішкі ұйқы артериясы арқылы өтуі

<variant> Бас ішіндегі синустар арасында анастомоздардың болуы

<variant> Лимфа тамырларының анастомоздарының болуы

<variant> Беткей және терең лимфа түйіндерінің анастомоздарының болуы

<question> Мойынның негізгі тамыр-жүйке шоғырының элементтері бір-біріне қатысты қалай орналасқан, олардың синтопиясын анықтаңыз:

<variant> Жалпы ұйқы артериясы – медиальды, ішкі мойын көктамыры – латеральды, кезбе жүйке олардың арасында

<variant> Кезбе жүйке – медиальды, ішкі мойын көктамыры – латеральды, жалпы ұйқы артериясы олардың арасында

<variant> Жалпы ұйқы артериясы – латеральды, ішкі мойын көктамыры – медиальды, кезбе жүйке олардың арасында

<variant> Кезбе жүйке – латеральды, жалпы ұйқы артериясы – медиальды, ішкі мойын көктамыры олардың арасында

<variant> Төменгі қалқанша артериясы – медиальды, тіл көктамыры – латеральды, тіл жүйкесі олардың арасында

<question> Іріңді паротит кезінде қабыну құлақ маңы безінің қаптамасынан тыс таралуының себебі неде, яғни инфекцияның өтуіне ықпал ететін әлсіз жерлер саны қанша?

<variant> 2

<variant> 1

<variant> 3

<variant> 4

<variant> 5

<question> Бет операциясы кезінде бет нервiнiң тармақтарына зақым келтiрмеу үшiн Биша майлы денесiнiң анатомиялық өсiндiлерi қалай пайдаланылады және оның қанша өсiндiсi бар?

<variant> бағдар ретiнде, 3

<variant> қорған ретiнде, 1

<variant> бағдар ретiнде, 2

<variant> қорған ретiнде, 4

<variant> бағдар ретiнде, 5

<question> Тiл артериясына жету үшiн хирург Пирогов үшбұрышының шекараларын қолданады. Оның жоғарғы-сыртқы шекарасы қандай анатомиялық бағдар бойынша белгiленедi?

<variant> Қосқарын бұлшықетiнiң алдыңғы бөлiгi

<variant> Тiл нервi

<variant> Тiласты нервi

<variant> Тiласты-тiл бұлшықетi

<variant> Төс-емiзiкше-бұғана бұлшықетi

<question> Тiлден қатты қан кету кезiнде хирург Пирогов үшбұрышын бағдар ретiнде қолданғанда, қандай артерияны жалаңаштайды және бұл операцияның мақсаты неде?

<variant> Тiл артериясын, қан кетудi тоқтату

<variant> Сыртқы ұйқы артериясын, жедел қан кетудi тоқтату

<variant> Бет артериясын, ауырсынуды басу

<variant> Iшкi ұйқы артериясын, тыныс алуды қалпына келтiру

<variant> Қосалқы артерияны, қан кетудi тоқтату

ONTÜSTIK-QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ	 SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Кафедра «Топографиялық анатомия және гистология»	56 беттің 1 беті
Бақылау өлшеу құралдары	

<question> Ангиография кезінде дәрігер тіл артериясын көріп, оның бастың негізгі артерияларының бірінен таралатынын атап өтті. Қай артериядан тіл артериясы шығады?

<variant> Сыртқы ұйқы артериясынан

<variant> Ішкі ұйқы артериясынан

<variant> Жалпы ұйқы артериясынан

<variant> Омыртқа артериясынан

<variant> Мишық артериясынан

<question> Төменгі жақ асты үшбұрышында тіл артериясын жалаңаштау үшін медик-студент В.Н. Шевкуненко әдісі бойынша қандай фасцияларды кесуі қажет?

<variant> 1-ші, 2-ші және 3-ші

<variant> 1-ші, 2-ші

<variant> Барлық бес фасция

<variant> 5-шіден басқа барлық фасциялар

<variant> 4-ші және 5-ші

<question> Медиастинит кезінде ірің мойын аймағынан таралған жағдайда, инфекцияның артқы орта көкірекке өтуіне себеп болатын мойынның қай майлы кеңістігі?

<variant> Ретровисцеральды

<variant> Төстің үсті апоневрозаралық

<variant> Превисцеральды

<variant> Грубердің соқыр қалтасы

<variant> Парависцеральды

<question> Науқаста алдыңғы көкірек майлы тінінің қабынуы мойыннан таралған инфекциямен байланысты. Бұл инфекция қай майлы кеңістік арқылы өтуі мүмкін?

<variant> Превисцеральды

<variant> Төстің үсті апоневрозаралық

<variant> Ретровисцеральды

<variant> Омыртқа алдындағы

<variant> Парависцеральды

<question> Сілекей бездеріне операция жасағанда В.Н. Шевкуненко әдісін қолдана отырып, қай фасция құлақ маңы, тіласты және төменгі жақ асты сілекей бездерінің қаптамасын түзеді?

<variant> Құлақ маңы, тіласты, төменгі жақ асты

<variant> Төменгі жақ асты

<variant> Тіласты

<variant> Құлақ маңы және тіласты

<variant> Иек

<question> Тілге операция кезінде хирург Пирогов үшбұрышын бағдар ретінде пайдаланады. Бұл үшбұрыштың түбін қай бұлшықет құрайды?

<variant> Тіласты-тіл

<variant> Жақ-тіласты

<variant> Қосқарын

<variant> Иек-тіл

<variant> Екі басты

<question> Науқасқа жақ сүйек асты сілекей безінің ісігіне операция жақ сүйек асты үшбұрышы арқылы белгіленді. Оның шекараларын қандай құрылымдар құрайды?

<variant> Екіқарын, иек-тіл бұлшықеттері

<variant> Екіқарын бұлшықеті, төменгі жақ сүйегінің денесінің төменгі жиегі

<variant> Сүйек-тіл асты, сүйек-тіл бұлшықеті, екіқарын бұлшықеті

<variant> Қалқанша-тіл асты, екіқарын бұлшықеттері

<variant> Төменгі жақ сүйегінің денесінің төменгі жиегі, екіқарын бұлшықеттері

<question> Тіл асты аймағында хирургиялық араласуды жоспарлау үшін дәрігер осы аймақты құрайтын анатомиялық үшбұрыштарды ескеруі керек. Тіл асты аймағын қандай үшбұрыштар

ONTÜSTIK-QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Кафедра «Топографиялық анатомия және гистология» Бақылау өлшеу құралдары		56 беттің 1 беті

кұрайды?

<variant> Жақ сүйек асты, иекасты үшбұрыштары

<variant> Ұйқы және латеральді үшбұрыш

<variant> Иекасты және ұйқы үшбұрыштары

<variant> Латеральді және жақ сүйек асты

<variant> Медиальді және латеральді

<question> Жақ сүйек асты сілекей безін алып тастау кезінде хирург оның төсегінен өтетін артерияны анықтауы керек. Қай артерия бұл аймаққа қан жеткізеді?

<variant> Жақ сүйек асты артериясы

<variant> Бет артериясы

<variant> Сыртқы ұйқы артериясы

<variant> Ішкі ұйқы артериясы

<variant> Жоғарғы қалқанша артериясы

<question> Мойын флегмонасы бар наукаста артқы көкірек аймағында медиастинит белгілері пайда болды. Ірін бастапқыда мойынның қай майлы кеңістігінде орналасқан болуы мүмкін?

<variant> Ретровисцералды

<variant> Төстің үстіндегі аралық

<variant> Превисцеральды

<variant> Параангиалды

<variant> Паравертебралды

<question> Самай аймағындағы іріңді қабынуды емдеу кезінде хирург үрдістің таралу мүмкіндігін ескереді. Самай аймағының апоневроз асты кеңістігі қай майлы кеңістікке жалғасуы мүмкін?

<variant> Шайнау-жақ

<variant> Жақ-қанатша

<variant> Қанатшалар аралық

<variant> Жұтқыншақ маңы

<variant> Жұтқыншақ артындағы

<question> Шықшыт безінің іріңді абсцесін ашқаннан кейін наукаста бет асимметриясы мен мимикалық бұлшықеттердің әлсіздігі байқалды. Бұл клиникалық көріністер қай жүйкенің зақымдануымен түсіндіріледі?

<variant> Бет жүйкесі

<variant> Төменгі жақ жүйкесі

<variant> Жоғарғы жақ жүйкесі

<variant> Тіл-жұтқыншақ жүйкесі

<variant> Үштармақты жүйке

<question> Қанатшалар аралығындағы флегмонаны ашқан кезде күшті артериялық қан кету дамыды. Бұл жағдайда қандай артерияның зақымдалуы қан кетуді түсіндіреді?

<variant> Жоғарғы жақ артериясы

<variant> Тіл артериясы

<variant> Сыртқы ұйқы артериясының сабағы

<variant> Ішкі ұйқы артериясы

<variant> Жалпы ұйқы артериясы

<question> Іріңді паротит кезінде қабыну процесі шықшыт безінің жұтқыншақ өсіндісі арқылы таралды. Бұл жағдайда іріңнің қай кеңістікке өтуі мүмкін екенін анықтаңыз?

<variant> Жұтқыншақ маңы кеңістігінің алдыңғы бөлігі

<variant> Шықшыт-шайнау кеңістігі

<variant> Қанатшалар аралығы

<variant> Жұтқыншақ маңы кеңістігінің артқы бөлігі

<variant> Жұтқыншақ маңы кеңістігінің медиалды бөлігі

<question> Қанатша венозды өрімінен веноздық қан кету байқалған жағдайда, оның орналасу аймағын анықтаңыз. Бұл өрім қай майлы кеңістікте орналасады?

ONTÜSTIK-QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Кафедра «Топографиялық анатомия және гистология» Бақылау өлшеу құралдары		56 беттің 1 беті

<variant> Жақ-қанатша кеңістігі

<variant> Қанатшалар аралығы кеңістігі

<variant> Шайнау-жақ кеңістігі

<variant> Жұтқыншақ маңы кеңістігі

<variant> Шықшыт-шайнау кеңістігі

<question> Беттегі терең кеңістіктерді хирургиялық тексеру кезінде хирург бүйір аймақ пен терең аймақтың арасындағы шекараны анықтады. Осы шекара қызметін қай анатомиялық құрылым атқарады?

<variant> Шайнау бұлшықеті

<variant> Латералды қанатша бұлшықеті

<variant> Төменгі жақ

<variant> Шықшыт сілекей безі

<variant> Жоғарғы жақ кеңістігі

<question> Бет аймағындағы артериялық қан кетуді тоқтату үшін бет артериясын байлау қажет болды. Хирург артерияның аттас венадан айырмашылығын түсіндірді. Бет артериясы венадан немен ерекшеленеді?

<variant> Қиғаш жүріс

<variant> Ирелендеген жүрісі

<variant> Тік жүріс

<variant> Тармақтарының аздығы

<variant> Айырмашылығы жоқ, тек қанның түсімен ажыратылады

<question> Іріңді гайморитпен ауыратын науқаста басішілік асқынулар белгілері байқалды. Бет аймағынан инфекция веноздық жолмен ми қуысына ең жиі қай құрылым арқылы таралатынын дұрыс түсіндіріңіз:

<variant> кавернозды синус

<variant> сигма тәрізді синус

<variant> жоғарғы тас тәрізді синус

<variant> төменгі тас тәрізді синус

<variant> артқы тас тәрізді синус

<question> Бет терең аймағында операция жүргізу кезінде хирург алдымен веноздық құрылымды кездестірді. Оның беткі орналасуын ескергенде, бұл қандай құрылым болуы мүмкін?

<variant> Қанаттәрізді веноздық өрім

<variant> Жоғарғы жақ артериясы

<variant> Төменгі жақ нервi

<variant> Қанаттәрізді веноздық өрім және төменгі жақ нервi

<variant> Төменгі жақ артериясы

<question> Бет терең аймағының анатомиялық орналасуын дұрыс түсіну үшін: ол қандай құрылымдар арасындағы кеңістік болып табылады?

<variant> Төменгі жақ денесінің ішкі беті мен жоғарғы жақ денесінің алдыңғы беті арасында

<variant> Төменгі жақ тармағының ішкі беті мен жоғарғы жақ төмпешігі арасында

<variant> Төменгі жақ денесінің ішкі беттері арасында

<variant> Төменгі жақ тармағының ішкі беті мен жоғарғы жақ денесінің көзұя беті арасында

<variant> Төменгі жақ тармағының ішкі беті мен жоғарғы жақ денесінің алдыңғы беті арасында

<question> Бет венасының тромбофлебитінде инфекция қанаттәрізді веноздық өрімге таралуы мүмкін. Осы өрімнің орналасқан анатомиялық аймағын көрсетіңіз.

<variant> Қанаттәрізді аймақ

<variant> Терең аймақ

<variant> Ұрт аймағы

<variant> Самай аймағы

<variant> Құлақмаңы-шайнау аймағы

ONTÜSTIK-QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Кафедра «Топографиялық анатомия және гистология» Бақылау өлшеу құралдары		56 беттің 1 беті

<question> Баланың Биша май денесі ұлғайған. оның анатомиялық орналасуы қай бет аймағында екенін анықтаңыз.

<variant> ұртта

<variant> самайда

<variant> құлақмаңы-шайнау

<variant> жақ артында

<variant> жақ алдында түсіну деңгейі бойынша сұрақты дұрыстап ауыстырып қой

<question> Құлақмаңы сілекей безінің қабынуында оның шығару өзегінің проекциясында ісіну байқалады. Бұл өзектің қай бұлшықеттің үстінен өтетінін дұрыс түсіндіріңіз:

<variant> шайнау бұлшықеті

<variant> сыртқы қанаттәрізді бұлшықет

<variant> ұрт бұлшықеті

<variant> ішкі қанаттәрізді бұлшықет

<variant> қанаттәрізді бұлшықет

<question> Құлақмаңы безінде жасалған операциядан кейін науқаста мимикалық бұлшықеттердің парезі байқалды. Бұл салдарды түсіндіретін, бездің ішінде өтетін қандай жүйке зақымдалуы мүмкін?

<variant> Бет жүйкесі

<variant> Үштармақ жүйкесі

<variant> Құлақсамай жүйкесі

<variant> Құлақ арты жүйкесі

<variant> Жоғарғы жақ жүйкесі

<question> Науқаста ауыз қуысының түбі әлсіреп, шайнау процесі бұзылған. Бұл жағдай ауыз түбінің диафрагмасын түзетін қай бұлшықеттің зақымдалуымен түсіндіріледі?

<variant> Жақасты-белбеу бұлшықеті

<variant> Екі қарынды бұлшықет

<variant> Шилотіл бұлшықеті

<variant> Шилотіл асты бұлшықеті

<variant> Тіл бұлшықеті

<question> Науқасқа көзасты тесігі аймағында өткізгіштік анестезия жасау үшін жансыздандыру қажет болатын жүйкені көрсетіңіз.

<variant> Үштармақ жүйкесінің екінші тармағы

<variant> Үштармақ жүйкесінің үшінші тармағы

<variant> Үштармақ жүйкесінің бірінші тармағы

<variant> Бет жүйкесі

<variant> Құлақмаңы жүйкесі

<question> Жұтқыншақ маңы кеңістігінің артқы бөлігінің флегмонасы кезінде массивті қан кету пайда болса, бұл қай тамырдың зақымдалуымен түсіндіріледі?

<variant> ішкі ұйқы артериясы

<variant> сыртқы ұйқы артериясы

<variant> бет артериясы

<variant> тіл артериясы

<variant> үштармақ нервi

<question> Мұрын-ерін үшбұрышынан инфекция тараған кезде кавернозды синус тромбозы дамуы мүмкін. Инфекцияның таралу жолын қамтамасыз ететін веноздық құрылымдарды атаңыз.

<variant> Бет және бұрыштық веналар

<variant> Бет және сыртқы мойын веналары

<variant> Бет және ішкі мойын веналары

<variant> Бет және беткі самай веналары

<variant> Бет және жоғарғы жақ веналары

ONTÜSTIK-QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Кафедра «Топографиялық анатомия және гистология» Бақылау өлшеу құралдары		56 беттің 1 беті

<question> Құлақмаңы сілекей безінің шығару өзегінің қабынуы кезінде оның ашылатын орнын анықтау қажет. Әдетте бұл өзек қай жерде ашылады?

<variant> Ауыз қуысының өзінде

<variant> Ауыздың кіреберісінде

<variant> Таңдай доғаларының алдында

<variant> Таңдай доғаларының арасында

<variant> Тіл астында

<question> Самай аймағының анатомиялық қабаттарының орналасу тәртібі мен майлы кеңістіктердің ретін дұрыс түсіндіріңіз: қайсысы дұрыс?

<variant> териасты, апоневрозаралық, апоневрозасты, бұлшықетасты

<variant> териасты, апоневрозасты, апоневрозаралық, бұлшықетасты

<variant> териасты, апоневрозасты, бұлшықетасты

<variant> териасты, апоневрозасты, бұлшықетасты, сүйекасты

<variant> териасты, бұлшықетасты, сүйекасты

<question> Құлақмаңы сілекей безінің шығару өзегін табу үшін оның проекциялық сызығын білу қажет. Әдетте бұл сызық қалай өтеді?

<variant> Құлақ шеміршегінің негізінен ауыз бұрышына дейін

<variant> Көз ұясының төменгі жиегіне параллель, 5 мм төмен

<variant> Құлақ шеміршегінің негізінен мұрын қанатына дейін

<variant> Жақ бұрышынан ауыз бұрышына дейін

<variant> Құлақ шеміршегінің негізінен көз ұясының төменгі жиегіне дейін, 5 мм төмен

<question> Foramen spinosum арқылы өтетін тамыр зақымдалған жағдайда эпидуральды гематома дамуы мүмкін. Бұл тамыр қай артерияның тармағы болып саналады?

<variant> Жоғарғы жақ артериясы

<variant> Ішкі ұйқы артериясы

<variant> Бет артериясы

<variant> Омыртқа артериясы

<variant> Бұрыштық артерия

<question> Төменгі жақ нервiнiң невралгиясында терi сезiмталдығын тексеру үшiн оның талшықтарының шығу нүктесін білу қажет. Бұл нүкте қай жерде проекцияланады?

<variant> Иек тесігі

<variant> Күрек каналы

<variant> Мыжылма өсіндісі

<variant> Қасүсті кесінді

<variant> Көзасты кесінді

<question> Жарақаттан кейін науқаста үстіңгі еріннің ұйып қалуы байқалды. Бұл жағдай қай нервтің зақымдануына және оның оның қай анатомиялық шығу нүктесінің зақымдалуымен түсіндіріледі??

<variant> Көзасты тесігі

<variant> Күрек каналы

<variant> Қасүсті кесінді

<variant> Иек тесігі

<variant> Құлақмаңы тесігі

<question> Науқаста маңдай мен жоғарғы қабақтағы сезімталдықтың бұзылуын дәрігер қандай нервпен байланыстырады. Бұл тармақтың сезімтал талшықтардың әдетте анатомиялық шығу орны қасүсті кесінді.

<variant> үшкіл нервтің бірінші тармағымен

<variant> бет нерві

<variant> кезбе нерв

<variant> тіл-жұтқыншақ

<variant> қосарланған

ONTÜSTIK-QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Кафедра «Топографиялық анатомия және гистология» Бақылау өлшеу құралдары		56 беттің 1 беті

<question> Самай аймағындағы флегмонаға операциядан кейін науқаста бет асимметриясы мен мимикалық бұлшықеттердің әлсіздігі байқалды. Бұл қандай жүйкенің зақымданғанын көрсетеді?

<variant>бет жүйкесі

<variant>бет көк тамыры

<variant>бет артериясы

<variant>үшкіл нервтің екінші тармағы

<variant>үшкіл нервтің бірінші тармағы

<question> Құлақмаңы-жақтық аймақтың флегмонасын ашу кезінде хирург бет жүйкесінің тармақтарына зақым келтірмеу үшін қандай хирургиялық қол жеткізу жолын тандайды?

<variant>ерін-щек қатпары арқылы

<variant>бет жүйкесінің тармақтарының бойымен

<variant>иек аймағы арқылы

<variant> төменгі жақ жиегі бойымен төменгі жақ асты аймағында

<variant> иек жиегі бойымен төменгі жақ асты аймағында

<question> Құлақмаңы-жақтық аймақтың флегмонасына операциядан кейін науқаста ауыз бұрышының төмен түсіп асимметрия пайда болды, мимикалық қимылдар бұзылды. Бұл қандай жүйкенің зақымдануымен түсіндіріледі?

<variant>бет жүйкесі

<variant>жоғарғы жақ артериясы

<variant>иек жүйкесі

<variant>төменгі альвеолярлы артерия

<variant>құлақмаңы артериясы

<question> Науқаста жұтқыншақ маңындағы алдыңғы кеңістікте ірінді қабыну анықталды. Бұл кеңістіктің артқы шекарасын қандай анатомиялық құрылым құрайды?

<variant>латеральді қанат тәрізді бұлшықет

<variant>шилодиафрагма

<variant>жұтқыншақтың бүйір қабырғасы

<variant>жақ асты сілекей безі

<variant>медиальді қанат тәрізді бұлшықет

<question> Компьютерлік томография нәтижесінде жұтқыншақ маңындағы артқы кеңістікте ірінді жиналу табылды. Бұл кеңістіктің алдыңғы шекарасын қандай анатомиялық құрылым құрайды?

<variant>медиал қанат тәрізді бұлшықет

<variant>Шилодиафрагма

<variant>жұтқыншақтың бүйір қабырғасы

<variant>жұтқыншақ-омыртқа шандыр тармағы

<variant>латерал қанат тәрізді бұлшықет

<question> Хирург жұтқыншақ маңындағы кеңістікте инфекцияның таралу жолдарын зерттеуде. Бұл кеңістіктің ішкі шекарасын қандай анатомиялық құрылым құрайды?

<variant>жұтқыншақтың бүйір қабырғасы, жұтқыншақ маңы шандырмен қапталған

<variant>қанат тәрізді шандыр

<variant>жақ асты сілекей безі

<variant>медиал қанат тәрізді бұлшықет

<variant>иек сілекей безі

<question> Науқаста алдыңғы жұтқыншақ маңы кеңістігінде флегмона табылды. Бұл кеңістіктің сыртқы шекарасын қандай анатомиялық құрылым құрайды?

<variant>жақ асты сілекей безі

<variant>медиальді қанат тәрізді бұлшықет

<variant>жұтқыншақтың бүйір қабырғасы

<variant>жұтқыншақ маңы шандыр

<variant>иек сілекей безі

ONTÜSTIK-QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Кафедра «Топографиялық анатомия және гистология» Бақылау өлшеу құралдары		56 беттің 1 беті

<question> Қанат-жақтық кеңістікке инфекция таралған науқаста бет аймағында ауырсыну байқалды. Бұл кеңістіктің ішкі шекарасын қандай анатомиялық құрылым құрайды?

<variant>медиальді қанат тәрізді бұлшықеттің сыртқы беті

<variant>самай-төменгі жақ буыны

<variant>құлақмаңы-жақтық шандыр

<variant>төменгі жақ тармағының ішкі беті

<variant>иек сілекей безі

<question> Қанат-жақтық кеңістіктегі іріңдікті ашу кезінде хирург сыртқы шекараны анықтау үшін қандай анатомиялық құрылымды бағдар ретінде қолданады?

<variant> қанат-жақтық шандыр

<variant> медиальді қанат тәрізді бұлшықеттің сыртқы беті

<variant> төменгі жақ тармағының ішкі беті

<variant> самай-төменгі жақтық буын

<variant> иек сілекей безі

<question> Беттегі флегмона ұрт аймағынан құлақмаңы-жақтық аймаққа таралды. Бұл аймақтың алдыңғы шекарасын қандай анатомиялық құрылым құрайды?

<variant>шайнау бұлшықетінің алдыңғы жиегі

<variant>самай доғасының төменгі жиегі

<variant>төменгі жақ денесінің төменгі жиегі

<variant>төменгі жақ тармағының артқы жиегі

<variant>жоғарғы жақ тармағының артқы жиегі

<question> Құлақмаңы-жақтық аймақтағы іріңдікті ашу кезінде хирург төменгі шекараны бағдар ретінде қолданады. Бұл аймақтың төменгі шекарасын қандай анатомиялық құрылым құрайды?

<variant>төменгі жақ денесінің төменгі жиегі

<variant>шайнау бұлшықетінің алдыңғы жиегі

<variant>самай доғасының төменгі жиегі

<variant>төменгі жақ тармағының артқы жиегі

<variant>самай доғасының жоғарғы жиегі

<question> Төменгі жақ асты сілекей безі алынғаннан кейін науқаста тілдің алдыңғы үштен бір бөлігінің сезімталдығы жоғалды. Бұл қандай жүйкенің зақымдануын көрсетеді?

<variant>n. Lingualis

<variant>n. glossopharyngeus

<variant>n. vagus

<variant>n. hypoglossus

<variant>n. facialis

<question> Қалқанша безді алып тастау операциясынан кейін науқаста дауыс қарлығуы байқалды. Бұл жағдай көмейдің бұлшықеттерін иннервациялайтын қай жүйкенің зақымдануымен түсіндіріледі?

<variant>n. laryngeus recurrens

<variant>n. vagus

<variant>n. laryngeus superior

<variant>n. hypoglossus

<variant>n. accessorius

<question> Төменгі жақ асты аймағында іріңдікті ашу операциясынан кейін науқаста сілекей бөлінуінің бұзылуы және тіл асты аймағында ісіну байқалды. Бұл операция кезінде қандай анатомиялық құрылым зақымдалған болуы мүмкін?

<variant>ductus submandibularis

<variant>ductus parotideus

<variant>glandula sublingualis

<variant>ramus marginalis mandibulae n. facialis

<variant>a. temporalis superficialis

ONTÜSTIK-QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Кафедра «Топографиялық анатомия және гистология» Бақылау өлшеу құралдары		56 беттің 1 беті

<question> Науқастың trigonum caroticum аймағын зерттеу кезінде хирург бұл аймақтағы клиникалық маңызды анатомиялық құрылымды анықтағысы келеді. Осы аймаққа тән ең маңызды құрылым қайсысы болып табылады, егер операция кезінде зақымданса, қан тамырлары мен жүйке өткізгіштікке әсер етуі мүмкін?

<variant>bifurcatio a. carotis communis

<variant>glandula thyroidea

<variant>ductus parotideus

<variant>plexus brachialis

<variant>sinus cavernosus

<question> Ішкі мойын венасын катетерлеу кезінде иненің дұрыс бағытталмауы нәтижесінде көршілес құрылымдарға зақым келуі мүмкін. Егер ине артқа және медиальді бағытталса, науқаста тілдің қозғалысы мен дауыстың өзгеруі, жүрек жиырылуының баяулауы сияқты белгілер пайда болуы ықтимал. Бұл қандай жүйкенің зақымдалуымен байланысты?

<variant>n. vagus

<variant> n. hypoglossus

<variant> truncus sympathicus

<variant>n. laryngeus recurrens

<variant>a. carotis externa

<question> Науқаста құлақманы безіне ота жасалуы кезінде, хирург негізгі қанмен қамтамасыз етуші артерияны білуі қажет. Құлақманы безінің қанмен қамтамасыз етілуі негізінен қай артерия арқылы жүзеге асады?

<variant>a. auricularis posterior

<variant>a. facialis

<variant>a. maxillaris

<variant>a. occipitalis

<variant>a. transversa faciei

<question> Науқаста ауыз қуысының түбінде ірінді процесс дамыды. Хирург инфекцияның көкірек қуысына таралу ықтималдығын бағалауы керек. Ауыз қуысы түбінен инфекция көкірек қуысына қандай кеңістік арқылы таралуы мүмкін?

<variant>spatium retropharyngeum

<variant>spatium pretracheale

<variant>spatium parapharyngeum

<variant>spatium buccale

<variant>spatium masticatorum

<question> Мойын аймағында жарақаттық немесе хирургиялық п. accessorius жүйкесі зақымданғанда, науқаста қандай клиникалық белгі байқалады?

<variant>иықты көтеру кезінде әлсіздік

<variant>жұтынудың бұзылуы

<variant>бет асимметриясы

<variant>дауыс қарлығы

<variant>дәм сезудің жоғалуы

<question> Науқаста артқы мойын және бас терісінде сезімталдық бұзылған. п. occipitalis major жүйкесінің шығу орнын білу арқылы оның иннервация аймағын түсінуге болады. Бұл жүйке қай жерде шығады?

<variant>m. semispinalis capitis және m. obliquus capitis inferior бұлшықеттерінің арасында

<variant>foramen stylomastoideum

<variant>foramen ovale

<variant>incisura supraorbitalis

<variant>foramen jugulare

ОҢТҮСТІК-ҚАЗАҚСТАН MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Кафедра «Топографиялық анатомия және гистология» Бақылау өлшеу құралдары		56 беттің 1 беті

<question> Жұтқыншақ маңында іріңді процесс дамыса,хирург инфекцияның таралу жолын бағалау үшін spatium parapharyngeum кеңістігінің шекарасын білуі қажет. Бұл кеңістіктің шекарасын қандай фасция құрайды?

<variant>fascia buccopharyngea

<variant>fascia masseterica

<variant>fascia prevertebralis

<variant>fascia pterygoidea

<variant>fascia temporalis

<question> Науқтаста мойын аймағына жарақаттан кейін немесе хирургиялық отадан кейін басын солға бұру қиындады. Бұл симптом мойын бұлшықеттерін иннервациялайтын қай жүйкенің зақымдануынан пайда болуы мүмкін?

<variant>n. accessorius dexter

<variant>n. vagus sinister

<variant>n. hypoglossus sinister

<variant>n. phrenicus dexter

<variant>n. glossopharyngeus sinister

<question> Науқтаста жұтқыншақ артындағы кеңістікте іріңді процесс дамыды. Хирург инфекцияның көкірек қуысына таралу ықтималдығын бағалауы керек. spatium retropharyngeum аймағындағы инфекция қай аймаққа таралуы мүмкін?

<variant>артқы көкірек аралығы

<variant>алдыңғы бас сүйек шұңқыры

<variant>көз шарасы

<variant>сыртқы есту жолы

<variant>тіласты аймағы

<question> Құлақмаңы безінде операция кезінде қай құрылымды сақтау маңызды, себебі оның зақымдануы науқтаста мимикалық қимылдардың бұзылуына әкелуі мүмкін?

<variant>n. facialis

<variant>n. hypoglossus

<variant>n. vagus

<variant>n. auriculotemporalis

<variant>n. mandibularis

<question> Науқтастың бет және құлақ аймағына ота немесе клиникалық тексеру жүргізу кезінде хирург құлақ қалқанының алдында артерияның пульсациясын сезгісі келеді. Қай артерияның пульсациясы әдетте бұл аймақта анықталады?

<variant>a. temporalis superficialis

<variant>a. facialis

<variant>a. maxillaris

<variant>a. auricularis posterior

<variant>a. occipitalis

<question> Науқтаста жоғарғы жақ қойнауынан іріңді процесс дамыды. Хирург немесе офтальмолог инфекцияның көз шарасына таралу жолын бағалауы керек. Жоғарғы жақ қойнауынан шыққан іріңді процесс көз шарасына қалай таралуы мүмкін?

<variant>lamina papyracea арқылы

<variant>canalis infraorbitalis арқылы

<variant>foramen rotundum арқылы

<variant>fissura orbitalis superior арқылы

<variant>fossa pterygopalatine арқылы

<question> Науқтаста мойын аймағында ота немесе жарақаттан кейін белгілі бір бұлшықеттердің әлсіздігі байқалды. Қай бұлшықет мойын өрімінің тармақтары арқылы жүйкеленеді және оның зақымдануы мойын қозғалысына әсер етуі мүмкін?

<variant>m. sternocleidomastoideus

ONTÜSTIK-QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Кафедра «Топографиялық анатомия және гистология» Бақылау өлшеу құралдары		56 беттің 1 беті

<variant>m. masseter

<variant>m. temporalis

<variant>m. digastricus, venter posterior

<variant>m. mylohyoideus

<question> Науқта инфекциялық процесс дамыды. Егер инфекция веноздық жолмен кавернозды синусқа жетсе, бастапқы ошақ жиі қай жерде орналасады?

<variant>жоғарғы ерін мен мұрын аймағында

<variant>ортаңғы құлақта

<variant>жақа асты аймағында

<variant>желкеде

<variant>тіл асты аймағында

<question> Науқта төменгі жақ асты аймағында ісіну немесе жарақат байқалды. дәрігер Trigonum submandibulare аймағындағы негізгі анатомиялық құрылымды білуі қажет. Бұл аймақта қандай құрылым орналасқан?

<variant>gl. submandibularis

<variant>gl. parotis

<variant>a. occipitalis

<variant>v. retromandibularis

<variant>sinus sigmoideus

<question> Науқта төменгі жақ сүйегінің бұрышында терінің сезімталдығы бұзылды. Бұл аймақтың сезімтал иннервациясын қамтамасыз ететін жүйке қайсысы?

<variant>n. auricularis magnus

<variant>n. mentalis

<variant>n. buccalis

<variant>n. auriculotemporalis

<variant>n. occipitalis minor

<question> Науқта шықшыт безінде ота жасалуда немесе ірінді процесс анықталды. Хирург ductus parotideus жанынан өтетін құрылымдарды білуі керек. Ductus parotideus жанынан топографиялық жағынан қай бұлшықет өтеді?

<variant>m. masseter

<variant>m. buccinator

<variant>m. temporalis

<variant>m. Pterygoideus

<variant>m. mylohyoideus

<question> Науқасқа төменгі жақтағы ақыл тісі алынғаннан кейін төменгі еріннің сезімталдығы бұзылды. Бұл симптом қай жүйкенің зақымдануынан туындауы мүмкін?

<variant>n. alveolaris inferior

<variant>n. mentalis

<variant>n. buccalis

<variant>n. Linguali

<variant>n. auricularis magnus

<question> Науқта беттегі бұрыштық венаның тромбофлебиті анықталды. Бұл асқину ең жиі қандай қауіпті жағдайға әкелуі мүмкін және беттегі веноздық жүйенің клиникалық маңызы неде?

<variant>кавернозды синустың тромбозы, миға тікелей байланысы бар және инфекцияның тез таралуына жол ашады

<variant>бет жүйкесінің салдануы, миға тікелей байланысы бар және инфекцияның тез таралуына жол ашады

<variant>сыртқы ұйқы артериясының стенозы, клиникалық маңызды емес

<variant>шайнау бұлшықеттерінің атрофиясы, клиникалық маңызды емес

<variant>мойын лимфа түйіндерінің ісінуі ,қосымша немесе жанама симптом

ONTÜSTIK-QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Кафедра «Топографиялық анатомия және гистология» Бақылау өлшеу құралдары		56 беттің 1 беті

<question> Науқаста төменгі жақ сүйегінің foramen mandibulae аймағында зақымдануы байқалды.

Бұл жағдайда қай жүйке зақымдануы мүмкін және төменгі ерін мен тіс аймағында сезімталдық бұзылуы мүмкін

<variant>n. alveolaris inferior

<variant>n. mentalis

<variant>n. lingualis

<variant>n. buccalis

<variant>n. glossopharyngeus

<question> Науқасқа жедел тыныс алу қол жеткізу үшін трахеостомия жасау қажет. Қан кету немесе нервтік бұзылулардан сақтану үшін хирург қандай анатомиялық құрылымды ескеруі қажет?

<variant> a. carotis communis

<variant> n. recurrens laryngeus

<variant> v. jugularis interna

<variant> gl. parathyroidea inferior

<variant> n. Vagus

<question> Жақасты безін алып тастағаннан кейін науқаста тілдің бір жағы салданған және сөйлеу қиындықтары пайда болған. Қай жүйкенің зақымдануы осы симптомды түсіндіреді?

<variant> n. hypoglossus

<variant> n. lingualis

<variant> n. glossopharyngeus

<variant> chorda tympani

<variant> n. Facialis

<question> Тіл ісірі диагнозы қойылған науқаста метастаздың таралу жолдарын ескере отырып, лимфа түйіндерінің қандай аймақтарын тексеру қажет?

<variant> nodi cervicales profundi

<variant> nodi axillares

<variant> nodi mediastinales posteriores

<variant> nodi paraaortales

<variant> nodi paratracheales

<question> Науқас самай аймағынан жарақат алғаннан кейін бір жақты естудің төмендеуіне шағымданады. Қандай анатомиялық зақым бұл симптомды тудырады?

<variant> самай сүйегінің пирамидасының сынуы

<variant> шайнау бұлшықетінің зақымдануы

<variant> arcus zygomaticus аймағындағы гематома

<variant> бет жүйкесінің зақымдануы

<variant> самай бұлшықетінің жыртылуы

<question> Операциядан кейін науқаста тілдің қозғалысының бұзылуы немесе инсульт даму қаупі бар. Қандай асқынулар мүмкін?

<question> n. hypoglossus зақымдануы

<variant> a. maxillaris зақымдануы

<variant> шайнау бұлшықеттерінің салдануы

<variant> ми сабағының инфаркті

<variant> көру жүйкесінің ісінуі

<question> Хирург қалқанша безіне операция жасау кезінде қандай анатомиялық құрылымды дұрыс тануы керек?

<variant> n. laryngeus recurrens топографиясы

<variant> ішкі мойын венасының орналасуы

<variant> сыртқы ұйқы артериясының бағыты

<variant> бет артериясының шығу орны

<variant> көмей шеміршегінің орналасуы

ONTÜSTIK-QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Кафедра «Топографиялық анатомия және гистология» Бақылау өлшеу құралдары		56 беттің 1 беті

<question> Құлақмаңы безінің ісігін алып тастағаннан кейін науқас күлген кезде бетінің бір жағы төменгі қозғалмайды. Қай жүйке зақымдалған?

- <variant> n. facialis
- <variant> n. trigeminus
- <variant> n. auriculotemporalis
- <variant> n. glossopharyngeus
- <variant> n. hypoglossus

<question> Науқаста **n. facialis** бассүйектен шығатын жеріндегі зақымдану кезінде келесі белгілердің бірі байқалады: бет мимикасының бұзылуы, көздің толық жабылмауы немесе күлген кезде бет асимметриясы.

- <variant> мимикалық бұлшықеттердің салдануы
- <variant> тілдің алдыңғы 2/3 бөлігінің дәм сезуінің жоғалуы
- <variant> мойын терісінің сезімталдығының жоғалуы
- <variant> шайнау функциясының бұзылуы
- <variant> көз алмасының қозғалысының жоғалуы

<question> Қалқанша безі немесе мойын аймағына операция жасалған кезде қандай нервтің зақымдану қаупі бар?

- <variant> n. laryngeus recurrens
- <variant> n. trigeminus
- <variant> n. vagus
- <variant> n. glossopharyngeus
- <variant> n. facialis

<question> Науқаста жоғарғы ерін мен тістердің сезімталдығы жоғалған. Бұл қай нервтің зақымдануын көрсетеді?

- <variant> n. infraorbitalis
- <variant> n. alveolaris superior
- <variant> n. mentalis
- <variant> n. buccalis
- <variant> n. mandibularis

<question> Науқаста операциядан кейінгі кезеңде бір жақты жоғарғы қабақ ісінуі мен маңдайдағы сезімталдықтың төмендеуі байқалады. Қай нерв зақымдалған болуы мүмкін?

- <variant> n. frontalis
- <variant> n. auriculotemporalis
- <variant> n. buccalis
- <variant> n. nasociliaris
- <variant> n. mentalis

<question> Науқасқа мойын венасына катетер енгізу кезінде нервтік зақымдану салдары науқаста тахикардия, артериялық қысымның төмендеуімен көрінді. Осы жағдайда қандай нервтің зақымдануы себебінен болуы мүмкін?

- <variant> n. vagus
- <variant> n. glossopharyngeus
- <variant> n. laryngeus superior
- <variant> n. trigeminus
- <variant> n. phrenicus

<question> Мойынның артқы бөлімінің зақымдануы және бастың еңкейгенде ауырсыну қай нерв зақымдануынан болуы мүмкін?

- <variant> n. occipitalis major
- <variant> n. auricularis magnus
- <variant> n. accessorius
- <variant> n. hypoglossus
- <variant> n. vagus

ОҢТҮСТІК-ҚАЗАҚСТАН MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Кафедра «Топографиялық анатомия және гистология» Бақылау өлшеу құралдары		56 беттің 1 беті

<question> Астыңғы жақ сүйегін хирургиялық шығару кезінде қай тесік арқылы өтетін нерв зақымдалуы мүмкін?

- <variant> foramen mentale
- <variant> foramen mandibulae
- <variant> fissura orbitalis inferior
- <variant> foramen spinosum
- <variant> foramen rotundum

<question> Ота барысында тыныс алу және дауыспен байланысты қандай нервтің зақымдануы мүмкін?

- <variant> n. laryngeus recurrens
- <variant> n. phrenicus
- <variant> n. hypoglossus
- <variant> n. accessorius
- <variant> n. glossopharyngeus

<question> Науқта мұрын-жұтқыншақ аймағындағы операциядан кейін жұтыну қиындады, дауыс өзгерді. Қай нервтің зақымдануы осы белгілерді түсіндіреді?

- <variant> n. vagus
- <variant> n. glossopharyngeus
- <variant> n. hypoglossus
- <variant> n. trigeminus
- <variant> n. Facialis

<question> Науқта v. jugularis interna тромбозы анықталды. Бұл асқину ең алдымен қандай клиникалық белгіге әкелуі мүмкін?

- <variant> мойын жұмсақ тіндерінің ісінуі
- <variant> миға қан құйылуы
- <variant> көрудің бұзылуы
- <variant> естудің бұзылуы
- <variant> көз қозғалтқыш бұлшықеттерінің салдануы

<question> Науқта мойын жарақатынан кейін дауыс қарлығыуы пайда болып, дауыс желбезектері қозғалысы бұзылды. Қай нерв зақымданған болуы мүмкін?

- <variant> n. laryngeus recurrens
- <variant> n. vagus
- <variant> n. glossopharyngeus
- <variant> n. accessorius
- <variant> n. hypoglossus

<question> Науқа құлақ аймағында ауырсыну сезінеді, ол мойын мен шүйдеге таралады. Бұл қай нервтің зақымдануынан болуы мүмкін?

- <variant> n. auriculotemporalis
- <variant> n. glossopharyngeus
- <variant> n. vagus
- <variant> n. trigeminus
- <variant> n. facialis

<question> Науқта шайнау бұлшықеттерінің әлсіздігі байқалады. Қай нервтің зақымдануы осыны түсіндіреді?

- <variant> n. mandibularis
- <variant> n. glossopharyngeus
- <variant> n. trigeminus
- <variant> n. facialis
- <variant> n. occipitalis major

<question> Науқта мойын аймағында отадан кейін тыныс алу қиындауы, дауыс қарлығыуы байқалады, жұтқыншақ бұлшықеттерінің кейбіреулері салданған. Қай нерв зақымданған?

ONTÜSTIK-QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Кафедра «Топографиялық анатомия және гистология» Бақылау өлшеу құралдары		56 беттің 1 беті

<variant> n. vagus

<variant> n. glossopharyngeus

<variant> n. laryngeus superior

<variant> n. accessorius

<variant> n. phrenicus

<question> Науқтасты мойын жаракатынан кейін тілдің бір жағы қозғала алмайды немесе қисайып қалады. Мүмкін зақымдалған нерв:

<variant> n. hypoglossus

<variant> n. vagus

<variant> n. glossopharyngeus

<variant> n. accessorius

<variant> n. mandibularis

<question> Мойын аймағында ота жасалғанда хирург әртүрлі жүйкелерді зақымдауы мүмкін. Қандай жүйкелердің зақымдануы ең жиі кездеседі?

<variant> n. laryngeus recurrens

<variant> n. hypoglossus

<variant> n. buccalis

<variant> n. facialis

<variant> n. Trigeminus

<question> Науқасқа мойын аймағына ота жасалды, n. laryngeus recurrens зақымдалды, болатын клиникалық белгілер?

<variant> дауыс шығару және жұтқыншақ

<variant> тілдің қозғалысы

<variant> бет бұлшықетінің қозғалысы

<variant> шайнау

<variant> мойын терісінің сезімталдығы

<question> Науқтасты мойын жаракатынан ауызды ашу қиын, шайнау бұлшықеттері әлсіз. Қай нервтің зақымдануы бұл симптомды түсіндіреді?

<variant> n. mandibularis

<variant> n. hypoglossus

<variant> n. trigeminus

<variant> n. accessorius

<variant> n. glossopharyngeus

<question> Науқтасты мойын жаракатынан кейін бет асимметриясы, көзді жабуда қиындық бар, бірақ бет терісінің сезімталдығы сақталған. Қай нерв зақымданған?

<variant> n. facialis

<variant> n. trigeminus

<variant> n. glossopharyngeus

<variant> n. accessorius

<variant> n. vagus

<question> Мойын аймағында операция кезінде жұтқыншақ бұлшықеттерінің зақымдануы келесіге әкелуі мүмкін:

<variant> жұтқыншақ пен сөйлеудің бұзылуына әкелуі мүмкін

<variant> шайнауға

<variant> тілдің алдыңғы бөлігіндегі дәм сезуіне

<variant> көз қозғалысына

<variant> мойынның сезімталдығына

<question> Төменгі жақасты үшбұрышы аймағында қабыну процесі ортаңғы көкірек (mediastinum) аралығына таралуы мүмкін. Неге?

<variant> превисцералды майлы кеңістік арқылы байланысына байланысты

<variant> тіл асты сілекей безі арқылы

ONTÜSTIK-QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Кафедра «Топографиялық анатомия және гистология» Бақылау өлшеу құралдары		56 беттің 1 беті

<variant> тікелей жұтқыншақ бадамшалары арқылы

<variant> төменгі жақ сүйегіндегі тесіктер арқылы

<variant> мұрын-жұтқыншақ арқылы

<question> Пирогов үшбұрышы тіл артериясына хирургиялық қолжетімділік үшін ыңғайлы деп есептеледі. Неге?

<variant> ол бұлшықеттер мен нервтермен шектелген, олар жақсы көрінеді және бағдар ретінде қызмет етеді

<variant> онда тілдің беткейлік веналары өтеді

<variant> артерия шырышты қабық бетінде орналасқан

<variant> бұл қолжетімділік фасцияларға қатысы жоқ

<variant> өйткені артерия ол жерде жоқ

<question> Бет аймағындағы веналар кейде инфекцияның бас қуысына таралуына себепші болады. Неліктен?

<variant> олар бұрыштық және көз веналары арқылы кавернозды синуспен анастомоз жасайды

<variant> веналарда қақпақшалардың жоқтығынан

<variant> олар мимикалық бұлшықеттердің қалыңдығында өтеді

<variant> олар бет артериясымен қатар жүреді

<variant> беткей орналасуы себепті

<question> Науқтама мандай мен төбе аймағындағы тері қозғалғыштығы төмен. Бұл неге байланысты?

<variant> терінің апоневрозбен тығыз бітісуімен

<variant> майлы клетчатканың көп болуымен

<variant> терінің жұқалығымен

<variant> тер бездерінің болмауымен

<variant> бас сүйегінің сүйектерімен жанасуымен

<question> Науқтама бас сүйек негізінің жарақаты кезінде мұрыннан сұйықтық ағуы (ликворея) байқалады. Неліктен?

<variant> торлы пластинка зақымдануы салдарынан

<variant> тіл асты өзегі зақымданады

<variant> веналық ағыс бұзылады

<variant> бет артериясы зақымдалады

<variant> жоғарғы жақ қойнауы зақымдалады

<question> Науқтама төменгі жақасты үшбұрышы мен қанат-жақ кеңістігінде ірінді процесс дамыды. Хирург бұл аймақтың кеңістіктік байланыстарын ескеруі керек. Қанат-жақ кеңістігінде ірін дамыған жағдайда клиникалық қауіптіліктің негізгі себебі неде?

<variant> жұтқыншақ маңындағы кеңістікке және ортаңғы көкірек аралығына (mediastinum) тез таралуы мүмкін

<variant> ол тек бұлшықеттермен шектелген, сондықтан қауіп аз

<variant> кеңістікте таралу жолдары жоқ

<variant> майлы клетчаткамен шектелген, сондықтан сыртқа шықпайды

<variant> кеңістік оңай сыртқа ашылады, сондықтан қауіпсіз

<question> Бет сүйек доғасы сынғанда төменгі жақ қозғалысы неге бұзылады?

<variant> сыртқы қанатша бұлшықетінің қысылуынан

<variant> бет нервтерінің зақымдануынан

<variant> тіл асты нервтерінің қысылуынан

<variant> жоғарғы жақ артериясының зақымдануынан

<variant> құлақмаңы безінің зақымдануынан

<question> Төменгі жақасты аймағында ісіну кезінде сөйлеу мен жұту неге бұзылады?

<variant> тіл асты нервтерінің және ауыз түбі көкетінің қысылуынан

<variant> жоғарғы жақ нервтерінің зақымдануынан

<variant> ұрт бұлшықетінің қысылуынан

ONTÜSTIK-QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Кафедра «Топографиялық анатомия және гистология» Бақылау өлшеу құралдары		56 беттің 1 беті

<variant> веналық ағыс бұзылуынан

<variant> емізікше өсіндісінің зақымдануынан

<question> Жұтқыншақ маңындағы флегмонада неге науқаста тұншығу қаупі бар?

<variant> жұтқыншақ пен тыныс жолдарының қысылуынан

<variant> кезбе нерв зақымдануынан

<variant> жұмсақ таңдайға қан құйылуынан

<variant> мимикалық бұлшықеттердің салдануынан

<variant> бет артериясының зақымдануынан

<question> Науқаста құлақмаңы безі қабынған кезде бет мимикасы неге бұзылады?

<variant> оның қалыңдығында бет нерві өтеді

<variant> үшкіл нерв зақымданғандықтан

<variant> тілдік нерв зақымданғандықтан

<variant> кезбе нерв зақымданғандықтан

<variant> тіл асты нерві зақымданғандықтан

<question> Беттің веналарының қандай ерекшелігі инфекцияның бас қуысына таралу мүмкіндігін арттырады?

<variant> қақпақшаларының болмауы

<variant> қақпақшаларының болуы

<variant> бұлшықеттерге тығыз жанасуы

<variant> лимфа тамырларымен анастомоздары

<variant> веналардың қабырғасының қалыңдығы

<question> Қанат-таңдай шұңқырынан қабыну процесі бас қуысына қалай таралуы мүмкін?

<variant> кавернозды синуспен веноздық анастомоздар арқылы

<variant> артериялық анастомоздар арқылы

<variant> тіласты шұңқыры арқылы

<variant> қалқанша кеңістігі арқылы

<variant> жұмсақ таңдай арқылы

<question> Беттің қауіпті үшбұрышында жарақаттар неге аса қауіпті?

<variant> инфекция кавернозды синусқа өтіп кетуі мүмкін

<variant> мол қан кету дамиды

<variant> сілекей бездері зақымданады

<variant> көптеген гематомалар түзіледі

<variant> тыртықтар тез қалыптасады

<question> Бас сүйегінің күмбезі апоневрозы мен сүйек қабығы арасындағы бос клетчатка клиникалық тұрғыда неліктен маңызды?

<variant> гематомалардың таралуын жеңілдетеді

<variant> апоневрозды нығайтады

<variant> инфекцияның таралуына кедергі жасайды

<variant> терінің қозғалғыштығын шектейді

<variant> қанмен қамтамасыз етуді күшейтеді

<question> Жақасты аймағындағы абсцес анықталды. Жұтқыншақ артындағы кеңістікке Қабыну қалай таралады?

<variant> фасциялық жапырақшалар арасындағы саңылау арқылы

<variant> төменгі жақ арқылы

<variant> лимфа тамырлары арқылы

<variant> бұлшықет талшықтары арқылы

<variant> артериялық анастомоздар арқылы

<question> Бас сүйегінің алдыңғы шұңқырындағы негіздің сынуынан мұрыннан ликвореяғауы неліктен байқалады?

<variant> торлы пластинка зақымданады

<variant> дабыл жарғағы зақымданады

ОҢТҮСТІК-ҚАЗАҚСТАН MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Кафедра «Топографиялық анатомия және гистология» Бақылау өлшеу құралдары		56 беттің 1 беті

<variant> құлақ маңы безі жыртылады

<variant> қанат-таңдай шұңқыры зақымданады

<variant> есту түтігінің қызметі бұзылады

<question> Беттегі қабынуда қабақ ісінуінің себебі неде?

<variant> бет веналарының көз ұясы веналарымен байланысы арқылы

<variant> лимфа тоқырауының салдарынан

<variant> без капсуласының жарылуына байланысты

<variant> бет нервінің зақымдануына байланысты

<variant> гаймор қуысының қабынуына байланысты

<question> Жақасты үшбұрышының қабынуды ауыз қуысына тез өткізетін ерекшелігі, неге қабыну тез таралады?

<variant> клетчатканың борпылдақтығы

<variant> терінің жұқалығы

<variant> лимфа түйіндерінің болмауы

<variant> ірі бұлшықеттердің болуы

<variant> қанмен жақсы қамтамасыз етілуі

<question> Құлақ маңы безінің қабынуында шайнаудың қиындауы байқалады, неліктен ауызды ашу қиындайды?

<variant> қабыну шайнау бұлшықетіне таралады

<variant> жұтқыншақ зақымданады

<variant> омыртқалар зақымданады

<variant> сілекей өзектерінің жұмысы бұзылады

<variant> көз қозғалтқыш бұлшықеттер қабынады

<question> Жұтқыншақ бадамшаларына тіл-жұтқыншақ нервінің тығыз жанасуының клиникалық маңызы неде?

<variant> тонзиллэктомия кезінде жұтынудың бұзылу қаупі

<variant> мимикалық бұлшықеттердің салдану қаупі

<variant> ұйқы артериясынан қан кету қаупі

<variant> жақасты безінің зақымдану қаупі

<variant> самай бұлшықетінің қабыну қаупі

<question> Шайнау бұлшықеті қабынғанда ауызды ашудың шектелуі неге байланысты?

<variant> бұлшықеттің спазмына байланысты

<variant> сүйек қабығының зақымдануына байланысты

<variant> лимфа түйіндерінің қабынуына байланысты

<variant> жақасты безінің ісінуіне байланысты

<variant> ұйқы артериясының қысылуына байланысты

<question> Науқасқа жоғарғы жақ тістерін алу отасы жасалды. Бірнеше күннен кейін науқаста гаймор қуысының ауырсынуы мен иектегі қысым сезімі байқалды. Неліктен жоғарғы жақ тістерін алып тастағаннан кейін синусит дамуы мүмкін?

<variant> тіс түбірлері гаймор қуысына өтетін жерге өте жақын орналасқан

<variant> тістер арасындағы сүйек пердесі толық дамымаған

<variant> шырышты қабат жұқа және сезімтал

<variant> қабыну тіндер арқылы тез таралады

<variant> тамырлы тор артық дамығ

<question> Науқаста бет сүйегінің сынығы болды, бет аймағында қатты қан кету байқалды.беттегі жарақаттарда қан кету неге қарқынды болады?

<variant> бет тамырларының тығыз анастомоздары мен торлы байланыстарының болуы

<variant> тері сүйекке тығыз жанасады

<variant> артерияларда қақпақшалардың болмауы

<variant> ұсақ тамырлардың көп болуы

<variant> сілекей бездерінің жақындығы

ONTÜSTIK-QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ	 SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Кафедра «Топографиялық анатомия және гистология» Бақылау өлшеу құралдары	56 беттің 1 беті

<question> Науқта кұлақ маңы безінің ісігі бар, науқта бет бұлшықеттерінің әлсіздігі байқалады.

неліктен кұлақ маңы безінің ісіктері жиі бет нервінің парезімен қатар жүреді?

<variant> бет нервінің қалыңдық арқылы өтуіне жақындығына байланысты

<variant> лимфа түйіндерінің қабынуына байланысты

<variant> ұйқы артериясының қысылуына байланысты

<variant> тіл нервінің жақындығына байланысты

<variant> веноздық синустардың зақымдануына байланысты

<question> Науқта төменгі жақта аймағында іріңді процесс дамыды.

неліктен жұтқыншақ артындағы қабыну ортаңғы көкірек аралығына тез таралуы мүмкін?

<variant> төменге қарай жалғасатын борпылдақ клетчатканың болуы

<variant> лимфа түйіндері арқылы

<variant> артериялық анастомоздар арқылы

<variant> жұмсақ таңдай арқылы

<variant> мұрын қалқасы арқылы

<question> Неліктен тіл асты нервінің зақымдануы сөйлеу қызметінің бұзылуына алып келеді?

<variant> Себебі ол тіл бұлшықеттерін жүйкелендіреді, олардың салдануы сөйлеуге әсер етеді

<variant> Себебі ол мимикалық бұлшықеттерді жүйкелендіреді, олардың салдануы сөйлеуге әсер етеді

<variant> Себебі ол жұмсақ таңдайды жүйкелендіреді, оның зақымдануы сөйлеуге әсер етеді

<variant> Себебі ол есту жүйесіне қатысады, оның бұзылуы сөйлеуге әсер етеді

<variant> Себебі ол кұлақ маңы безін жүйкелендіреді, оның қабынуы сөйлеуге әсер етеді

<question> Науқта отиттен кейін бет аймағында ісіну байқалды. бастың веналарының қандай ерекшелігі флебиттің дамуына әсер етеді?

<variant> қатты ми қабығы синустарымен анастомоздардың болуы

<variant> қақпақшалардың болуы

<variant> синустармен байланысының болмауы

<variant> бұлшықет қабығының болуы

<variant> веналық өрімнің болмауы

<question> Науқта ұйқы артериясын қысу байқалды.

неліктен жалпы ұйқы артериясын қысқанда естен тану (syncope) пайда болады?

<variant> миға қан ағымы тоқтайды

<variant> веналық қанның ағуы тоқтайды

<variant> нервтер зақымданады

<variant> кеңірдек жарақаттанады

<variant> жұмсақ тіндердің ісінуі дамиды

<question> Науқта сигма тәрізді синус тромбозы анықталды.

неліктен бет ісінуі дамуы мүмкін?

<variant> бет веналарынан веналық ағу бұзылады

<variant> кұлақ маңы безі зақымданады

<variant> тіл-жұтқыншақ нерві зақымданады

<variant> лимфа ағуы бұзылады

<variant> кезбе нерв қысылады

<question> Бет нервінің зақымдануы кезінде науқта «көздің құрғауы» пайда болады. Бұл феноменнің анатомиялық негізі қандай?

<variant> жас безінің иннервациясының бұзылуы

<variant> көру нервінің зақымдануы

<variant> көз қозғалтқыш бұлшықеттердің иннервациясының бұзылуы

<variant> қабақтың түйілуі

<variant> гаймор қуысының ісінуі

ONTÜSTIK-QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Кафедра «Топографиялық анатомия және гистология» Бақылау өлшеу құралдары		56 беттің 1 беті

<question> Шүйде аймағындағы жұмсақ тіндердің қабынуы мойынға тез таралуы мүмкін. Бұл қандай анатомиялық ерекшелікпен байланысты?

<variant> борпылдақ клетчатканың және фасциялық кеңістіктердің байланысының болуы

<variant> қанмен мол қамтамасыз етілуі

<variant> ірі бұлшықеттердің болуы

<variant> фасцияның болмауы

<variant> лимфа түйіндерінің болуы

<question> Қалқанша бездің операциясы кезінде қан кету қаупін арттыратын негізгі анатомиялық ерекшелік қандай

<variant> тамырлардың мол торы мен қанмен мол қамтамасыз етілуі

<variant> капсуласының жұқалығы

<variant> май клетчаткасының болуы

<variant> кеңірдекке жақындығы

<variant> қозғалғыштығының аздығы

<question> Төменгі жақ сынғанда науқаста тыныс алу бұзылуы мүмкін. Оның себебі қандай?

<variant> тілдің артқа шөгуіне байланысты

<variant> көз бұлшықеттерінің зақымдануына байланысты

<variant> артериядан қан кетуіне байланысты

<variant> құлақ маңы безінің зақымдануына байланысты

<variant> мимикалық бұлшықеттердің салдануына байланысты

<question> Мұрын қуысынан инфекцияның таралуында жұтқыншақ анатомиясының рөлі қандай?

<variant> есту түтігінің болуы

<variant> мұрын қалқаларының болуы

<variant> гаймор қуыстарының болуы мұрын пердесінің болуы

<variant> маңдай қуысының болуы

<variant> кеңірдекке жақындығы

<question> Самай бұлшықеті қабынғанда ауырсыну төменгі жақ аймағында сезіледі. Бұл неге байланысты?

<variant> үшкіл нервтің ортақ иннервациясына байланысты

<variant> лимфатикалық байланыстарға байланысты

<variant> тіл артериясымен қанмен қамтамасыз етілуіне байланысты

<variant> құлақ маңы безінің жақындығына байланысты

<variant> сілекей өзектерінің қабынуына байланысты

<question> Кезбе нерв зақымданғанда неге дауыс бұзылады?

<variant> көмей бұлшықеттерінің салдануына байланысты

<variant> мимикалық бұлшықеттердің салдануына байланысты

<variant> жұмсақ таңдайдың зақымдануына байланысты

<variant> тіл бұлшықеттерінің салдануына байланысты

<variant> лимфа түйіндерінің қабынуына байланысты

<question> Мойын веналарының қандай анатомиялық ерекшелігі инфекцияның тез таралуын түсіндіреді?

<variant> қақпақшалардың болмауы

<variant> қақпақшалардың болуы

<variant> веналардың қабырғасының қалыңдығы

<variant> анастомоздардың болмауы

<variant> бұлшықет қабығының мол болуы

<question> Бас сүйегінің негізі сынғанда «Бэтл симптомын» (құлақ артында қан құйылуы) не тудырады?

<variant> сигма тәрізді синустың зақымдануына байланысты

<variant> жоғарғы жақтың зақымдануына байланысты

<variant> шайнау бұлшықетінің зақымдануына байланысты

ОҢТҮСТІК-ҚАЗАҚСТАН MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Кафедра «Топографиялық анатомия және гистология» Бақылау өлшеу құралдары		56 беттің 1 беті

- <variant> тіл нервiнiң зақымдануына байланысты
- <variant> бет веналарының зақымдануына байланысты
- <question> Төменгi жақ тiстерiн алған кезде неге төменгi альвеолярлық нерв зақымдануы мүмкiн?
- <variant> ол сүйек iшiндегi өзек арқылы өтедi
- <variant> ол шайнау бұлшықетiнде өтедi
- <variant> ол тiл нервiмен бiрге жүредi
- <variant> ол құлақ маңы безiнде жатады
- <variant> ол қанат-тандай шұңқырында өтедi