

ОҢТҮСТІК-ҚАЗАҚСТАН MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		 SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Фтизиопульмонология және радиология кафедрасы		044-70/11
Аралық бақылауға арналған сұрақтар		8беттің16беті

Бағдарламаның № 2 аралық бақылауға арналған сұрақтары

- БББ атауы: Жалпы медицина
- Пәннің коды: Ftiz 5305
- Пәннің атауы: Фтизиатрия
- Оқу сағаттарының саны / кредиттер: 120/4
- Оқу курсы мен семестрі: 5/9

Құрастырған:

1.Касаева Л.Т.- доцент м.а., кафедра меңгерушісі

2. Серхожаева Т.Х.- ассистент

Кафедра меңгерушісі



Касаева Л.Т.

Хаттама №11 Күні 26.06.2025

Шымкент - 2025

QONTUSTIK-QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Фтизиопульмонология және радиология кафедрасы		044-70/11
Аралық бақылауға арналған сұрақтар		8бетін26еті

5 курс ЖМ студенттеріне арналған сұрақтары
2-ші Аралық бақылау
200 – сұрақ

1. Спонтанды пневмоторакста, көкірек қуысы мүшелерінің ығысуында ең бірінші... қолданылады.
2. Біріншілік туберкулезді кешен мен бронхоаденит кезінде, бронхтардың клинико-рентгенологиялық көрінісінде... байқалмайды.
3. Кавернозды туберкулезбен ауыратын науқаста ... шағымдары тән емес.
4. Кавернозды туберкулезбен ауыратын науқастың сырт көрінісі және жағдайы ... болады.
5. Кавернозды туберкулез кезінде қақырық пен бацилярлығы ... сипатта болады.
6. Кавернаның рентгенологиялық белгілеріне... жатпайды.
7. Фиброзды – кавернозды туберкулезге науқасқа ... шағымдары тән.
8. Фиброзды-кавернозды өкпе туберкулезіне ... болатын қақырық тән.
9. Өкпенің циррозды туберкулезі:
10. Өкпенің циррозды туберкулезінің белсенділігіне ... байланысты емес.
11. Өкпенің циррозды туберкулезіне тән клинико- рентгенологиялық сипаттама:
12. Циррозды туберкулезді науқас қақырығында іріңді компоненттің болуы ... белгісі емес.
13. Циррозды туберкулездің клиникалық көрінісіне... жатпайды.
14. Өкпенің циррозды туберкулезімен ауыратын науқастың жағдайы мен жалпы түрі:
15. Туберкулезді плеврит кезінде плевралды сұйықтықта ТМБ... кездеседі.
16. Торакоскопия мен биопсия ... туберкулезді плеврит кезеңін дәлелдейді.
17. Экссудативті қасиеті бойынша нейтрофильдер 15%, лимфоциттер 80 %, эритроциттер 5% құрамы ... плевритке тән.
18. Экссудативті қасиеті бойынша ... плевритке нейтрофильдер 70%, эритроциттер 10 %, лимфоциттер 10% құрамы тән.
19. Экссудативті плеврит кезінде плевралды сұйықтықта сегментоядролы лейкоциттер анықталса ...
20. Экссудативті плевриттің этиологиясын анықтаудың тиімді жолы:
21. Инфильтративті туберкулездің клиникалық көрінісінің дәрежесі...байланысты.
22. Саркоидозбен ажыратпалы диагностика ... жасалынбайды.
23. Фиброзды-кавернозды туберкулездің асқынуына ...жатпайды.
24. Ішкі ағзалардың амилоидозының асқынуына ... алып келеді.
25. Кавернозды туберкулезге қарағанда өкпенің абцессіне ...тән емес.
26. Туберкулезге қарсы препараттармен емдеу барысында, науқас көзі көруінің төмендеуіне шағымданса ... кері әсері деп ойлау керек.
27. Егер науқас активті туберкулезбен бірге бір жыл бұрын вирусты гепатитті өткерсе, онда ол ... сақтану керек.
28. Өкпенің туберкулезімен ауыратын науқасқа комплексті ем ретінде ультрадыбысты тағайындау ... қолдануға болмайды.
29. Жасушаішілік белсенділікке ... ие.

ONTUSTIK-QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Фтизиопульмонология және радиология кафедрасы		
Аралық бақылауға арналған сұрақтар		
044-70/11		
8беттің3беті		

- 30.Науқаста өкпелік қан кету кезінде, қандағы фибринолитикалық белсенділікті ... төмендетеді.
- 31.Жасушадан тыс белсенділікке ие препарат:
- 32.Плера қуысында сұйықтықтың бар екенін рентгенологияда ... көрсетпейді.
- 33.Туберкулезбен ауыратын науқастың дем алу актісі кезінде кеуде қуысында ауру сезімінің болуы ... білдіреді.
- 34.Изониазидтің жанама әсерлері:
- 35.Рентгенологияда өкпе циррозының туберкулезді сипаты ... көрінбейді.
- 36.Қан түкірудің қан кетуден айырмашылығы:
- 37.Инспираторлы еңтігу:
- 38.Пиразинамидтің жанама әсері:
- 39.Этамбутолдың спецификалық жанама әсері:
- 40.Туберкулезді ауруға арналған диета:
- 41.Жеделдеу диссеминацияланған өкпе туберкулезінің рентгенологиялық синдромына ... жатпайды.
- 42.Кавернаның тікелей рентген көрінісі:
- 43.Туберкулездің активті процесін ... көрсетеді.
- 44.Плевра қуысындағы сұйықтықты анықтайтын негізгі әдіс:
- 45.Өкпеден қан кеткенде викасолдың 1-1.0мл ерітіндісін бұлшықетке енгізгенде, коагуляциялық әсері ...сағатта пайда болады.
- 46.Кенеттен дамыған спонтанды пневмоторакстың дәрігерлік көмегіне ...жатпайды.
- 47.Фиброзды-кавернозды туберкулез жиі ... айналады.
- 48.Кавернозды туберкулезде ... қуыстар болады.
- 49.Фиброзды-кавернозды туберкулезден болатын өлім себебі:
- 50.Өкпенің циррозды туберкулезінде ... дәнекер тін көп өседі.
- 51.Цирроз бір жақты және шектелген болады, егер ... ол дамыса.
- 52.Өкпелік қан кету кіші қан айналым шеңберінде гипертензияны ... басады.
- 53.Өкпелік қан кетуде ... қолданбайды.
- 54.Ірі көлемді циррозды туберкулезді хирургиялық ем көрсеткіші:
55. Дицинонды күре тамырға енгізгенде 2,0 мл 12,5%гемостатикалық әсері ... созылады.
56. Циррозды туберкулездің асқынуының жиі себебі:
57. Циррозда перкуторлы ... анықталады.
58. Өкпе циррозының рентгенологиялық сипаттамасы:
59. Бронх туберкулезінің инфильтративті формасында эндоскопиялық көрінісіне жатпайды
60. Бронх туберкулезі ... дамымайды.
61. Өкпе туберкулезі силикоздың ... бірге жүреді.
62. Туберкулез омыртканың ... бөлігін жиі зақымдайды.
63. Бүйрек туберкулезімен ауыратын науқастың зәрінде болатын ... болуы тән емес.
64. Өкпе туберкулезінде еңтікпе ... байланысты.
65. Бөлікаралық плевриттің рентгенологиялық көрінісі:
66. Фиброзды (құрғақ) плеврит клиникасында басым:
67. Плевра қуысына сұйықтықтың түсуіндегі негізгі физикалық белгілері:
68. Транссудатқа тән емес:

ОҢТҮСТІК-ҚАЗАҚСТАН MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Фтизиопульмонология және радиология кафедрасы		044-70/11
Аралық бақылауға арналған сұрақтар		8беттің46еті

69. Туберкулездік эндометритті ... арқылы табуға болады.
70. Туберкулезді этиологиялы ириттер, иридоциклиттер ... әдісімен анықталмайды.
71. Экссудативті плевритке тән рентгенологиялық белгілер:
72. Экссудативті плеврит этиологиясын анықтау үшін ең нақты әдіс:
73. Жамбас қыртыстарының төмен түсуі (Гренденбург симптомы)... тән.
74. Ішек туберкулезінің инфильтративтік- жаралы формасына ... тән.
75. Туберкулезді спондолиттің асқынбаған ағымында ... зақымданады.
76. Әйел жыныс ағзаларының туберкулезінде ... жиі зақымдалады.
77. Өкпенің ыдырауының R-логиялық жанама белгісіне ... жатады.
78. Туберкулезбен ауыратын науқастың қан түкіруі ... негіздейді.
- 79.3-ші “Д” топқа кірмейтін науқастар
80. Ошақты өкпе туберкулезінің патогенезіне ... жатпайды.
81. Өкпе туберкулемасын анықтауда негізгі әдіске ... жатпайды.
82. ошақты туберкулез бойынша бірінші рет ауырған науқастар “Д” есепте... тұрады.
83. Ошақты туберкулезбен қайта ауырған науқастар ыдырау фазасында ... Д есепте тұрады.
84. Туберкулезбен ауыратын негізгі және резервті дәрілік препараттарға резистентті науқастар Д есепте... тұрады.
85. Туберкулездің мультирезистентті формасымен ауыратын науқастар Д есепте...тұрады.
86. Кеткен қан көлемі ... болғанда аз қан кету деп айтылады.
87. Алғаш рет науқаста бацилла пайда болғанда толтырылатын құжат:
88. Алкоголизммен ауыратын науқаста жиі кездеседі:
89. Инфильтративті туберкулезбен ауыратын ыдырау фазасында және ТМБ болған науқасты ... 2-ші диспансерлік есепке ауыстырылады.
90. Жүктілік кезінде ... қабылдауға болмайды.
91. Каверна көлемінің ұлғаюына әкеп соқтыратын негізгі себеп:
92. Туберкулезді мезаденитке...тән емес.
93. Бүйрек және зәр шығару жолдары туберкулезінің диагностикасында ... маңызды емес.
94. Өкпе туберкулезінің деструктивті түрімен ауыратын науқасты емдеу нәтижелігінің негізгі критеріі:
95. Өкпе туберкулезінде кавернаның тікелей рентгенологиялық белгісі ... болып табылады
96. Бронх туберкулезінің жиі ақыры:
97. Ұзақ уақыт жазылмайтын оң өкпенің төменгі бөлігінің кавернозында... жасалынады.
- 98.Фиброзды-кавернозды туберкулезіне тән емес асқыну:
- 99.Өкпе туберкулезімен алғаш рет анықталған науқастар арасында кеш анықталған туберкулез:
- 100.Өкпенің фиброзды-кавернозды туберкулезінде рентгенологиялық ... анықталады.
- 101.Өкпенің фиброзды-кавернозды туберкулезінің жиі кездесетін асқынуы:
- 102.Өкпенің фиброзды-кавернозды туберкулезінің асқынуына ... жатпайды.
- 103.Фиброзды-кавернозды туберкулез түзілуіне ... әкелмейді.
104. Өкпе резекциясына қарсы көрсеткіш:
- 105.Емдік резистенттіліктің дамуына алып келмейді:
- 106.Туберкулезді экссудативті плевриттің клиникасы ... сипатталады.
- 107.Құрғақ плевриттің клиникасы сипатталады:

QONTUSTIK-QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Фтизиопульмонология және радиология кафедрасы		044-70/11
Аралық бақылауға арналған сұрақтар		8беттің5беті

108.Штампталған каверна өкпеде түзіледі:

кез келген туберкулез формасы

109.Науқастың рентгенограммасында оң жақ өкпенің жоғарғы бөлігінде I-II қабырға шамасында дөңгелек пішінді, мөлшері 4 x 4 см, жабық сақиналы көлеңке анықталады. Перикавитарлы аймақта аздаған ошақтар бар; өкпе түбірімен «жолақша» арқылы байланысқан, оның құрылымында жұп жолақты инфильтративті қабырғалы дренажды бронх анықталады. Басқа өкпе аймақтарында ешқандай өзгеріс жоқ. Синустары бос. Диафрагма контурлары тегіс. Жүрек, аорта - өзгеріссіз. Рентгенограмма бойынша қорытынды жасаңыз:

110. Науқас 30 жаста. Жалпы тәжірибелі дәрігерге кеуде сарайының оң жағында қанжар сұққандай ауру белгісіне, мәжбүрлік қалыпқа шағымданып келді. Анамнезінде науқас диспансерлік тіркеуде кавернозды туберкулезбен есепте тұрады. Оперативтік емнен бас тартқан. Науқасқа жедел жәрдем көрсету тактикасы:

111.Науқас ыдырау сатысындағы өкпенің диссеминирленген туберкулезіне байланысты 6 ай емделген, ТМБ+. Бактерия шығарушылық тоқтатылды, ошақтар жойылды және тығыздалды, оң жақтан 2 см диаметрлі қуыс пайда болды. Сіздің диагнозыңыз:

112. Қабылдау бөліміне этиологиясы белгісіз менингитке күмәнді науқас келіп түсті. Жұлын сұйықтық анализінде келесі өзгерістер анықталды: цитоз 400, лимфоциттер 75%, нейтрофилдер 20%, белок 1,5, қант 1,9, хлоридтер 110 м/моль, фибринді пленка 24 сағаттан соң түсті, Панди реакциясы – (+++). Фтизиатр кеңесінен кейін туберкулезді менингит диагнозы қойылды.

Спецификалық химиотерапия схемасы:

113. Өкпенің ошақты туберкулезінде ең маңызды рентген көрініс:

114.Науқас С. Бірнеше ай көлемінде ауырады. Бірнеше рет тұмаулы жағдай бойынша өз бетімен емделген. Соңғы кездері тамағында ауырсыну пайда болған. Айқын интоксикация, енгігу, кеуделік синдром. Қақырық анализінде туберкулез микобактериясы оң. Рентгенограммада екі өкпесінде де әртүрлі интенсивті көптеген ошақты көлеңкелер, кей жерлерінде бір-біріне бірігіп кетеді, акшылдану аймақтары да байқалады. Дұрыс диагноз:

115.Туберкулездің кавернозды түрі көбінесе тікелей алдын алады...

116.Қабырға жаңа туберкулез кавер ерекшеленеді...

117.кавернозды туберкулез ыдырау фазасындағы инфильтративті туберкулезден ерекшеленеді...

118.туберкулездің кавернозды түріне тән...

119.кавернозды туберкулезбен алғаш анықталған науқастың клиникалық көріністері,әдетте...

120. Жаңа кавернаның Рентгенологиялық белгілері...

121.кавернозды туберкулезбен ауыратын науқастарда жиі байқалады...

122.кавернозды туберкулездің пайда болуына ықпал етеді...

123.кавернозды туберкулездің өршуі чаще, қалыптастыруға әкеледі ...

124.фиброзды кавернозды өкпе туберкулезі сипатталады ...

125.фиброзды-кавернозды өкпе туберкулезі откавернозды туберкулезден ерекшеленеді ...

126.фиброзды-кавернозды өкпе туберкулезінің клиникалық көрінісі, әдетте ...

QONTUSTIK-QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Фтизиопульмонология және радиология кафедрасы		044-70/11
Аралық бақылауға арналған сұрақтар		8беттің6беті

- 127.өкпенің фиброзды-кавернозды туберкулезі бар науқастарда ТМБ-ға акр-ны зерттеу ...
- 128.талшықты кавернаның үстінде жиі естіледі ...
- 129.өкпенің фиброзды-кавернозды туберкулезі бар науқастарда өршу кезінде бөліну жиі байқалады ...
- 130.фиброзды-кавернозды өкпе туберкулезі жиі асқынады ...
- 131.фиброзды кавернозды өкпе туберкулезінде өлімнің жиі кездесетін себебі ...
- 132.< question > фиброзды-кавернозды өкпе туберкулезінде химиотерапиямен бірге қолдану әдетте тиімдірек ...
- 133.фиброзды кавернозды өкпе туберкулезіне тән ағым ...
- 134.цирротикалық өкпе туберкулезіндегі ерекше өзгерістер әдетте ұсынылады ...
- 135.Цирротикалық өкпе туберкулезі тікелей алдында жиі кездеседі ...
- 136.өкпе тінінде туберкулездің дамуы туралы куәландырады ...
- 137.өкпе циррозынан цирротикалық туберкулез бар ...
- 138.Цирротикалық туберкулез фиброзды-кавернозды өкпе туберкулезінен ерекшеленеді ...
- 139.өкпенің цирротикалық туберкулезін дамытуда принципті маңызы бар ...
- 140.өкпенің цирротикалық туберкулезінің жиі және тұрақты клиникалық белгілері ...
- 141.цирротикалық туберкулезде ерекше қабынудың өршуін анықтауға мүмкіндік береді ...
- 142.цирротикалық өкпе туберкулезінің көптеген көріністері ...
- 143.цирротикалық туберкулез кезінде өлімге әкелетін жағдай дамуымен байланысты ...
- 144.көмейдің, кеңірдектің және бронхтың туберкулезі туберкулезбен ауыратын науқастарда жиі анықталады ...
- 145.көмейдің ішкі сақинасының зақымдануы, науқастарда жиі анықталады ...
- 146.бронх қабырғасында қалыптасқан туберкулез инфильтратының ыдырауы пайда болады ...
- 147.нәтижесінде Нодулобронхиальды фистула пайда болады ...
- 148.бронх туберкулезінде жетекші клиникалық симптом ...
- 149.бронх туберкулезін диагностикалаудың негізгі әдісі ...
- 150.бронх туберкулезінің жиі салдары ...
- 151.туберкулездік менингит диагнозын зерттеудің негізгі әдісі ...
- 152.туберкулезді менингитке тән видспин-ми сұйықтығы ...
153. туберкулезді менингитке тән аурудың басталуы ...
- 154.жұлын-ми сұйықтығының көрсеткіштері туберкулезді менингитке тән ...
155. туберкулез менингитінің базилярлық түріне тән ...
- 156.туберкулез менингитінде бас сүйек-ми нервтерінің келесі жұптары әсер етеді ...
- 157.туберкулез менингитінің ляменингоэнцефалитикалық сатысы тән ...
- 158.бас-ми нервтерінің зақымдануы, тән ...
- 159.туберкулез менингитінің ең типтік асқынуы ...
- 160.туберкулезді лептопахименингитте байқалатын клиникалық белгілер ...

ONTÜSTIK-QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Фтизиопульмонология және радиология кафедрасы		
Аралық бақылауға арналған сұрақтар		
044-70/11		
8беттің76еті		

- 161.туберкулез плевриті ...
- 162.туберкулез экссудативті плевриттің тән рентгенологиялық белгісі ...
- 163.Тұзаралық плевритті анық көруге болады ...
- 164.экссудаттағы туберкулезді плевритте басым ...
- 165.сүйек туберкулезіне жиі әсер етеді ...
- 166.сүйек және буын туберкулезінің дамуы кезінде тіндерге ТМБ енуінің негізгі жолы ...
- 167.омыртқа туберкулезінің дамуы кезінде бастапқы ошақтарды оқшаулау ...
- 168.әр түрлі буындардан туберкулез чащепоражает ...
- 169.бүйрек туберкулезінің дамуы кезінде бастапқы ошақтарды оқшаулау ...
- 170.бүйрек туберкулезінде контрастты затпен толтырылған қуыстың фестончатты шеттері бар рентгенологиялық көрінісі сәйкес келеді ...
- 171.әйел жыныс мүшелерінің туберкулезінің дамуы кезінде бастапқы ошақтарды оқшаулау ...
- 172.әйел жыныс мүшелерінің туберкулезінде зақымдану көлемін анықтауға мүмкіндік беретін негізгі зерттеу ...
- 173.эпидидимиттің клиникалық көрінісі болған кезде уретриттің болмауы тән белгі болып табылады ...
- 174.абдоминальды туберкулездің ең ерте түрі ...
- 175.перифериялық лимфа түйіндерінің барлық топтарынан туберкулез жиі әсер етеді ...
- 176.көз туберкулезінің гематогенді түрінде жиі әсер етеді ...
- 177.тері туберкулезінің ең көп таралған түрі ...
- 178.пневмокониоздың ең көп таралған түрі ...
- 179.силикозбен ауыратын науқастарда туберкулездің дамуы үшін маңызды ...
- 180.туберкулезбен және қант диабетімен ауыратындар арасында басым ...
- 181.АИТВ-мен байланысты туберкулездің клиникалық көрінісі мен ағымы негізінен ...
- 182.АИТВ инфекциясы мен туберкулездің үйлесімімен ауыратын науқастарда туберкулезге қарсы иммунитетті басу ...
- 183.Силикотикалық гранулемапредставлена ...
- 184.қант диабеті бар науқастарда жиі дамиды ...
- 186.туберкулез және психикалық аурулары бар науқастарда ...
- 187.алкоголизммен ауыратын науқастарда туберкулездің ең көп таралған түрі ...
- 188.туберкулездің әлеуметтік алдын алуға қатысты іс-шаралар ...
- 189.санаторлық профилактиканың мақсаты ...
- 190.туберкулездің санитарлық алдын-алу...
- 191.туберкулез инфекциясы ошағында дезинфекция үшін қолданылатын химиялық заттар ...
- 192.МВТ-де зиянды әрекет ...
- 193.туберкулездің арнайы алдын-алу ...
- 194.БЦЖ Иммундауы адамдарға көрсетілген ...

ОҢТҮСТІК-ҚАЗАҚСТАН MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Фтизиопульмонология және радиология кафедрасы		
Аралық бақылауға арналған сұрақтар		044-70/11 8беттің8беті

195.ҚР-да дені сау нәрестелерге туберкулезге қарсы вакцинация жас кезінде жүргізіледі

...

196.перзентханада жаңа туған нәрестені вакцинациялауға абсолютті қарсы көрсетілімдер

...

197.егер вакцинациядан кейінгі тыртықтың мөлшері аз болса, жасанды туберкулезге қарсы иммунитет толық қалыптасқан деп саналады ...

198.БЦЖ тері ішілік вакцинациясы кезінде иммунитеттің жойылу мерзімі орта есеппен ...

199. **ҚР БЦЖ** ревакцинациясының мерзімі ...

200.БЦЖ ревакцинациясына қарсы көрсетілім болып табылады ...