

ОҢТҮСТИК-ҚАЗАҚСТАН MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Кафедра фтизиопульмонологии и радиологии		70/11
Вопросы программы РК-1		1стр. из 7

Вопросы программы для рубежного контроля - 1

Название ОП: Медицина

Код дисциплины: Ftiz 4315

Название дисциплины: Фтизиатрия

Объем учебных часов/кредитов: 120/4

Курс и семестр: 4/8

Составитель: 1. Касаева Л.Т. – и.о. доцента, заведующая кафедрой

2. Серхожаева Т.Х. – ассистент кафедры

Заведующая кафедрой

Л.Т. Касаева

Касаева Л.Т.

Протокол №11 Дата 26.06.2025

ОҢТҮСТІК-ҚАЗАҚСТАН MEDISINA АКАДЕМИЯСЫ «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Кафедра фтизиопульмонологии и радиологии		70/11
Вопросы программы РК-1		2стр. из 7

Вопросы для студентов 4 курса «Медицина» по фтизиатрии, 200 вопросов

Рубежный контроль -1

1. К группам населения повышенного медицинского риска по туберкулезу не относятся...
2. Для выявления возбудителя туберкулеза наиболее чувствительным является ... метод.
3. Дообследование при выявлении легочной патологии флюорографическим методом должно проводиться в течение...
4. Обязательным клиническим минимумом при обследовании на туберкулез легких не является ...
5. Бактериоскопическому исследованию мокроты на микобактерии туберкулеза подлежат ...
6. Проба Манту с 2 ТЕ считается положительной при размерах папулы не менее...
7. Проба Манту с 2 ТЕ у взрослых считается гиперергической при размерах папулы не менее... .
8. Простой бактериоскопией в 1 мл мокроты обнаруживаются микобактерии туберкулеза в количестве ... микробных тел.
9. Методом люминесцентной микроскопии в 1 мл мокроты обнаруживаются микобактерии туберкулеза в количестве ... микробных тел.
10. Методом посева в 1 мл мокроты обнаруживаются микобактерии туберкулеза в количестве... микробных тел.
11. Методом флотации в 1 мл мокроты обнаруживаются микобактерии туберкулеза в количестве... микробных тел.
12. Наиболее часто поражаются при туберкулезе легких у взрослых ...сегменты.
13. Ранняя туберкулезная интоксикация это -
14. Поражение... является морфологическим субстратом ранней туберкулезной интоксикации.
15. К ранней туберкулезной интоксикации относят процессы с длительностью до... .
16. К хронической туберкулиновой интоксикации относятся процессы с длительностью более... .
17. К признакам хронической туберкулезной интоксикации не относится... .
18. Наиболее характерные формы первичного туберкулеза... .
19. Формы внелегочного туберкулеза наиболее характерны для первичного периода туберкулезной инфекции это -
20. Наиболее характерными изменениями периферической крови при первичном туберкулезе являются -... .
21. Следующая рентгенологическая картина: легочные поля без очаговых и инфильтративных теней, корни имеют нормальный размер, форму и структуру характерна для
22. Рентгенологически наиболее чаще с перифокальным воспалением протекает туберкулез ... лимфоузлов.
23. Клинико-рентгенологические признаки не характерные для поражения бронхов при первичном туберкулезном комплексе и бронхоадените
24. К условиям для возникновения диссеминированного туберкулеза легких не относятся... .
25. Наиболее частый источник диссеминации в легких, это-
26. Диссеминированный туберкулез легких, это
27. При диссеминированном туберкулезе часто наблюдается... .
28. Острый диссеминированный туберкулез легких, это



29. При милиарном туберкулезе рентгенологически отмечаются
30. При подостром диссеминированном туберкулезе рентгенологически отмечаются
31. Бактериовыделение при хроническом диссеминированном туберкулезе легких чаще
32. Основным методом выявления очагового туберкулеза у взрослых является
33. Наиболее характерные данные перкуссии и аускультации при мягкоочаговом туберкулезе-... .
34. Наиболее характерные данные перкуссии и аускультации при фиброзно-очаговом туберкулезе-... .
35. Часто наблюдаются при мягко-очаговом туберкулезе легких в периферической крови-
36. Наличие МБТ в мокроте при мягко-очаговом туберкулезе без распада... .
37. Инфильтративный туберкулез легких характеризуется... .
38. Для округлых и лобулярных инфильтратов без распада характерна
39. Рентгенологически при облаковидном инфильтрате в фазе распада определяется... .
40. Рентгенологически при округлом инфильтрате без распада определяется
41. Рентгенологическая картина при туберкулеме... .
42. Клинико-рентгенологические варианты туберкулем... .
43. Рентгенологические признаки стабильной туберкулемы... .
44. Рентгенологические признаки прогрессирующей туберкулемы, это... .
45. Рентгенологические признаки регрессирующей туберкулемы
46. Наиболее характерные лабораторные данные при стабилизированных туберкулемах
47. Изменения гемограммы, характерные для прогрессирующей туберкулемы это
48. Симптом наиболее характерный для миллиарного туберкулеза -
49. Самая частая клиническая форма туберкулеза у подростков... .
50. Сбор мокроты для микроскопии мазка на МБТ необходимо производить... .
51. Туберкулезный лобит это
52. Диссеминированный туберкулез легких может осложниться... .
53. Инспираторная одышка-это... .
54. Наиболее информативный метод в диагностике очагового туберкулеза легких - это... .
55. Активность туберкулезного процесса характеризует
56. Обнаружить кислотоустойчивые штаммы позволяет метод окраски
57. К типичным клиническим формам первичного туберкулеза у подростков
НЕ ОТНОСИТСЯ
58. Характер плеоцитоза при туберкулезном менингите... .
59. При активном очаговом туберкулезе рентгенологически наблюдаются... .
60. На фоне... в легких чаще всего возникает инфильтративный туберкулез.
61. Диссеминированный туберкулез часто приходится дифференцировать с... .
62. В течении туберкулезного менингита можно выделить три периода... .
63. Расстройства функции тазовых органов встречаются при... .
64. По патогенезу очаговый туберкулез легких представляет... .
65. Рентгенологическая картина, характерная для бронхолобулярного инфильтрата
66. Рентгенологическая картина при казеозной пневмонии... .
67. Развитию инфильтратов наиболее часто предшествует... .
68. Наиболее частым исходом неосложненного первичного туберкулезного комплекса является

ОҢТҮСТІК-ҚАЗАҚСТАН MEDISINA АКАДЕМИЯСЫ «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ	 SKMA —1979—	SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Кафедра фтизиопульмонологии и радиологии	70/11	
Вопросы программы РК-1		4стр. из 7

69. К эпидемиологическим показателям туберкулезной инфекции среди населения не относятся
70. Миллиарный туберкулез необходимо дифференцировать с.... .
71. Длительность продромального периода при туберкулезном менингите.... .
72. Одышка, "лающий" приступообразный кашель характерны для.... .
73. Диссеминированный туберкулез легких может осложниться.... .
74. Основными симптомами острого диссеминированного туберкулеза легких являются.... .
75. При туберкулезе внутригрудных лимфоузлов причиной бацилловыделения является.... .
76. Типичная локализация легочного аффекта при первичном туберкулезном комплексе.... .
77. Тоны сердца при хронической туберкулезной интоксикации.... .
78. Медработник отвечает за то, чтобы образцы мокроты были отправлены в лабораторию не позднее.... .
79. Течение регрессирующей туберкуломы легких, это -.... .
80. Характерная бронхографическая картина при туберкуломе легких.... .
81. Прикорневой инфильтрат- это
82. Для течения прогрессирующей туберкуломы характерны.... .
83. Интенсивное затемнение, связанное дорожкой с расширенным корнем,рентгенологически характерно для.... .
84. Для микробиологического обнаружения МТ патологическим материалом не является
85. Основным видовым признаком микобактерий туберкулеза является.... .
86. К биохимической характеристике микобактерий туберкулеза относятся:
87. МБТ в кальцинатах сохраняются в виде.... .
88. К клиническим формам туберкулеза первичного генеза не относится.... .
89. У больных с прогрессирующим очаговым туберкулезом легких над зоной поражения чаще выслушивают
90. Активность очагового туберкулеза подтверждает
91. Выделяют следующие формы очагового туберкулеза
92. Причина появления мелкопузырчатых влажных хрипов при очаговом туберкулезе
93. Наиболее вероятный исход при адекватном лечении больного свежим очаговым туберкулезом
94. Инфильтративному туберкулезу легких непосредственно предшествует
95. При инфильтративном туберкулезе в зоне поражения... .
96. Одним из клинико-рентгенологических вариантов туберкулезного инфильтрата является
97. Поражение туберкулезным воспалением расположенных рядом 2-3 долек отмечают присформированном
98. Поражение туберкулезным воспалением доли легкого соответствует
99. При инфильтративном туберкулезе выраженность клинических признаков определяется
100. У больных инфильтративным поражением легких кашель с окротой обычно появляется в случае
101. Массивно выделение МБТ обнаруживают при развитии в легком
102. Неблагоприятным исходом инфильтративного туберкулеза легких является
103. Результаты эффективного лечения облаковидного инфильтрата более часто являются
104. Морфологическая основа казеозной пневмонии
105. Клинико-рентгенологические формы казеозной пневмонии являются
106. Особенностью казеозной пневмонии являются
107. Ведущий патогенетический фактор развития казеозной пневмонии
108. Характер туберкулиновой чувствительности у больных казеозной пневмонией
109. К основным группам внутригрудных лимфатических узлов по Сукинникову не относятся... .

ОҢТҮСТІК-ҚАЗАҚСТАН MEDISINA АКАДЕМИЯСЫ «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Кафедра фтизиопульмонологии и радиологии		70/11
Вопросы программы РК-1		5стр. из 7

- 110 ... не является Клиническим симптомом инфильтративного бронхаденита .
111. Прогрессирование легочного компонента первичного туберкулезного комплекса приводит к .
-
- 112..Группа лимфоузлов,которая наименее подвержена поражению у больных первичным туберкулезом. . .
- 113.Очаг Гона - это . . .
114. При первичном туберкулезе превалирует... фаза воспаления.
115. Очаг Симона- это . . .
116. К осложнениям туберкулеза внутригрудных лимфатических узлов не относится. . . .
117. При прогрессирующем течении первичного туберкулезного комплекса осложнением может быть.
118. При защите организма человека от туберкулезной инфекции преобладают.... .
119. Основным типом аллергической реакции при туберкулезе является. . . .
120. Не характерный признак для туберкулезного менингита- это
121. В патогенезе очагового туберкулеза легких не бывает... .
122. К основным методам диагностики туберкулемы легких не относятся
123. Туберкулема легких характеризуется
124. Развитию туберкулемы легких наиболее часто предшествует
125. На каждого впервые выявленного бациллярного больного заполняется экстренное извещение
126. «Штампованные» каверны в легких характерны для
127. Эпителиоидные клетки в туберкулезной гранулеме являются производными.... .
128. Нехарактерными рентгенологическими синдромами для подострого диссеминированного туберкулеза легких являются
129. Нехарактерные признаки острого диссеминированного туберкулеза легких:
130. Начальным проявлением милиарного туберкулеза легких не является
131. При остром диссеминированном туберкулезе легких характерные рентгенологические изменения обнаруживаются.... .
132. Наиболее частой внелегочной локализацией специфических изменений при подостром диссеминированном туберкулезе является.... .
133. Синдром легочной диссеминации не имеет место при.... .
134. Для базиллярной формы туберкулезного менингита характерны... .
135. Для туберкулезного менингита характерный цитоз... .
136. Для диагностики туберкулезного менингита не имеет значения... .
137. Содержание сахара в ликворе у больных туберкулезным менингитом.... .
138. Для базиллярной формы туберкулезного менингита не характерно:.... .
139. Содержание белка в ликворе у больных туберкулезным менингитом... .
140. Штампованные каверны в легких образуются при:
141. Характерным рентгенологическим признаками острого диссеминированного туберкулеза легких является все нижеперечисленные, кроме
142. Для подострого диссеминированного туберкулеза легких характерно все, кроме
143. В дифференциальной диагностике диссеминированных процессов в легких наиболее информативным методом исследования является:
144. При подозрении на туберкулезный менингит лечение надо начинать:
145. Осложнениями инфильтративного туберкулеза легких являются:
- 146.Основным опасным для людей МБТ являются
- 147.Один нелеченный заразный больной туберкулезом за год обычно инфицирует примерно человек.
- 148.На вероятность заболевание туберкулезом практически не влияет
- 149.Туберкулезом чаще болеют
- 150.Туберкулез чаще встречается среди работников

ОҢТҮСТИК-ҚАЗАҚСТАН MEDISINA АКАДЕМИЯСЫ «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Кафедра фтизиопульмонологии и радиологии		70/11
Вопросы программы РК-1		бстр. из 7

151. Туберкулез чаще развивается на фоне ...
152. При ежегодной оценки эпидемиологической ситуации определяют общее число больных активным туберкулезом на 100 тыс. населения. Эти данные определяет показатель ...
153. При ежегодной оценке эпидемиологической ситуации определяют число впервые выявленных больных туберкулезом на 100 тыс. населения. Эти данные определяет показатель ...
154. Общий резервуар туберкулезной инфекции среди людей позволяет оценить показатель ...
155. Распространение туберкулезной инфекции среди людей отражает показатель ...
156. При прочих равных условиях вероятность заболеть туберкулезом особенно велика, если контакт с больным туберкулезом ...
157. Среди социально неблагополучных граждан особенно часто заболевают туберкулезом ...
158. Опасным для человека источником МБТ являются больные туберкулезом ...
159. Главной причиной заболевания туберкулезом человека является ...
160. Атипичные микобактерии могут вызывать у человека ...
161. Микобактерии туберкулеза персистируют в организме ...
162. Метод окрашивания по Цилю-Нильсену основан на свойстве МБТ ...
163. Корд-фактор МБТ является ...
164. Антигенные свойства МБТ обеспечивают ...
165. Оптимальная температура для активного размножения МБТ ...
166. Основной путь заражения туберкулезом человека ...
167. Строение туберкулезной гранулемы (буторка) – это ...
168. Основной путь элиминации МБТ при клеточном иммунитете - ...
169. Наиболее характерные клетки для туберкулезной гранулемы ...
170. Взаимодействие между Т-лимфоцитами и макрофагами осуществляется ...
171. В развитии туберкулезной инфекции у человека принято выделять следующие периоды: ...
172. При незавершенном фагоцитозе МБТ - ...
173. Первичная облигатная бактериемия характерна для этапа ...
174. Иммунитет при туберкулезе в основном ...
175. Гиперчувствительность замедленного типа к МБТ обусловлена ...
176. Появление и накопление в крови противотуберкулезных антител ...
177. Первичный туберкулез – заболевание, которое возникает ...
178. Формы первичного туберкулеза ...
179. Первичный туберкулезный комплекс характеризуется ...
180. При первичном туберкулезе парапсифические реакции нередко проявляются ...
181. Рентгенологический синдром «биополярности» или «гантели» характерен для ...
182. Инфильтративная форма туберкулезного бронхаденита рентгенологически проявляется в виде ...
183. Туморозную форму туберкулеза внутригрудных лимфатических узлов определяют в случае ...
184. У больных с неосложненным течением первичного туберкулеза чувствительность к туберкулину чаще ...
185. ... наиболее частое осложнение при туберкулезе внутригрудных лимфатических узлов у детей.
186. Наиболее частая локализация легочного компонента первичного туберкулезного комплекса ...
187. В патогенезе развития диссеминированного туберкулеза особое значение имеет ...
188. Основной путь распространения МБТ при диссеминированном туберкулезе ..

ОҢТҮСТИК-ҚАЗАҚСТАН MEDISINA АКАДЕМИЯСЫ «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Кафедра фтизиопульмонологии и радиологии	70/11	
Вопросы программы РК-1		7стр. из 7

189. Диссеминированный туберкулез представляет наибольшую опасность при поражении ...
190. Типичный морфологический признак очагов диссеминации при милиарном туберкулезе ...
191. Рентгенологическая картина при подостром варианте диссеминированного туберкулеза легких ...
192. Рентгенологические признаки хронического варианта диссеминированного туберкулеза легких ...
193. Обнаружение на рентгенограмме в обоих легких множественных однотипных очаговых теней малой интенсивности размером до 2 мм в сочетании с обеднением легочного рисунка и размытостью тени корней легких подтверждает диагноз - ...
194. Полиморфизм очагов при хроническом диссеминированном туберкулезе обусловлен ...
195. Больных диссеминированным туберкулезом легких чаще беспокоят ...
196. Под очаговой тенью понимают затемнение размером ...
197. Отличительным морфологическим признаком очагового туберкулеза является ...
198. Очаг Абрикосова – это ...
199. Свежий очаговый туберкулез чаще обнаруживают при обследовании лиц ...
200. Наиболее информативным методом выявления очагового туберкулеза является ...