

ONTÜSTİK-QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		 SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская акад
Жұқпалы аурулар және дерматовенерология кафедрасы		
Пәннің білімі, білімділігі және біліктілігін бағалауға арналған 2 – аралық бақылау		044 -49/19 8 беттің 1 беті

БАҚЫЛАУ ӨЛШЕУ ҚҰРАЛДАРЫ

2 аралық бақылауға арналған тестілік тапсырмалар

- БББ атауы **Жалпы медицина**
- Пәннің коды **BZhA 4307**
- Пәннің атауы **Балалар жұқпалы аурулары**
- Оқу сағаттарының саны/кредиттер **120/4**
- Оқу курсы – **4** семестрі - **8**

Құрастырушы:

1. Әуезханов С.П. ассистент

Хаттама № 11 « 30 » 06 2023 ж.

Кафедра меңгерушісі, м.ғ.к., профессор



Абуова Г.Н.

ONTÜSTİK-QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		 SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская акад
Жұқпалы аурулар және дерматовенерология кафедрасы		
Пәннің білімі, білімділігі және біліктілігін бағалауға арналған 2 – аралық бақылау		044 -49/19 8 беттің 1 беті

**«Жалпы медицина» мамандығы бойынша
«Балалар жұқпалы аурулары»
пәнінен II-аралық бақылау**

<question>Жазылатын беттегі ұсақ дақты-папулезді бөртпе қай жұқпалы ауруға тән

<variant>қызамық

<variant>іш сүзегі

<variant>жәншау

<variant>желшешек

<variant>Менингококкцемия

<question>Желшешекке тән бөртпенің түрін анықтаңыз:

<variant>везикулезді

<variant>дақты-папулезді

<variant>устулезді

<variant>уртикарлы

<variant>ұсақ нүктелі

<question>Жайылмалы лимфоаденопатия қандай ауруға тән екенін анықтаңыз:

<variant>АИВ-инфекциясына

<variant>трихинеллезге

<variant>тұмауға

<variant>эпидемиялық паротитке

<variant>іш сүзегіне

<question>Менингококкцемия емінде таңдау препараты ретінде старттық антибиотикті таңда:

<variant>левомицетин

<variant>гентомицин

<variant>цефтриаксон

<variant>стрептомицин

<variant>пеницилин

<question>Менингококкты менингит кезінде ликворда болатын негізгі лабораторлық белгі:

<variant>нейтрофильді цитоз

<variant>лимфоцитарлы цитоз

<variant>қалыпты цитоз

<variant>фибринді жабындының пайда болуы

<variant>пневмококктардың болуы

<question>Паротитті инфекция кезінде сілекей бездерінің зақымдануына тән клиникалық симптомдарда қатені табыңыз:

<variant>аймақтық лимфаденит

<variant>сілекей бездерінің ісінуі

<variant>пальпация кезіндегі ауырсыну

<variant>жергілікті температура мен гиперемияның болмауы

<variant>қамыр консистенциясы

ONTÜSTİK-QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		 SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская акад
Жұқпалы аурулар және дерматовенерология кафедрасы		
Пәннің білімі, білімділігі және біліктілігін бағалауға арналған 2 – аралық бақылау		044 -49/19 8 беттің 1 беті

<question>Көкжөтел өршу кезеңіне тән клиникалық симптомдарда қатені табыңыз:

<variant>қанмен қақыру

<variant>құрысулық жөтел пароксизмдері

<variant>ұстама соңында құсу

<variant>жөтел пароксизмдері арасындағы реприздер

<variant>қалыпты дене температурасы

<question>Қызылшамен ауырған балаларды оқшаулау мерзімін таңдаңыз:

<variant>Бөртпе басталғаннан 5 күн

<variant>1-4 күн

<variant>7-10 күн

<variant>15-21 күн

<variant>10-15 күн

<question>Қызылшада тірек-диагностикалық критерийлерінде қатені табыңыз

<variant>терінің пластиналы қабыршақтануы

<variant>аурудың циклдік ағымы

<variant>пигментация

<variant>Бельский-Филатов-Копликдақтары

<variant>бөртпенің кезеңділігі және дақты-папулезді бөртпе

<question>Скарлатинаға тән симптомдардың триадасын таңдаңыз :

<variant>интоксикация, ангина, бөртпе

<variant>гепатомегалия, диарея, бөртпе

<variant>лимфаденопатия, ангина, бөртпе

<variant>интоксикация, метеоризм, бөртпе

<variant>тамақтың ауыруы, ангина, улану

<question>АИТВ-инфекциясы кезінде ең тиімді терапияны таңдаңыз:

<variant>екі вирусқа қарсы препараттар

<variant>бір вирусқа қарсы препарат

<variant>үш вирусқа қарсы препараттар

<variant>төрт вирусқа қарсы препараттар

<variant>бес вирусқа қарсы препараттар

<question>Менингококкемияға тән негізгі клиникалық белгіні көрсетіңіз:

<variant>аурудың 1-ші тәулігінде геморрагиялық бөртпенің пайда болуы

<variant>орташа қызба

<variant>айқын интоксикация

<variant>аурудың 1-ші аптасының соңында геморрагиялық бөртпенің пайда болуы

<variant>оң менингеальды симптомдар

<question>Инфекциялық мононуклеозға тән симптомдарды (клин.хаттама сәйкес):

<variant>тамақтың ауыруы, температураның жоғарылауы (2-4 аптаға дейін, кейде

одан да көп), лимфа түйіндерінің ұлғаюы, мұрынмен тыныс алудың қиындауы, буындардың, бұлшықеттердің ауыруы, бөртпе (ампициллинді қабылдағаннан кейін жиі)

<variant>тамақтың ауыруы, температураның жоғарылауы, лимфа түйіндерінің ұлғаюы, мұрынмен тыныс алудың қиындауы, буындардың, бұлшықеттердің ауыруы, бөртпе (кезең-кезеңмен)

ONTÜSTİK-QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская акад
Жұқпалы аурулар және дерматовенерология кафедрасы		
Пәннің білімі, білімділігі және біліктілігін бағалауға арналған 2 – аралық бақылау	044 -49/19 8 беттің 1 беті	

<variant>тамақтың ауыруы, температураның жоғарылауы, лимфа түйіндерінің ұлғаюы, мұрынмен тыныс алудың қиындауы, буындардың, бұлшықеттердің ауыруы, бөртпе (петехиальды)

<variant>тамақтың ауыруы, температураның жоғарылауы, лимфа түйіндерінің ұлғаюы, мұрын, буындардың, бұлшықеттердің ауыруы, қышуы бар бөртпе

<variant>тамақтың ауыруы, температураның жоғарылауы, лимфа түйіндерінің ұлғаюы, мұрыннан тыныс алудың қиындауы, буындарда, бұлшық еттердің ауыруы мен ісінуі, бөртпе везикулезді

<question>Инфекциялық мононуклеозға арналған типтік белгілерде қатені табыңыз (клин.хаттама сәйкес).

<variant>бөртпе «капюшона» типті

<variant>қызба

<variant>лимфа түйіндерінің ұлғаюы (симметриялы), көбінесе алдыңғы жәннемесе артқы ("бұқа мойынының" симптомы), қолтық асты және шап

<variant>баспа

<variant>гепатоспленомегалия

<question>Инфекциялық мононуклеозды емдеу үшін этиотропты препаратты таңдаңыз (клин.хаттама сәйкес):

<variant>ацикловир

<variant>тамифлю

<variant>рибавирин

<variant>ремантадин

<variant>анаферон

<question>Эпидемиялық паротиттің құбылыстарындағы қатені табыңыз: (клин.хаттамаға сәйкес):

<variant>тума пайда болған жүрек ақауы

<variant>аталық без атрофиясы

<variant>белсіздік

<variant>қант диабет

<variant>керендік

<question>Тірі вакцина паротитті инфекцияның алдын алу үшін жас бойынша көрсеткіштерін таңдаңыз (клин. хаттамаға сәйкес):

<variant>12 ай

<variant>9 ай

<variant>12 ай

<variant>18 ай

<variant>6 жыл

<question>Жіті бруцеллез кезінде аллергиялық типтегі зақымданудың негізгі сипатын анықтау:

<variant>полисерозит

<variant>лимфаденит

<variant>гранулема

<variant>фиброзит

<variant>гепатоспленомегалия

ONTÜSTİK-QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		 SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская акад
Жұқпалы аурулар және дерматовенерология кафедрасы		
Пәннің білімі, білімділігі және біліктілігін бағалауға арналған 2 – аралық бақылау		044 -49/19 8 беттің 1 беті

<question>Қатесін табыңыз: жедел бруцеллез клиникасына тән:

<variant>Радикулит

<variant>Қызба

<variant>Тершендік

<variant>Полиаденопатия

<variant>Гепатоспленомегалия

<question>Қатені табыңыз: бруцеллез кезінде қолданылатын серологиялық зерттеулер:

<variant>реакция латекс-агглютинация

<variant>РСК

<variant>реакция агглютинация Райта, Хеддельсон

<variant>РНГА

<variant>РИФ

<question>АИТВ-антиденелеріне оң сынағы бар 18 айлық балада тамақтанудың ауыр бұзылуы жағдайында ауыр пневмония, ауыз қуысының кандидозы. CD4 деңгейі 22%. Осы науқасқа емдеуді таңдаңыз:

<variant>АРТ-терапия

<variant>антибиотикотерапия

<variant>плазмферез

<variant>гормональды терапия

<variant>базисты терапия