

ОҢТҮСТІК-ҚАЗАҚСТАН MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Кафедра «Морфологические дисциплины» Контрольно - измерительные средства по дисциплине «Физиологии»		81-11-2025 Стр. 1 из 31

**Министерство здравоохранения Республики Казахстан
АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
медицинский колледж при академии**

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА

Дисциплины/модули: ОПД 4 «Анатомия, физиология»

Специальность: 09110100- «Стоматология»

Квалификация: 4S09110102 - «Дантист»

Курс: 1 курс

Семестр: I семестр

Форма контроля: экзамен

Общая трудоемкость всего часов/кредитов – 240 часов/10 кредитов

Самостоятельная работа студента: 36

Самостоятельная работа студента с педагогом: 12

Аудиторные – 84

Симуляция –104

Шымкент – 2025 г.

ОҢТҮСТІК-ҚАЗАҚСТАН MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Кафедра «Морфологические дисциплины» Контрольно - измерительные средства по дисциплине «Физиологии»		81-11-2025 Стр. 2 из 31

Контрольно-измерительные средства по дисциплине «Физиология» составлен преподавател кафедры морфологические дисциплины: Малик М.Г.

На основании рабочего учебного плана по специальности: 09120100- «Стоматология»,
Квалификация: 4S09110102 - «Дантист»

Рассмотрен и рекомендован на заседании кафедры "Морфологические дисциплины"
протокол № _____ от « ____ » _____ 2025 г.

Заведующая кафедры _____ Ералхан А.Қ.

ОҢТҮСТІК-ҚАЗАҚСТАН MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Кафедра «Морфологические дисциплины» Контрольно - измерительные средства по дисциплине «Физиологии»		81-11-2025 Стр. 3 из 31

**Тестовые задания для итогового контроля знаний по дисциплине
«Физиология», Специальность : 09110100- «Стоматология»**

Квалификация: 4S09110102 - «Дантист»

216 тестов

<question> Основная структура, обеспечивающая чувствительность зуба:

<variant>пульпа

<variant>периодонт

<variant>эмаль

<variant>дентин

<variant>цемент

<question> Физиологический механизм чувствительности дентина:

<variant>движение жидкости в дентинных каналах

<variant>нагрев эмали

<variant>расширение кровеносных сосудов

<variant>прямое раздражение зубного нерва

<variant>сжатие цемента

<question> Амортизационная система, защищающая зуб при жевании:

<variant>пародонтальная связка

<variant>корень зуба

<variant>эмалевая оболочка

<variant>пульпа

<variant>цемент

<question> Одна из основных физиологических функций зубной пульпы:

<variant>питание и иннервация

<variant>выделение слюны

<variant>образование эмали

<variant>усиление жевательного давления

<variant>разрушение дентина

<question> Физиологическая роль пародонтальной связки:

<variant>крепление зуба к челюсти и амортизация

<variant>определение цвета зуба

<variant>увеличение объема пульпы

<variant>усиление слюнообразования

<variant>смягчение дентина

<question> Рост твердых тканей зуба в основном продолжается до ... лет:

<variant>12–15 лет

<variant>20–25 лет

<variant>1–2 лет

<variant>5–6 лет

<variant>30–35 лет

<question> Мышца, обеспечивающая вертикальное движение зубов при жевании:

<variant>поднимающая нижнюю челюсть

<variant>круговая мышца глаза

<variant>височная мышца

<variant>опускающая нижнюю челюсть

<variant>мышца носа

<question> Одна из физиологических функций дентина:

ОҢТҮСТІК-ҚАЗАҚСТАН MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Кафедра «Морфологические дисциплины» Контрольно - измерительные средства по дисциплине «Физиологии»		81-11-2025 Стр. 4 из 31

<variant>обеспечение основной опорной прочности зуба

<variant>формирование цвета зуба

<variant>проведение нервных импульсов

<variant>выделение слюны

<variant>формирование эмали

<question> Наиболее чувствительная к раздражителям область зуба:

<variant>дентин

<variant>цемент

<variant>эмаль

<variant>пульпа

<variant>периост

<question> Основная физиологическая роль корневого канала:

<variant>обеспечивает поступление крови и нервов в пульпу

<variant>образует эмаль

<variant>укрепляет кость

<variant>увеличивает жевательное давление

<variant>растягивает периодонт

<question> Движение крови в сосудистой системе обеспечивают ...

<variant>энергия сокращения желудочков сердца, градиент давления между проксимальным и дистальным отделами сосудистой системы

<variant>разность давления крови между предсердиями и желудочками

<variant>растяжимость и эластичность стенки сосудов

<variant>сосудистое сопротивление, энергия сокращения сердца

<variant>артерио-венозная разница парциального давления кислорода

<question> Наибольшая линейная скорость кровотока наблюдается в ...

<variant>аорте

<variant>венах

<variant>капиллярах

<variant>артериолах

<variant>артериях

<question> Самое низкое давление крови в ...

<variant>венах

<variant>венулах

<variant>артериолах

<variant>капиллярах

<variant>артериях

<question> Капиллярный кровоток характеризуется показателями - давление крови, скорость движения:

<variant>20-15 мм рт.ст. 0,3-0,5 мм/сек.

<variant>130-120 мм рт.ст. 0,5-1 м/сек.

<variant>100-8- мм рт.ст. 0,2-0,2 м/сек.

<variant>80-60 мм рт.ст. 0,15-0,2 м/сек.

<variant>40-30 мм рт.ст. 10-5 см/сек.

<question> Сужение сосудов вызывает раздражение нервных волокон ...

<variant>симпатических и адренэргических

<variant>симпатических и холинэргических

<variant>парасимпатических и холинэргических

<variant>парасимпатических и серотонэргических

ОҢТҮСТІК-ҚАЗАҚСТАН MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Кафедра «Морфологические дисциплины» Контрольно - измерительные средства по дисциплине «Физиологии»		81-11-2025 Стр. 5 из 31

<variant>соматических и холинэргических

<question>На величину артериального давления оказывают влияния:

<variant>ударный объем, частота сокращения сердца, сопротивление сосудов.

<variant>ударный объем, капиллярный кровоток, давление в полых венах.

<variant>частота сокращений сердца, линейная скорость кровотока парциальное давление кислорода.

<variant>сопротивление сосудов, клапанный аппарат сердца, онкотическое давление.

<variant>онкотическое давление, отрицательное давление в плевральной полости, сокращение скелетных мышц.

<question>Кровяное давление снижается по мере продвижения крови по сосудам из-за ...

.

<variant>сопротивления сосудов

<variant>эластичности сосудов

<variant>повышения вязкости крови

<variant>отрицательного давления в плевральной полости

<variant>осмотического давления крови

<question>Основная функция капилляров в организме ...

<variant>обменная

<variant>емкостная

<variant>шунтирующая

<variant>проводниковая

<variant>депонирующая

<question>Наибольшее количество крови получают ...

<variant>почки, сердце, печень, головной мозг

<variant>кожа, селезенка, брюшные органы, скелетные мышцы

<variant>почки, скелетные мышцы, головной мозг

<variant>сердце, печень, брюшные органы, легкие

<variant>легкие, головной мозг, кожа, гладкие мышцы

<question>Наименьшая линейная скорость кровотока наблюдается в ...

<variant>капиллярах

<variant>венулах

<variant>аорте

<variant>венах

<variant>артериях

<question>Высокое кровяное давление имеется в капиллярах ...

<variant>почек

<variant>мозга

<variant>легких

<variant>печени

<variant>кожи

<question>Функции вен ...

<variant>транспортная, емкостная

<variant>трофическая, выделительная

<variant>дыхательная, обменная

<variant>выделительная, транспортная

<variant>депонирующая, дыхательная

<question>Флебограмма - это метод графической регистрации ...

<variant>пульсовых колебаний вен

ОҢТҮСТІК-ҚАЗАҚСТАН MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Кафедра «Морфологические дисциплины» Контрольно - измерительные средства по дисциплине «Физиологии»		81-11-2025 Стр. 6 из 31

- <variant>пульсовых колебания артерий
- <variant>биопотенциалов сердца
- <variant>дыхательных движений грудной клетки
- <variant>кривой кровяного давления
- <question>Для определения кровяного давления используют метод
- <variant>Короткова-Рива-Роччи
- <variant>реокардиографии
- <variant>капилляроскопии
- <variant>плетизмографии
- <variant>фонокардиографии
- <question>Расширение сосудов и уменьшение АД возникает при
- <variant>понижении тонуса симпатической нервной системы
- <variant>повышении тонуса сосудодвигательного центра
- <variant>повышении тонуса симпатической нервной системы
- <variant>повышении тонуса дыхательного центра
- <variant>повышении тонуса соматической нервной системы
- <question>Основное сопротивление току крови создают
- <variant>артериолы
- <variant>артерии
- <variant>вены
- <variant>капилляры
- <variant>венулы
- <question>Кровоток по сосудам во время диастолы сердца обеспечивает
- <variant>эластическое напряжение артерий
- <variant>клапанный аппарат сердца
- <variant>работа сердца
- <variant>вязкость крови
- <variant>отрицательное давление в плевральной полости
- <question>Систолическое давление - это
- <variant>максимальное давление в артериях во время систолы желудочков
- <variant>разность давлений между аортой и венами
- <variant>минимальное давление в сосудах во время диастолы
- <variant>разность давлений в аорте и капиллярах
- <variant>давление в момент захлопывания полулунных клапанов
- <question>Непрерывный ток крови по всей сосудистой системе обусловлен
- <variant>разностью давлений между аортой и полыми венами
- <variant>разностью кровяного давления между артериолами и венулами
- <variant>отрицательным давлением в плевральной полости
- <variant>присасывающей способностью грудной клетки
- <variant>сокращением скелетной мускулатуры
- <question>Скорость распространения пульсовой волны зависит от
- <variant>возраста и эластичности сосудов
- <variant>линейной скорости кровотока и вязкости
- <variant>объемной скорости кровотока и температуры крови
- <variant>сопротивления сосудов и минутного объема крови
- <variant>частоты сокращений и ударного объема крови
- <question>Основной движущей силой лимфотока является
- <variant>собственная сократительная активность лимфатических сосудов и узлов

ОҢТҮСТІК-ҚАЗАҚСТАН MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Кафедра «Морфологические дисциплины»		
Контрольно - измерительные средства по дисциплине «Физиологии»		81-11-2025 Стр. 7 из 31

- <variant>работа сердца
- <variant>разность аортального и венозного давлений
- <variant>сокращение скелетной мускулатуры
- <variant>разность осмотического давления
- <question>Вазоконстрикторный эффект оказывают нервы
- <variant>симпатические
- <variant>блуждающие
- <variant>диафрагмальные
- <variant>парасимпатические
- <variant>соматические
- <question>Основная функция лимфатической системы
- <variant>дренажная
- <variant>обменная
- <variant>емкостная
- <variant>гуморальная
- <variant>депонирующая
- <question>Разность между систолическим и диастолическим артериальным давлением называется ...
- <variant>пульсовым
- <variant>средним
- <variant>нижним
- <variant>минимальным
- <variant>боковым
- <question>Информация об изменениях уровня кровяного давления в аорте поступает в ЦНС по ... нерву.
- <variant>депрессорному
- <variant>симпатическому
- <variant>языкоглоточному
- <variant>синокаротидному
- <variant>диафрагмальному
- <question>При введении гистамина величина кровяного давления
- <variant>понижится
- <variant>не изменится
- <variant>повысится
- <variant>повысится, затем упадет
- <variant>резко повысится
- <question>Сокращение скелетных мышц
- <variant>способствует движению крови по венам
- <variant>затрудняет движение крови по венам
- <variant>не оказывает влияние на движение крови по венам
- <variant>способствует обратному току крови
- <variant>оказывает сопротивление движению крови по венам
- <question>Реограмма позволяет оценить
- <variant>кровенаполнение и тонус сосудов
- <variant>кровенаполнение и систолическое давление
- <variant>кровенаполнение и диастолическое давление
- <variant>кровенаполнение и пульсовое давление
- <variant>кровенаполнение и среднее давление

ОҢТҮСТІК-ҚАЗАҚСТАН MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Кафедра «Морфологические дисциплины» Контрольно - измерительные средства по дисциплине «Физиологии»		81-11-2025 Стр. 8 из 31

<question>При физической работе у здорового человека происходит ...

- <variant>учащение пульса, повышение КД
- <variant>учащение пульса, понижение КД
- <variant>урежение пульса, повышение КД
- <variant>урежение пульса, понижение КД
- <variant>частота пульса и КД не меняются

<question>Резистивные сосуды, создающие общее сопротивление, это ...

- <variant>артериолы и венулы
- <variant>аорта и артерии
- <variant>артерии и капилляры
- <variant>вены и венулы
- <variant>вены и артериолы

<question>Кровяное давление при увеличении секреции ренина ...

- <variant>увеличится
- <variant>не изменится
- <variant>уменьшится
- <variant>резко упадет
- <variant>изменится фазно

<question>Кровяное давление при увеличении венозного притока к сердцу ...

- <variant>увеличится
- <variant>не изменится
- <variant>уменьшится
- <variant>изменится фазно
- <variant>упадет до нуля

<question>Если тонус сосудодвигательного центра снизится, то просвет кровеносных сосудов ...

- <variant>увеличится
- <variant>уменьшится
- <variant>не изменится
- <variant>увеличится, затем уменьшится
- <variant>уменьшится, затем увеличится

<question>При учащении работы сердца кровяное давление ...

- <variant>увеличится
- <variant>уменьшится
- <variant>не изменится
- <variant>изменится фазно
- <variant>резко упадет

<question>Просвет сосудов при местном действии на них метаболитов, кининов, инозина ...

- <variant>увеличится
- <variant>не изменится
- <variant>уменьшится
- <variant>изменится фазно
- <variant>резко сузится

<question>Величина кровяного давления зависит от ...

- <variant>сердечного выброса и общего сопротивления сосудов
- <variant>сердечного выброса и онкотического давления
- <variant>общего сопротивления сосудов и содержания плазмы

QAZAQSTAN MEDICINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Кафедра «Морфологические дисциплины» Контрольно - измерительные средства по дисциплине «Физиологии»		81-11-2025 Стр. 9 из 31

<variant>количества циркулирующей крови и осмотического давления

<variant>периферического сопротивления и содержания кислорода в крови

<question>В кровяных депо в состоянии покоя находится крови ...

<variant>40-50%

<variant>10-20%

<variant>30-35%

<variant>55-60%

<variant>70-80%

<question>Сосудодвигательный центр включает ... отделы.

<variant>прессорный и депрессорный

<variant>пневмотаксический и прессорный

<variant>тканевой и депрессорный

<variant>метаболический и прессорный

<variant>рефлекторный и депрессорный

<question>Часть лимфатического сосуда между двумя клапанами называется

<variant>лимфангион

<variant>сегмент

<variant>миоцит

<variant>нейрон

<variant>ацинус

<question>Первый вдох ребенка обусловлен возбуждением дыхательного центра в результате ...

<variant>накопления в крови CO₂ и недостатка кислорода

<variant>накопления в крови углекислого газа и азота

<variant>тактильного и температурного раздражения кожи

<variant>раздражения интерорецепторов и проприорецепторов мышц

<variant>раздражения рецепторов париетальной и висцеральной плевры

<question>Центральные дыхательные хеморецепторы расположены в ...

<variant>продолговатом мозге

<variant>продолговатом мозге, среднем мозге

<variant>мозжечке, коре больших полушарий

<variant>красном ядре, черной субстанции среднего мозга

<variant>полосатом теле, зубчатом ядре

<question>Кислородная емкость крови в покое равна ...

<variant>19 об%

<variant>17 об%

<variant>16 об%

<variant>15 об%

<variant>20 об%

<question>Общая емкость легких включает ...

<variant>жизненную емкость легких, остаточный объем

<variant>емкость вдоха, резервный объем выдоха

<variant>дыхательный и остаточный объемы

<variant>функциональную остаточную емкость, резервный объем вдоха

<variant>жизненную емкость легких, дыхательный объем

<question>При нарушении целостности грудной клетки легкие ...

<variant>спадаются и не участвуют в дыхании

<variant>растягиваются во время вдоха

ОҢТҮСТІК-ҚАЗАҚСТАН MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Кафедра «Морфологические дисциплины» Контрольно - измерительные средства по дисциплине «Физиологии»		81-11-2025 Стр. 10 из 31

- <variant>спадаются во время выдоха
- <variant>следуют за грудной клеткой
- <variant>растягиваются во время выдоха
- <question>Резервный объем выдоха равен ...
- <variant>1500 мл
- <variant>500 мл
- <variant>900 мл
- <variant>2000 мл
- <variant>2500 мл
- <question>Головокружение и потеря сознания возникает при учащённом дыхании, причина
- ...
- <variant>Гипокапния и вазоспазм
- <variant>Гиперкапния и вазодилатация
- <variant>Тахикардия и гипокапния
- <variant>Тахикардия и вазоспазм
- <variant>Гиперкапния и вазоспазм
- <question>Пневмоторакс – это ...
- <variant>давление в плевральной полости равно атмосферному
- <variant>отрицательное давление в плевральной полости
- <variant>положительное давление в плевральной полости
- <variant>увеличение CO₂ в плевральной полости
- <variant>попадание крови в плевральную полость
- <question>Пневмография - это метод регистрации
- <variant>дыхательных движений грудной клетки
- <variant>экскурсии легких
- <variant>дыхательных объемов
- <variant>движения диафрагмы
- <variant>сокращения межреберных мышц
- <question>Объем легких при вдохе ...
- <variant>пассивно увеличивается
- <variant>активно увеличивается
- <variant>остается без изменения
- <variant>активно уменьшается
- <variant>пассивно уменьшается
- <question>Емкость вдоха включает ...
- <variant>резервный объем вдоха и дыхательный объем
- <variant>дыхательный объем и резервный объем выдоха
- <variant>резервный объем выдоха и остаточный объем
- <variant>функциональную остаточную емкость и дыхательный объем
- <variant>остаточный объем и жизненную емкость легких
- <question>Потребление кислорода в покое за минуту составляет
- <variant>250- 350 мл
- <variant>100- 200 мл
- <variant>400- 500 мл
- <variant>600- 800 мл
- <variant>850- 950 мл
- <question>Дыхательный объем - это количество воздуха
- <variant>вдыхаемое и выдыхаемое в покое

ОҢТҮСТІК-ҚАЗАҚСТАН MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Кафедра «Морфологические дисциплины» Контрольно - измерительные средства по дисциплине «Физиологии»		81-11-2025 Стр. 11 из 31

- <variant>находящееся в легких после спокойного вдоха
<variant>которое можно вдохнуть при глубоком вдохе
<variant>остающееся в легких после спокойного выдоха
<variant>которое можно выдохнуть при глубоком выдохе
<question>Рассчитайте МОД, если известно, что ЖЕЛ 3900 мл, объем вдоха 1800 мл, объем выдоха 1600 мл, ЧДД 18.
<variant>9000 мл
<variant>8000 мл
<variant>7000 мл
<variant>10000 мл
<variant>17000 мл
<question>Эйпноэ- это дыхание ...
<variant>в состоянии покоя
<variant>учащенное
<variant>редкое
<variant>при мышечной работе
<variant>прерывистое
<question>Функциональная единица легких ...
<variant>ацинус
<variant>доля
<variant>альвеола
<variant>сегмент
<variant>зона
<question>Эффективность вентиляции альвеол выше при ... дыхании.
<variant>глубоком и редком
<variant>глубоком и частом
<variant>поверхностном и редком
<variant>поверхностном и частом
<variant>периодическом
<question>Пневмотахометрия - метод, используемый для определения ...
<variant>силы дыхательной мускулатуры
<variant>дыхательных объемов
<variant>количества газов в крови
<variant>дыхательных движений
<variant>давления в плевральной полости
<question>Количество дыхательных движений в покое ... раз в минуту.
<variant>14-16
<variant>5-10
<variant>20-25
<variant>27-35
<variant>40-50
<question>Специфическим фактором, возбуждающим дыхательный центр, является ...
<variant>углекислый газ
<variant>кислород
<variant>адреналин
<variant>ацетилхолин
<variant>азот
<question>Дыхание прекратится, если осуществлена перерезка ...

ОҢТҮСТІК-ҚАЗАҚСТАН MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Кафедра «Морфологические дисциплины» Контрольно - измерительные средства по дисциплине «Физиологии»		81-11-2025 Стр. 12 из 31

- <variant>под продолговатым мозгом
- <variant>по переднему краю варолиева моста
- <variant>по нижнему краю варолиева моста
- <variant>на уровне поясничного отдела спинного мозга
- <variant>на уровне промежуточного мозга
- <question>Дыхательный центр при спокойном дыхании посылает импульсы к ...
- <variant>межреберным мышцам, диафрагме
- <variant>диафрагме, мышцам живота
- <variant>мышцам плечевого пояса, диафрагме
- <variant>мышцам живота, спины
- <variant>мышцам плечевого пояса и межреберным
- <question>Коэффициентом утилизации кислорода называют ту часть кислорода, которая поглощается ...
- <variant>тканями из артериальной крови
- <variant>эритроцитами из крови
- <variant>буферными системами крови
- <variant>форменными элементами из венозной крови
- <variant>миоглобином из артериальной крови
- <question>Кислород в крови находится в ...
- <variant>растворенном состоянии, в составе оксигемоглобина
- <variant>составе карбгемоглобина, бикарбоната натрия
- <variant>составе оксигемоглобина, карбоксигемоглобина
- <variant>бикарбоната натрия, в растворимом состоянии
- <variant>соединении с гемоглобином
- <question>Перерезка спинного мозга между нижним шейным и первым грудным сегментом выключает ... дыхание.
- <variant>реберное
- <variant>диафрагмальное
- <variant>реберное и диафрагмальное
- <variant>реберное и брюшное
- <variant>брюшное
- <question>Нервный центр, отвечающий за смену вдоха и выдоха располагается в ...
- <variant>варолиевом мосту
- <variant>коре головного мозга
- <variant>гипоталамусе
- <variant>продолговатом мозге
- <variant>спинном мозге
- <question>Мотонейроны, аксоны которых иннервируют дыхательные мышцы, расположены в ...
- <variant>спинном мозге
- <variant>коре головного мозга
- <variant>гипоталамусе
- <variant>варолиевом мосту
- <variant>продолговатом мозге
- <question>Дыхательный центр включает компоненты ...
- <variant>центров вдоха и выдоха, пневмотаксиса
- <variant>механорецепторов, диафрагмы
- <variant>межреберных мышц, пневмотаксиса

ОҢТҮСТІК-ҚАЗАҚСТАН MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Кафедра «Морфологические дисциплины» Контрольно - измерительные средства по дисциплине «Физиологии»		81-11-2025 Стр. 13 из 31

<variant>коркового центра и блуждающих нервов

<variant>центров вдоха и выдоха, мотонейронов спинного мозга

<question>Обмен газов между средой и тканями в дыхательной системе происходит в результате разности ...

<variant>парциальных давлений газов

<variant>температуры

<variant>pH тканей и среды

<variant>содержания оксигемоглобина

<variant>мембранного потенциала

<question>Мужчина при нырянии в воду ударился головой о корягу. При оказании первой медицинской помощи сделали искусственное дыхание, затем подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, но самостоятельное дыхание не восстанавливалось. Какой отдел мозга поврежден ?

<variant>Продолговатый мозг

<variant>Таламус

<variant>Средний мозг

<variant>Гипоталамус

<variant>Мозжечок

<question>К веществам, препятствующим свертыванию крови относится ...

<variant>гепарин

<variant>адреналин

<variant>норадреналин

<variant>кальций

<variant>пепсин

<question>В 1 фазу фибринолиза происходит ...

<variant>образование кровяного активатора плазминогена

<variant>превращение плазминогена в плазмин

<variant>расщепление фибрина

<variant>образование кровяной и тканевой протромбиназы

<variant>превращение фибриногена в фибрин

<question>Послефаза включает в себя ...

<variant>ретракцию сгустка, фибринолиз

<variant>образование белого тромба

<variant>образование кровяной и тканевой протромбиназы

<variant>образование фибрина из фибриногена

<variant>образование протромбина

<question>В плазме крови содержатся белки ...

<variant>альбумины, глобулины, фибриноген

<variant>глобулины, миоглобин, фибрин

<variant>фибриноген, карбгемоглобин, альбумин

<variant>миоглобин, оксигемоглобин, глобулины

<variant>альбумины, метгемоглобин, фибриноген

<question>В норме реакция артериальной крови

<variant>7,40

<variant>7,50

<variant>8,10

<variant>5,40

<variant>6,85

ОҢТҮСТІК-ҚАЗАҚСТАН MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Кафедра «Морфологические дисциплины» Контрольно - измерительные средства по дисциплине «Физиологии»		81-11-2025 Стр. 14 из 31

<question>Биологический гемолиз возникает при

- <variant>переливании несовместимой крови
- <variant>действии кислот, щелочей, эфира
- <variant>действии высокой температуры
- <variant>снижении осмотического давления плазмы
- <variant>действии электрического тока

<question>Химический гемолиз возникает при

- <variant>действии кислот, щелочей, эфира
- <variant>переливании несовместимой крови
- <variant>действии высокой температуры
- <variant>снижении осмотического давления плазмы
- <variant>действии электрического тока

<question>Механический гемолиз возникает при

- <variant>энергичном встряхивании пробирки с кровью
- <variant>переливании несовместимой крови
- <variant>действии высокой температуры
- <variant>снижении осмотического давления плазмы
- <variant>действии электрического тока

<question>К органам кроветворения относятся:

- <variant>красный костный мозг, селезенка, лимфатические узлы.
- <variant>почки, красный костный мозг, селезенка.
- <variant>красный костный мозг, печень, лимфатические узлы.
- <variant>селезенка, почки, печень.
- <variant>красный костный мозг, печень, почки.

<question>Для клеток крови ... фагоцитарная функция является основной.

- <variant>нейтрофилов, моноцитов
- <variant>лимфоцитов, эозинофилов
- <variant>базофилов, В-лимфоцитов
- <variant>Т-лимфоцитов, моноцитов
- <variant>эозинофилов, базофилов

<question>Карбоксигемоглобин - это соединение гемоглобина с

- <variant>угарным газом
- <variant>углекислым газом
- <variant>кислородом
- <variant>глюкозой
- <variant>водой

<question>Оксигемоглобин - это соединение гемоглобина с

- <variant>кислородом
- <variant>углекислым газом
- <variant>угарным газом
- <variant>глюкозой
- <variant>водой

<question>Агглютинация произойдет при встрече ... агглютинина ... агглютиногена.

- <variant>альфа и А
- <variant>бета и А
- <variant>альфа и бета
- <variant>А и В
- <variant>А и А

QOŃTÚSTIK-QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «OŃTÚSTIK Qazaqstan medicina akademiasy» AQ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Кафедра «Морфологические дисциплины» Контрольно - измерительные средства по дисциплине «Физиологии»		81-11-2025 Стр. 15 из 31

<question>К физиологическим антикоагулянтам относятся

<variant>антитромбин III, гепарин

<variant>антитромбин III, протромбин

<variant>тканевой фактор, гепарин

<variant>проакцелерин, гепарин

<variant>антитромбин III, проконвертин

<question>Предфазой свертывания крови называют ...

<variant>сосудисто-тромбоцитарный гемостаз

<variant>образование тканевой протромбиназы

<variant>образование кровяной протромбиназы

<variant>образование тромбина из протромбина

<variant>образование фибрина из фибриногена

<question>В I фазу коагуляционного гемостаза происходит ...

<variant>образование кровяной и тканевой протромбиназы

<variant>превращение протромбина в тромбин

<variant>образование фибрина из фибриногена

<variant>ретракция сгустка

<variant>фибринолиз

<question>Деление крови на группы основано на присутствии в крови агглютиногенов и агглютининов ...

<variant>1 группа - 0, альфа, бета; 2 группа - А, бета; 3 группа - В, альфа; 4 группа - АВ, о

<variant>1 группа - АВ, о; 2 группа - А, бета; 3 группа - В, альфа; 4 группа - 0, альфа, бета

<variant>1 группа - А, бета; 2 группа - В, альфа; 3 группа - АВ, о; 4 группа - 0, альфа, бета

<variant>1 группа - В, альфа; 2 группа - А, бета; 3 группа - 0, альфа, бета; 4 группа - АВ, о

<variant>1 группа - А, бета; 2 группа - В, альфа; 3 группа - АВ, о; 4 группа - 0, альфа, бета

<question>В акушерской практике может возникнуть резус-конфликт при повторных беременностях ...

<variant>если отец имеет резус-положительную кровь, а мать - резус-отрицательную

<variant>если отец имеет резус-отрицательную кровь, а мать-резус- положительную

<variant>если оба родителя имеет резус-положительную кровь

<variant>если оба родителя имеют резус-отрицательную кровь

<variant>если у матери резус-положительная крови, а у плода резус-отрицательная

<question>Последовательность протекания фаз коагуляционного гемостаза ...

<variant>1 фаза - образование протромбиназы, 2 фаза - образование тромбина 3 фаза - образование фибрина

<variant>1 фаза - образование тромбина, 2 фаза - образование протромбиназы 3 фаза - образование фибрина

<variant>1 фаза - образование протромбиназы, 2 фаза - образование фибрина 3 фаза - образование тромбина

<variant>1 фаза - образование фибрина, 2 фаза - образование протромбиназы, 3 фаза - образование тромбина

<variant>1 фаза - образование тромбина, 2 фаза - образование фибрина, 3 фаза - образование протромбиназы

<question>Гематокритное число равно ... форменных элементов.

<variant>45%

<variant>25%

<variant>30%

<variant>55%

ОҢТҮСТІК-ҚАЗАҚСТАН MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Кафедра «Морфологические дисциплины» Контрольно - измерительные средства по дисциплине «Физиологии»		81-11-2025 Стр. 16 из 31

<variant>65%

<question>Больному, имеющему III группу крови, можно перелить в небольшом количестве кровь ... групп.

<variant>I и III

<variant>I и II

<variant>II и III

<variant>III и IV

<variant>II и IV

<question>К системе крови относятся

<variant>органы кроветворения и кроверазрушения, циркулирующая кровь, аппарат регуляции их функций

<variant>циркулирующая кровь, сердце, сосуды, аппарат регуляции их функций

<variant>органы кроветворения и кроверазрушения, кровеносные сосуды, кровь

<variant>циркулирующая кровь, органы кроветворения, кровераспределения

<variant>циркулирующая кровь, депо крови, костный мозг, сосуды

<question>Вязкость крови зависит от количества в ней

<variant>эритроцитов и белков

<variant>глюкозы и Hb

<variant>оксигемоглобина и солей натрия

<variant>лейкоцитов и белков

<variant>тромбоцитов и солей кальция

<question>У девочки 10 лет после небольшого повреждения кожного покрова долгое время не прекращалось кровотечение. В связи с этим необходимо было обратиться к врачу. Изменение каких форменных элементов крови привело к увеличению времени кровотечения?

<variant>Тромбоцитов

<variant>Нейтрофилов

<variant>Лимфоцитов

<variant>Базофилов

<variant>Эритроцитов

<question>Если пациенту со II группой крови перелить кровь I группы в большом количестве, то выявляются

<variant>обратная агглютинация и гемолиз эритроцитов реципиента

<variant>гемолиз эритроцитов донора

<variant>выработка антител на эритроциты донора

<variant>гемолиз эритроцитов реципиента

<variant>гемолиз эритроцитов донора

<question>Нормальная величина СОЭ у женщин ... мм/час.

<variant>2-15

<variant>20-25

<variant>30-35

<variant>40-45

<variant>50-65

<question>В плазме крови содержится ... г/л белков.

<variant>65-85

<variant>5-25

<variant>25-50

<variant>150-200

ОҢТҮСТІК-ҚАЗАҚСТАН MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Кафедра «Морфологические дисциплины» Контрольно - измерительные средства по дисциплине «Физиологии»		81-11-2025 Стр. 17 из 31

<variant>250-300

<question>Гемоглобин в организме ...

<variant>участвует в транспорте углекислого газа, кислорода, поддерживает рН

<variant>обеспечивает транспорт кислорода, участвует в свертывании крови

<variant>поддерживает рН, транспортирует азот, кислород

<variant>участвует в свертывании, иммунных реакциях, поддерживает рН

<variant>обеспечивает иммунитет, создает онкотическое давление переносит углеводы

<question>После ужаливания пчелы через несколько часов аллергические явления на коже (отек, зуд) исчезли. Известно, что одним из медиаторов аллергии является гистамин. Какие клетки крови приняли участие в элиминации избытка гистамина в месте ужаливания?

<variant>Эозинофилы

<variant>Нейтрофилы

<variant>Базофилы

<variant>Лимфоциты

<variant>Моноциты

<question>Резус-конфликт может возникнуть ...

<variant>если у матери Rh- кровь, а у плода - Rh+

<variant>при повторном переливании Rh- крови Rh+ реципиенту

<variant>если у матери Rh+ кровь, а у плода Rh-

<variant>при однократном переливании Rh+ крови пациенту с Rh+

<variant>если у матери и у плода кровь Rh-

<question>В крови человека содержится ... гемоглобина.

<variant>125-160 г/л

<variant>50-80 г/л

<variant>85-115 г/л

<variant>170-200 г/л

<variant>220-260 г/л

<question>Для эритропоэза необходимы ...

<variant>витамин B12, железо, фолиевая кислота

<variant>витамины Д и B6, уксусная кислота

<variant>внутренний фактор Кастла, витамин E, цинк

<variant>биотин, витамин B3, марганец

<variant>ретинол, фтор, витамин B6

<question>Тромбоциты в крови содержатся в количестве ...

<variant>200-400 x 10⁹ /л

<variant>6-8 x 10⁹ /л

<variant>150-180 x 10⁹ /л

<variant>4-4,5 x 10⁹ /л

<variant>420-480 x 10⁹ /л

<question>У пациента I группа крови, если агглютинация ...

<variant>отсутствует во всех сыворотках

<variant>произошла с сыворотками I, II и III групп

<variant>произошла с сыворотками III, IV групп

<variant>произошла с сыворотками I и II групп

<variant>произошла с сыворотками I и III групп

<question>Функцией лейкоцитов является ...

<variant>участие в реакциях фагоцитоза, иммунитета и аллергии

ОҢТҮСТІК-ҚАЗАҚСТАН MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Кафедра «Морфологические дисциплины» Контрольно - измерительные средства по дисциплине «Физиологии»		81-11-2025 Стр. 18 из 31

- <variant>поддержание осмотического давления, участие в свертывании крови, транспорт газов
- <variant>регуляция pH, транспорт, фагоцитоз, иммунитет, аллергия
- <variant>участие в реакциях СОЭ, поддержание онкотического давления, транспорт солей
- <variant>дыхательная функция, поддержание вязкости, транспорт аминокислот
- <question>Онкотическое давление крови обуславливают ...
- <variant>белки плазмы
- <variant>белки и соли плазмы
- <variant>белки и соли форменных элементов
- <variant>соли плазмы
- <variant>соли и форменных элементы
- <question>Лейкоцитов в крови содержатся ...
- <variant>4-8 x 10⁹ /л
- <variant> 0-1 x 10⁹ /л
- <variant>1-2 x 10⁹ /л
- <variant>3-5 x 10⁹ /л
- <variant>9-12 x 10⁹ /л
- <question>Нормальная величина СОЭ у мужчин равна ... мм/час.
- <variant>1-10
- <variant>35-40
- <variant>25-30
- <variant>15-20
- <variant>0,1-0,9
- <question>Послефаза свертывания крови включает ...
- <variant>ретракцию, фибринолиз
- <variant>образование тромбина, фибринолиз
- <variant>ретракцию, образование витамина В
- <variant>фибринолиз, образование протромбина
- <variant>образование тромба, ретракцию
- <question>Функции эозинофилов ...
- <variant>антипаразитарная, нейтрализация в организме гистамина, фагоцитоз, бактерицидная активность
- <variant>антипаразитарная, бактерицидная активность, экзцитоз
- <variant>нейтрализация в организме гистамина, бактерицидная активность, эндоцитоз
- <variant>фагоцитоз, бактерицидная активность, нейтрализация в организме ацетилхолина
- <variant>бактерицидная активность, нейтрализация в организме адреналина, антипаразитарная
- <question>Функции нейтрофилов ...
- <variant>фагоцитоз, бактерицидная активность, способствуют регенерации тканей
- <variant>фагоцитоз, антипаразитарная, способствуют регенерации тканей
- <variant>бактерицидная активность, фагоцитоз, антипаразитарная
- <variant>способствуют регенерации тканей, антипаразитарная
- <variant>бактерицидная активность, нейтрализация в организме гистамина
- <question>Для эритроцитов характерно ...
- <variant>образование в клетках красного костного мозга, разрушение в селезенке и печени, продолжительность жизни 120 дней, способность к деформации
- <variant>разрушение в клетках красного костного мозга, способность к деформации, образование в селезенке и печени

ОҢТҮСТІК-ҚАЗАҚСТАН MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Кафедра «Морфологические дисциплины» Контрольно - измерительные средства по дисциплине «Физиологии»		81-11-2025 Стр. 19 из 31

<variant>разрушение в селезенке и печени, нейтрализация в организме гистамина, продолжительность жизни 10 дней

<variant>продолжительность жизни 120 дней, нейтрализация в организме гистамина, разрушение в клетках красного костного мозга

<variant>способность к деформации, нейтрализация в организме гистамина, разрушение в клетках в красного костного мозга

<question>Постоянство рН крови поддерживают буферные системы ...

<variant>гемоглобиновая, карбонатная, фосфатная, белков плазмы

<variant>миоглобиновая, белков плазмы, сульфатная

<variant>карбонатная, миоглобиновая, белков плазмы, сульфатная

<variant>фосфатная, миоглобиновая, белков плазмы, сульфатная

<variant>белков плазмы, гемоглобиновая, фосфатная, сульфатная

<question>Значение белков плазмы крови ...

<variant>создают онкотическое давление, участвуют в свертывании крови, способствуют поддержанию рН крови, осуществляют транспорт веществ

<variant>создают осмотическое давление, осуществляют транспорт веществ, участвуют в свертывании крови

<variant>участвуют в свертывании крови, осуществляют транспорт веществ, нейтрализуют в организме гистамин

<variant>способствуют поддержанию рН крови, осуществляют транспорт веществ, нейтрализуют в организме гистамин

<variant>осуществляют транспорт веществ, нейтрализуют в организме ацетилхолин, определяют группу крови

<question>Осмотическая резистентность эритроцитов это устойчивость к действию ...

<variant>гипотонического раствора NaCl

<variant>гипертонического раствора NaCl

<variant>изотонического раствора NaCl

<variant>гипотонического раствора глюкозы

<variant>изотонического раствора KCl

<question>Цветной показатель крови характеризует ...

<variant>степень насыщения эритроцитов гемоглобином

<variant>степень насыщения эритроцитов железом

<variant>содержание гемоглобина крови

<variant>отношение числа эритроцитов к лейкоцитам

<variant>соотношение плазмы и форменных элементов

<question>Во II фазу коагуляционного гемостаза образуется ...

<variant>тромбин

<variant>протромбин

<variant>тканевая протромбиназа

<variant>кровяная протромбиназа

<variant>анти тромбин

<question>Если агглютинация происходит со стандартными сыворотками ... групп, то у пациента IV группа крови.

<variant>I, II и III

<variant>II и III

<variant>IV и III

<variant>I и IV

<variant>I и III

ОҢТҮСТІК-ҚАЗАҚСТАН MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Кафедра «Морфологические дисциплины» Контрольно - измерительные средства по дисциплине «Физиологии»		81-11-2025 Стр. 20 из 31

<question>Объем циркулирующей крови у взрослых

<variant>6,5-7% от веса тела - 4-5 л

<variant>3-5% от веса тела - 1,5-2 л

<variant>9-10% от веса тела - 7-8 л

<variant>11-12% от веса тела - 8,5-9 л

<variant>13-15% от веса тела - 10-12 л

<question>Эритропоэтины образуются в

<variant>почках, печени, селезенке

<variant>сердце, селезенке, надпочечниках

<variant>селезенке, гипофизе, мышцах

<variant>легких, желудке, кишечнике

<variant>кишечнике, гипоталамусе, костном мозге

<question>Количество эритроцитов в крови взрослого человека

<variant>4,5-5 x 10¹² /л

<variant>2-3 x 10¹² /л

<variant>3,5-4,0 x 10⁹ /л

<variant>4,5-5 x 10⁹ /л

<variant>200-400 x 10¹² /л

<question>Растворимый фибриноген превращается в нерастворимый фибрин под действием

<variant>тромбина и XIII фактора

<variant>тромбопластина и V фактора

<variant>протромбина и VI фактора

<variant>фибринолизина и XI фактора

<variant>фибриназы и IX фактора

<question>Количество эритроцитов у мужчин больше, чем у женщин, так как

<variant>эритропоэз стимулируется мужскими половыми гормонами

<variant>эритропоэз стимулируется физической работой

<variant>больше мышечной массы

<variant>образуется больше эритропоэтинов

<variant>нет ежемесячной потери эритроцитов, как у женщин

<question>Функция базофилов - это

<variant>продукция гистамина и гепарина

<variant>поддержание постоянства pH крови

<variant>продукция интерферона, лизоцима

<variant>транспорт антител

<variant>активация системы комплемента

<question>Внутренний фактор кроветворения, необходимый для всасывания внешнего фактора цианкобаламина (вит. B12) образуется в

<variant>желудке

<variant>почках

<variant>печени

<variant>селезенке

<variant>кишечнике

<question>Наличие резус-фактора крови имеет значение при

<variant>повторном переливании Rh + крови Rh – реципиенту

<variant>повторном переливании Rh + крови Rh + реципиенту

<variant>переливании больших количеств Rh - крови Rh + реципиенту

ОҢТҮСТІК-ҚАЗАҚСТАН MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Кафедра «Морфологические дисциплины» Контрольно - измерительные средства по дисциплине «Физиологии»		81-11-2025 Стр. 21 из 31

<variant>повторном переливании Rh - крови Rh + пациенту

<variant>переливании Rh - крови Rh – реципиенту

<question>Роль углеводов в организме

<variant>в основном энергетическая

<variant>в основном пластическая

<variant>в равной мере пластическая и энергетическая

<variant>гуморальная

<variant>регуляторная

<question>Отрицательный азотистый баланс наблюдается

<variant>при значительном снижении содержания белков в пище

<variant>при беременности

<variant>в период роста

<variant>при значительном увеличении содержания белков в пище

<variant>при выздоровлении

<question>Дыхательный коэффициент - это отношение объема

<variant>выделенного CO₂ к объему поглощенного O₂

<variant>выделенного CO₂ к объему поглощенного азота

<variant>поглощенного O₂ к объему выделенного CO₂

<variant>поглощенного O₂ к выделенной энергии

<variant>поглощенного O₂ к объему выделенных водяных паров

<question>Положительный азотистый баланс в организме человека наблюдается

<variant>в период роста

<variant>в старческом возрасте

<variant>при голодании

<variant>при длительных и интенсивных физических нагрузках

<variant>при значительном употреблении углеводов

<question>Наибольшее увеличение основного обмена вызывает гормон

<variant>тироксин

<variant>адреналин

<variant>норадреналин

<variant>соматотропин

<variant>глюкагон

<question>.Пациент, пришедший на приём к врачу, жалуется на сердцебиение, потливость, раздражительность, слабость и снижение массы тела. При обследовании ЧСС – 95 уд/мин., АД – 130 и 70мм рт. ст. Процент отклонения уровня основного обмена – 33%.

Чем может быть вызвано отклонение уровня основного обмена от нормы у данного пациента?

<variant>повышенным уровнем тиреоидных гормонов

<variant>повышением количества паратиреоидных гормонов

<variant>увеличением количества тиреокальцитонина в крови

<variant>уменьшением количества тиреотропного гормона в крови

<variant>снижением уровня йодсодержащих гормонов щитовидной железы

<question>Энергия основного обмена расходуется на

<variant>дыхание, моторику пищеварительного тракта, поддержание температуры тела, работу сердца и почек

<variant>дыхание, поддержание температуры тела, секрецию пищеварительных ферментов, работу сердца и почек

<variant>поддержание температуры среды, работу сердца, почек, скелетной и дыхательной мускулатуры

ОҢТҮСТІК-ҚАЗАҚСТАН MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Кафедра «Морфологические дисциплины» Контрольно - измерительные средства по дисциплине «Физиологии»		81-11-2025 Стр. 22 из 31

<variant>поддержание температуры тела, выполнение всех функций пищеварительной система, работу сердца, почек

<variant>поддержание температуры тела, работу скелетной мускулатуры и моторику пищеварительного тракта

<question>Для расчета расхода энергии необходимо определить ...

<variant>содержание O_2 и CO_2 в выдыхаемом воздухе, МОЛВ

<variant>объем минутной легочной вентиляции (МОЛВ), содержание O_2 и CO_2 во вдыхаемом воздухе

<variant>содержание O_2 во вдыхаемом и CO_2 в выдыхаемом воздухе, МОЛВ

<variant>содержание O_2 в выдыхаемом и во вдыхаемом воздухе

<variant>содержание O_2 и азота

<question>Усиливают основной обмен гормоны ...

<variant>адреналин, тироксин

<variant>альдостерон, кортизон

<variant>кальцитонин, глюкагон

<variant>тироксин, вазопрессин

<variant>инсулин, вазопрессин

<question>Теплопродукцию усиливает гормон ...

<variant>тироксин

<variant>инсулин

<variant>глюкагон

<variant>минералокортикоид

<variant>паратгормон

<question>При повышении температуры внешней среды, у гомойотермных животных, ... теплопродукция ... теплоотдача.

<variant>уменьшается, тувеличивается

<variant>увеличивается, уменьшается

<variant>уменьшается, уменьшается

<variant>увеличивается, увеличивается

<variant>не меняется, уменьшается

<question>Основные центры терморегуляции расположены в ...

<variant>гипоталамусе

<variant>таламусе

<variant>мозжечке

<variant>подкорковых ганглиях

<variant>спинном мозге

<question>Расход энергии у лиц тяжелого физического труда составляет ...

<variant>5000 ккал

<variant>2000 ккал

<variant>3000 ккал

<variant>8000 ккал

<variant>10000 ккал

<question>Суточное содержание в пище углеводов для лиц умственного труда должно быть ...

<variant>400-500 г

<variant>100-150 г

<variant>150-200 г

<variant>200-250 г

QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Кафедра «Морфологические дисциплины» Контрольно - измерительные средства по дисциплине «Физиологии»		81-11-2025 Стр. 23 из 31

<variant>300-350 г

<question>Химическая терморегуляция включает процессы

<variant>изменения интенсивности обмена веществ

<variant>теплопроводения

<variant>теплоизлучения

<variant>конвекции

<variant>испарения

<question>Железы внутренней секреции, регулирующие интенсивность основного обмена – это

<variant>щитовидная, гипофиз, надпочечники, половые

<variant>гипофиз, поджелудочная, щитовидная и околощитовидные

<variant>поджелудочная, гипофиз, эпифиз, околощитовидные

<variant>половые, эпифиз, гипофиз, поджелудочная

<variant>щитовидная, поджелудочная, эпифиз

<question>К жирорастворимым витаминам относятся

<variant>А, Д, Е, К

<variant>А, В2, В6, Д

<variant>А, В1, В12, К

<variant>Д, Е, С, К

<variant>А, В12, С, К

<question>К водорастворимым витаминам относятся

<variant>В1, В2, В6, С

<variant>А, В1, В2, Д

<variant>А, Д, Е, К

<variant>В1, В12, С, Д

<variant>А, В12, С, Д

<question>Главную роль в теплопродукции выполняют

<variant>мышцы, печень, желудочно-кишечный тракт

<variant>мышцы, печень, кожа

<variant>печень, сердце, легкие

<variant>печень, желудочно-кишечный тракт, легкие

<variant>мышцы, соединительная ткань, жировая клетчатка

<question>Нормальная величина физиологических коэффициентов для белков ..., жиров ..., и углеводов ... (ккал/г).

<variant>4,1 9,3 4,1

<variant>5,4 9,3 4,1

<variant>5,8 9,3 4,1

<variant>4,1 5,4 4,1

<variant>5,9 4,1 5,1

<question>Фактор, определяющий реабсорбцию аминокислот в почечных канальцах

<variant>низкая концентрация аминокислот в крови

<variant>альдостерон

<variant>высокая концентрация аминокислот в крови

<variant>антидиуретический гормон

<variant>медуллин

<question>Фильтрация в капсуле будет происходить при давлении в капиллярах ..., онкотическом ..., в капсуле ... мм рт. ст.

<variant>70 30 20

ОҢТҮСТІК-ҚАЗАҚСТАН MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Кафедра «Морфологические дисциплины»		
Контрольно - измерительные средства по дисциплине «Физиологии»		81-11-2025 Стр. 24 из 31

<variant>40 30 20

<variant>70 30 40

<variant>50 30 40

<variant>70 50 30

<question>Первичной мочи образуется ... в сутки.

<variant>170-180 л

<variant>50-60 л

<variant>70-80 л

<variant>90-110 л

<variant>130-160 л

<question>В сутки мочи выделяется

<variant>1000-1500 мл

<variant>500-750 мл

<variant>2500-3000 мл

<variant>4000-5000 мл

<variant>5500-6000 мл

151.В петле Генле реабсорбируется ... в нисходящем колене, ... в восходящем колене.

<variant>вода натрий

<variant>калий натрий

<variant>глюкоза натрий

<variant>мочевина вода

<variant>натрий вода

<question>В канальцах нефрона НЕ реабсорбируются ...

<variant>сульфаты

<variant>креатинин

<variant>глюкоза

<variant>витамины

<variant>натрий

<question>Всасывание Na^+ из канальцев нефрона в кровь повышает гормон

<variant>альдостерон

<variant>АДГ

<variant>инсулин

<variant>паратгормон

<variant>ренин

<question>Реабсорбцию воды обеспечивает

<variant>антидиуретический гормон

<variant>глюкагон

<variant>соматотропин

<variant>паратгормон

<variant>инсулин

<question>Фильтрации первичной мочи способствует

<variant>повышение кровяного давления в капиллярах клубочков

<variant>повышение онкотического давления плазмы крови

<variant>повышение гидростатического давления фильтрата в капсуле и канальцах

<variant>повышение содержания белков плазмы

<variant>понижение кровяного давления

<question>В норме во вторичной моче отсутствуют ...

<variant>желчные кислоты, белок, глюкоза, ацетон

ОҢТҮСТІК-ҚАЗАҚСТАН MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Кафедра «Морфологические дисциплины» Контрольно - измерительные средства по дисциплине «Физиологии»		81-11-2025 Стр. 25 из 31

<variant>желчные кислоты и пигменты, глюкоза, ферменты

<variant>желчные кислоты и пигменты, белок и ацетон

<variant>желчные кислоты, фосфаты, глюкоза, фермент

<variant>желчные кислоты, сульфаты, глюкоза, аминокислоты

<question>Пациент страдает от чрезмерного выделения мочи (около 20 л в сутки) и сильной жажды. Наблюдаются осложнения в виде дегидратации и судорог. Укажите, секреция какого гормона нарушена (снижена):

<variant>Вазопрессин

<variant>Адреналин

<variant>Кортизол

<variant>АКТГ

<variant>Тироксин

<question>К беспороговым веществам относятся

<variant>креатинин, инулин, сульфаты

<variant>креатинин, глюкоза, инулин

<variant>креатинин, глюкоза, сульфаты

<variant>креатинин, инулин, фосфаты

<variant>аминокислоты, инулин, вода

<question>Если приносящая артериола почечного клубочка будет иметь меньший просвет, чем выносящая, то...

<variant>Диурез полностью прекратится (так как снизится фильтрационное давление)

<variant>Диурез снизится

<variant>Диурез повысится

<variant>Диурез не изменится

<variant>Изменение диуреза будет зависеть от типа конституции

<question>В основе мочеобразования лежат три основных процесса

<variant>клубочковая фильтрация, канальцевая реабсорбция и секреция

<variant>клубочковая реабсорбция, канальцевая фильтрация и секреция

<variant>клубочковая секреция, канальцевая реабсорбция и фильтрация

<variant>клубочковая секреция и фильтрация, канальцевая реабсорбция

<variant>клубочковая реабсорбция и секреция, канальцевая фильтрация

<question>В извитых канальцах II-го порядка происходит

<variant>облигатная реабсорбция воды, Na^+ , K^+ , глюкозы

<variant>облигатная реабсорбция воды, Na^+ , C^{++} , аминокислот

<variant>факультативная реабсорбция аминокислот, Ca^{++} , Na^+ , K^+

<variant>факультативная реабсорбция воды, Na^+ , уменьшается реабсорбция K^+ , восстановление нарушенного соотношения между Na^+ и K^+

<variant>облигатная реабсорбция жирных кислот, K^+

<question>Работа сердца ... при избыточном содержании тироксина в крови.

<variant>учащается

<variant>усиливается

<variant>ослабляется

<variant>не изменяется

<variant>урежается

<question>Под влиянием гормона тироксина содержание жира в депо ...

<variant>уменьшается

<variant>не меняется

<variant>увеличивается

ОҢТҮСТІК-ҚАЗАҚСТАН MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Кафедра «Морфологические дисциплины» Контрольно - измерительные средства по дисциплине «Физиологии»		81-11-2025 Стр. 26 из 31

<variant>увеличивается, затем уменьшается

<variant>уменьшается, затем увеличивается

<question>Гормоном паращитовидных желез является

<variant>паратгормон

<variant>тиреокальцитонин

<variant>инсулин

<variant>глюкагон

<variant>альдостерон

<question>Выделение паратгормона вызывает ... в крови.

<variant>повышение кальция

<variant>понижение кальция

<variant>повышение аминокислот

<variant>понижение аминокислот

<variant>повышение фосфора

<question>При удалении коры надпочечников наступает смерть из-за

<variant>нарушения водно-солевого обмена

<variant>нарушения белкового обмена

<variant>нарушения жирового обмена

<variant>нарушения углеводного обмена

<variant>нарушения обмена витаминов

<question>Соматотропный гормон гипофиза стимулирует синтез

<variant>белка

<variant>гормонов

<variant>углеводов

<variant>жиров

<variant>витаминов

<question>Секрецию тропинов гипофиза стимулируют

<variant>либерины

<variant>тиреоидные гормоны

<variant>катехоламины

<variant>статины

<variant>глюкокортикоиды

<question>У ликвидатора аварии на Чернобыльской АЭС через определенное время появились жалобы на повышенную возбудимость, сердцебиение, снижение массы тела, постоянную слабость, ощущение жара. Гиперфункция какой железы может быть причиной указанных изменений?

<variant>Щитовидной железы

<variant>Коркового вещества надпочечников

<variant>Мозгового вещества надпочечников

<variant>Паращитовидных желез

<variant>Аденогипофиза

<question>Гормоны щитовидной железы

<variant>тироксин, трийодтиронин, тирокальцитонин

<variant>адреналин, тироксин, холин

<variant>секретин, холецистрокинин, вилликинин

<variant>трийодтиронин, тироксин, секретин

<variant>тироксин, вилликинин, адреналин

<question>При увеличении секреции антидиуретического гормона

ОҢТҮСТІК-ҚАЗАҚСТАН MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		 SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Кафедра «Морфологические дисциплины»		81-11-2025
Контрольно - измерительные средства по дисциплине «Физиологии»		Стр. 27 из 31

<variant>реабсорбция воды увеличивается, мочеотделение уменьшается

<variant>реабсорбция воды уменьшается, мочеотделение увеличивается

<variant>реабсорбция воды не меняется, мочеотделение увеличивается

<variant>реабсорбция воды уменьшается, мочеотделение не меняется

<variant>реабсорбция воды увеличивается, мочеотделение не меняется

<question>Удаление щитовидной железы у пациента привело к появлению судорог, тетанических сокращений мышц. Объясните, из-за чего возникло данное состояние.

<variant>Нарушение выработки паратгормона (так как удалены паращитовидные железы удалены вместе с щитовидной железой)

<variant>Нарушение выработки тироксина (так как щитовидные железы удалены)

<variant>Нарушение выработки адреналина

<variant>Нарушение выработки соматотропина

<variant>Нарушение выработки кортизола

<question>У человека был удалён один надпочечник. При этом функция оставшегося в организме надпочечника снизилась. Объясните, почему это произошло?

<variant>Удаление одного надпочечника вызвало снижение выработки АКТГ по принципу обратной связи

<variant>Удаление одного надпочечника вызвало снижение выработки ТТГ по принципу обратной связи

<variant>Удаление одного надпочечника вызвало повышение выработки АКТГ по принципу обратной связи

<variant>Удаление одного надпочечника вызвало снижение выработки ЛГ по принципу положительной обратной связи

<variant>Удаление одного надпочечника вызвало повышение выработки ЛГ по принципу обратной связи

<question>Влияние альдостерона сводится к ...

<variant>усилению реабсорбции Na^+ в канальцах нефрона и удержанию воды

<variant>усилению клубочковой фильтрации и реабсорбции K^+ в канальцах нефрона

<variant>торможению реабсорбции Na^+ в канальцах нефрона и удержанию воды

<variant>торможению клубочковой фильтрации и реабсорбции Na^+ в канальцах нефрона

<variant>усилению реабсорбции воды и торможению реабсорбции Na^+ в канальцах нефрона

<question>Гормоны, контролирующие менструальный цикл ...

<variant>ФСГ, эстрогены, ЛСГ, прогестерон

<variant>меланотропин, андрогены, ЛСГ, прогестерон

<variant>СТГ, ФСГ, прогестерон, эстрогены

<variant>ФСГ, глюкагон, СТГ, паратгормон

<variant>ФСГ, инсулин, прогестерон

<question>Женские половые гормоны ...

<variant>эстрон, эстриол, эстрадиол

<variant>паратгормон, серотонин, тирокальцитонин

<variant>серотонин, эстриол, брадикинин

<variant>тироксин, эстрон, тестостерон

<variant>тестостерон, тироксин, серотонин

<question>Инсулин:

<variant>вызывает гипогликемию, повышает усвоение глюкозы клетками, вызывает синтез гликогена из глюкозы в печени, мышцах.

ОҢТҮСТІК-ҚАЗАҚСТАН MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Кафедра «Морфологические дисциплины» Контрольно - измерительные средства по дисциплине «Физиологии»		81-11-2025 Стр. 28 из 31

<variant>повышает проницаемость мембран клеток для глюкозы, вызывает гипергликемию и гликогенолиз в клетках печени, тормозит гликонеогенез.

<variant>понижает проницаемость для аминокислот и глюкозы, тормозит превращение глюкозы в гликоген, вызывает гипергликемию.

<variant>стимулирует гликонеогенез, усиливает окисление глюкозы, уменьшает образование кетоновых тел.

<variant>снижает катаболизм белков, вызывает гипергликемию, увеличивает проницаемость клеток для глюкозы и аминокислот.

<question>Стимулируют гормональную деятельность щитовидной железы

<variant>симпатические нервы, тиротропин, адреналин

<variant>блуждающий нерв, тиротропин, ионы йода, адреналин

<variant>кортикостероиды, вагус, норадреналин

<variant>адреналин, соматостатин, блуждающие нервы

<variant>норадреналин, гонадотропины, глюкагон

<question>Ткани относятся к возбудимым тканям.

<variant>Нервная, мышечная, железистая

<variant>Нервная, хрящевая, соединительная

<variant>Мышечная, эпителиальная, глиальная

<variant>Железистая, костная, коллагеновые волокна

<variant>Сухожилия, мышечная, костная

<question>Медиаторы, вырабатываемые в синапсах парасимпатической и симпатической нервной системы

<variant>ацетилхолин, норадреналин

<variant>нейропептиды, гаммааминомасляная кислота, вещество Р

<variant>серотонин, гистамин, простагландины

<variant>ацетилхолин, гистамин

<variant>адреналин, простагландины

<question>Положительный следовой потенциал соответствует

<variant>гиперполяризации, понижению возбудимости

<variant>поляризации, понижению возбудимости

<variant>реполяризации, гиперполяризации

<variant>гиперполяризации, гипопполяризации

<variant>поляризации, повышению возбудимости

<question>При удалении зуба пациенту предварительно провели анестезию. Через некоторое время пациент реагировал на прикосновение к зубу слабыми раздражителями и не реагировал на сильные воздействия. Как называется эта фаза парабриоза?

<variant>парадоксальная

<variant>начальная

<variant>провизорная

<variant>тормозная

<variant>ультрапарадоксальная

<question>Мембранный потенциал ..., если увеличить концентрацию натрия в клетке.

<variant>уменьшится, вплоть до исчезновения

<variant>не изменится

<variant>увеличится до критической величины

<variant>уменьшится с фазными изменениями

<variant>будет быстро колебаться

<question>Для сокращения мышцы необходимы

ОҢТҮСТІК-ҚАЗАҚСТАН MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Кафедра «Морфологические дисциплины» Контрольно - измерительные средства по дисциплине «Физиологии»		81-11-2025 Стр. 29 из 31

<variant>Ca²⁺, АТФ

<variant>Na⁺, K⁺, АТФ

<variant>K⁺, Cl⁻, ДНК

<variant>Cl⁻, Mg²⁺, ДНК

<variant>Mg²⁺, Ca²⁺, АТФ

<question>Деполяризация мембраны происходит под влиянием

<variant>ацетилхолина, адреналина

<variant>гаммааминомасляной кислоты, глицина

<variant>света, адреналина

<variant>атропина, ацетилхолина

<variant>холинэстеразы, серотонина

<question>Потенциал действия возникает

<variant>под действием порогового раздражителя при одиночном раздражении

<variant>под действием подпорогового раздражителя

<variant>при действии сверхпороговым и пороговым импульсным током

<variant>при действии сверхпороговым раздражителем любой физической и химической природы

<variant>при действии электромагнитными волнами любой интенсивности

<question>Под пассивным транспортом веществ через мембрану, понимают транспорт

<variant>по концентрационному и электрохимическому градиенту

<variant>с участием мембранных каналов и АТ

<variant>обеспечиваемый ионными насосами и донаторами энергии

<variant>с участием АТФ и ионных насосов

<variant>с участием мембранных каналов и ионных насосов

<question>Ca²⁺, необходимый для сокращения мышц накапливается

<variant>в саркоплазматическом ретикулуме, в концевых полостях саркоплазматического ретикулума

<variant>в цитоплазме, ядре

<variant>в ядре и мембране клеток

<variant>в актиновых и миозиновых волокнах

<variant>в рибосомах и митохондриях

<question>Мембранный потенциал формируется за счет

<variant>неодинаковой проницаемости мембраны для ионов Na⁺ и K⁺

<variant>отсутствия проницаемости мембраны

<variant>проницаемости мембраны для ионов Cl⁻ и Mg²⁺

<variant>проницаемости мембраны для ионов Ca²⁺ и Na⁺

<variant>проницаемости мембраны для ионов Cl⁻ и Ca²⁺

<question>Адекватными раздражителями нервной ткани являются

<variant>электрические, медиаторы

<variant>электрические, осмотические

<variant>термические, химические

<variant>осмотические, электрические

<variant>магнитные

<question>Утомление мышц можно изучать

<variant>эргографом, велоэргометром

<variant>осциллографом, пневмографом

<variant>миографом, кимографом

<variant>пневмографом, осциллометром

ОҢТҮСТІК-ҚАЗАҚСТАН MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Кафедра «Морфологические дисциплины» Контрольно - измерительные средства по дисциплине «Физиологии»		81-11-2025 Стр. 30 из 31

- <variant>электромиографом, электроэнцефалографом
- <question>Отрицательный следовой потенциал соответствует
- <variant>остаточной деполяризации мембраны
- <variant>гиперполяризации, поляризации
- <variant>гипополяризации, поляризации
- <variant>прекращению проницаемости мембраны для ионов Na^+ и K^+
- <variant>увеличению проницаемости для ионов Ca^{2+}
- <question>При проводниковой блокаде нерва нарушается закон
- <variant>физиологической целостности
- <variant>изолированного проведения
- <variant>одностороннего проведения
- <variant>двустороннего проведения
- <variant> «силы - времени»
- <question>Передача возбуждения в синапсах происходит
- <variant>химическим и электрическим путем
- <variant>химическим и осмотическим путем
- <variant>электрическим и термическим путем
- <variant>онкотическим и химическим путем
- <variant>электротоническим и химическим путем
- <question>Гиперполяризация мембраны происходит под влиянием
- <variant>ГАМКа, глицина
- <variant>ацетилхолина, адреналина
- <variant>ацетилхолина, ГАМКа
- <variant>адреналина, глицина
- <variant>ГАМКа, серотонина
- <question>Синаптические пузырьки включают в себя
- <variant>медиаторы (ацетилхолин, норадреналин и др)
- <variant>кислоту, щелочь
- <variant>продукты обмена, метаболиты
- <variant>глюкозу, ферменты, витамины
- <variant>аминокислоты, жиры
- <question>Потенциал действия соответствует
- <variant>повышению проницаемости для Na^+ и деполяризации мембраны
- <variant>еполяризации и гиперполяризации мембраны
- <variant>местному изменению проницаемости, локальному ответу
- <variant>остаточной деполяризации и отрицательному следовому потенциалу
- <variant>локальному изменению проницаемости и гиперполяризации мембраны
- <question>Нервно-мышечный синапс состоит из
- <variant>синаптической бляшки, пресинаптической и постсинаптической мембраны
- <variant>нервной, мышечной части
- <variant>нервного ствола, мышцы
- <variant>синаптической мембраны, аксоплазмы
- <variant>постсинаптической мембраны, мышечной ткани
- <question>Под локальным ответом понимают
- <variant>местное не распространяющееся возбуждение под влиянием подпорогового раздражителя
- <variant>изменение проницаемости под влиянием сверхпороговых и пороговых раздражителей

ОҢТҮСТІК-ҚАЗАҚСТАН MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Кафедра «Морфологические дисциплины»		
Контрольно - измерительные средства по дисциплине «Физиологии»		81-11-2025 Стр. 31 из 31

<variant>изменение проницаемости под влиянием одиночного и импульсного раздражителя

<variant>изменение проницаемости под влиянием раздражения ткани, током под анодом

<variant>изменение проницаемости мембраны при раздражении постоянным током под катодом

<question>Биопотенциалы возбудимых тканей регистрируют

<variant>гальванометром, осциллографом

<variant>реографом, сфигмографом

<variant>пневмографом, миографом

<variant>пульсотаксометром, импульсатором

<variant>тонометром, манометром

<question>Фазы парабоза протекают в следующей последовательности ...

<variant>уравнительная, парадоксальная, тормозная

<variant>тормозная, уравнительная, парадоксальная

<variant>парадоксальная, уравнительная, тормозная

<variant>уравнительная, тормозная, парадоксальная

<variant>тормозная, парадоксальная, уравнительная

<question>При раздражении подпороговой силой раздражителя мембранный потенциал клетки ...

<variant>уменьшается

<variant>увеличится

<variant>исчезает

<variant>не меняется

<variant>трансформируется

<question>Медиатор в нервно-мышечном синапсе скелетной мускулатуры – это

<variant>ацетилхолин

<variant>адреналин

<variant>серотонин

<variant>глицин

<variant>ГАМК

<question>В период сокращения мышцы миофибриллы укорачиваются за счет ...

<variant>взаимодействия актиновых и миозиновых нитей

<variant>белка тропонина

<variant>ионов Ca^{++}

<variant>укорочения только актиновых нитей

<variant>укорочения только миозиновых нитей

<question>Хронаксия - это наименьшее время, в течение которого ток ...

<variant>напряжением в две реобазы вызывает возбуждение

<variant>напряжением в одну реобазу вызывает возбуждение

<variant>пороговой силы вызывает возбуждение

<variant>подпороговой силы вызывает уменьшение мембранного потенциала

<variant>напряжением в три реобазы вызывает потенциал действия

<question>Аккомодация - это свойство возбудимой ткани ...

<variant>повышать порог возбудимости при медленном нарастании силы раздражения

<variant>понижать порог возбудимости на медленное нарастание силы

<variant>повышать скорость проведения возбуждения на пороговую силу раздражения

<variant>понижать порог возбудимости на сверхпороговый раздражитель

<variant>повышать порог возбудимости на мгновенное раздражение

ОҢТҮСТІК-ҚАЗАҚСТАН MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Кафедра «Морфологические дисциплины» Контрольно - измерительные средства по дисциплине «Физиологии»		81-11-2025 Стр. 32 из 31

<question>Гладкие мышцы способны к ... сокращению.

- <variant>тоническому
- <variant>тетаническому
- <variant>иррадиации
- <variant>фазическому
- <variant>спастическому

<question>К адекватным раздражителям возбудимых тканей относятся

- <variant>электрические
- <variant>температурные
- <variant>химические
- <variant>механические
- <variant>осмотические