

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА

Дисциплина: Психиатрия и наркология

Код дисциплины: PR 3305

Название ОП: 6В10117 «Стоматология» (уск)

Общий объём часов/кредит: 90ч./ 3кредитов

Курс и семестр изучения: 2 курс/IV семестр

Контрольно-измерительные средства



Тестовые вопросы программы для рубежного контроля 1

<question>Собрания, заседания проходят на расстоянии...

- <variant>массовом
- <variant>социальном
- <variant>личном
- <variant>интимном
- <variant>неформальном

<question>Для взаимопонимания собеседников помогает...

- <variant>чтение психологического контекста их общения
- <variant>совершенствование профессиональных знаний и навыков
- <variant>создание чувства уверенности у пациента
- <variant>установление психологического контакта с пациентом
- <variant>самооценка врача

<question>Нормальное поведение при встрече с незнакомым человеком — это...

- <variant>«лицом к лицу»
- <variant>«рядом»
- <variant>сидеть, откинувшись назад
- <variant>«через стол»
- <variant>наклониться к пациенту

<question>Партнёрские отношения, психологический контакт, общие цели, которые преследуют коллеги, определяются положением...

- <variant>«рядом»
- <variant>«лицом к лицу»
- <variant>сидя, откинувшись назад
- <variant>«через стол»
- <variant>наклониться к пациенту

<question>Отношения «начальник-подчинённый», где роли чётко определены, и необходимо точно следовать указаниям и приказам, характерны для положения...

- <variant>«через стол»
- <variant>лицом к лицу
- <variant>рядом
- <variant>сидя, откинувшись назад
- <variant>наклониться к пациенту

<question>Пациент на приёме у врача обычно находится в... положении.

- <variant>около стола
- <variant>лицом к лицу
- <variant>напротив
- <variant>сидя, откинувшись назад
- <variant>через стол

<question>Если врач откидывается на спинку стула, у пациента может возникнуть мысль, что собеседник...

- <variant>скучает
- <variant>интересуется
- <variant>не понимает
- <variant>противится
- <variant>спокоен

<question>Если врач наклоняет голову вправо в процессе разговора, а пациент кивает, поддерживая разговор, пациент может подумать, что собеседник...

- <variant>интересуется
- <variant>скучает

<variant>не понимает

<variant>противится

<variant>спокоен

<question>Естественная, непринуждённая, одинаковая поза... характеризует.

<variant>психологический комфорт

<variant>скрытый стресс

<variant>неготовность к общению

<variant>неуверенность

<variant>психологическое неудобство

<question>Необычные, искусственные позы указывают на ...

<variant>стресс

<variant>психологический комфорт

<variant>хорошее настроение

<variant>уверенность

<variant>открытость к общению

<question>Необычные, искусственные позы указывают на

<variant>психологическое неудобство

<variant>психологический комфорт

<variant>хорошее настроение

<variant>уверенность

<variant>открытость к общению

<question>Психологический комфорт указывает на...

<variant>хорошее настроение

<variant>забывчивость

<variant>невнимательность

<variant>возбудимость

<variant>неуверенность

Составители:  ассистент кафедры Мусаева С.К.

 ассистент кафедры Раманова Г.Б.

Заведующий кафедрой к.м.н., профессор:  Жаркинбекова Н.А.

Протокол: № 1 от «27» 08 2025 г.

Тестовые вопросы программы для рубежного контроля 2

<question>Неудобство в общении можно определить по...

<variant>закрытой позе

<variant>улыбке

<variant>хорошему настроению

<variant>открытости к общению

<variant>дружескому рукопожатию

<question>Люди, которые закрыты, оценивают себя строго, пытаются быть осторожными в общении, не доверяют окружающим и смотрят с подозрением, обычно предпочитают... позу.

<variant>симметричную

<variant>асимметричную

<variant>естественную

<variant>искусственную

<variant>закрытую

<question>Открытые, жизнерадостные люди, готовые к общению, предпочитают... позу.

<variant>асимметричную

<variant>симметричную

<variant>естественную

<variant>искусственную

<variant>закрытую

<question>Позы, которые показывают уклонение от общения с окружающими, называют... позами.

<variant>закрытыми

<variant>симметричными

<variant>асимметричными

<variant>естественными

<variant>искусственными

<question>Перекрещённые руки на груди (поза Наполеона), скрещённые ноги, руки в карманах или за спиной, развёрнутый к собеседнику корпус, взгляд в пол, окно или книгу — это признаки... позы.

<variant>закрытой

<variant>симметричной

<variant>асимметричной

<variant>естественной

<variant>искусственной

<question>Если тело и голова направлены к собеседнику, а взгляд устремлён в лицо собеседника, это... поза.

<variant>открытая

<variant>асимметричная

<variant>естественная

<variant>искусственная

<variant>закрытая

<question>Самая информативная деталь на лице человека — это...

<variant>линия губ

<variant>лицо

<variant>лоб

<variant>глаза

<variant>выражение лица

<question>Оптимальное время для установления психологического контакта с другим человеком с помощью взгляда — это...

<variant>3 сек

<variant>1 мин

<variant>30 сек

<variant>2 мин

<variant>10 сек

<question>Взгляд длительностью 3-10 секунд, который ставит собеседника в неудобное положение, называется...

<variant>внимательным взглядом

<variant>«беглым взглядом»

<variant>агрессивным вызовом

<variant>добрым приглашением

<variant>эффективным психологическим контактом

<question>Взгляд длительностью более 10 секунд называется...

<variant>агрессивным вызовом



<variant>внимательным взглядом

<variant>«беглым взглядом»

<variant>добрым приглашением

<variant>эффективным психологическим контактом

<question>«Агрессивный вызов» — это...

<variant>взгляд, длительностью более 10 секунд

<variant>быстрый взгляд

<variant>открытая улыбка

<variant>взгляд снизу вверх

<variant>дружеское рукопожатие

<question>Собеседники, уверенные в себе, спокойные, с высокой самооценкой, в ходе общения с другими людьми смотрят на собеседника ..., чем люди с низкой самооценкой.

<variant>чаще

<variant>реже

<variant>одинаково

<variant>в зависимости от реакции окружающих

<variant>всегда

Тестовые задания для промежуточной аттестации (экзаменационная сессия)

1. <question>Возникновение неправильных, ложных рассуждений, логических ошибок в умозаключениях, несопоставимых ассоциативных связей и понятий, объединение противоречивых идей и образов с произвольной заменой одних понятий другими вследствие нарушений законов и правил логики.

<variant>паралогическое

мышление

<variant>вязкое

(обстоятельное) мышление

<variant>символическое

мышление

<variant>бегущее мышление

<variant>резонерствующее

мышление

2. <question>Обстоятельность мышления, склонность к детализации, неумение отделить основное от второстепенного, тугоподвижность, невозможность переключиться на что-то другое, застревание на одной теме.

<variant>

(обстоятельное) мышление

<variant>

мышление

<variant>

мышление

<variant> бегущее мышление

<variant> резонерствующее

мышление

3. <question>Замена общих понятий и образов отвлеченными знаками, важными для пациента, но нередко недоступными пониманию окружающим.

<variant> символическое

мышление

<variant>разорванное

мышление

<variant>вязкое

(обстоятельное) мышление

<variant>бегущее мышление

<variant>резонерствующее

мышление

4. <question>Возникновение ассоциаций часто по созвучию, течение их ускоренное и поверхностное, с преждевременным переходом к другой, но смежной теме.

<variant>бегущее мышление

вязкое

мышление

<variant>

разорванное

<variant>

символическое

мышление

<variant> бегущее мышление

<variant> резонерствующее

мышление

<variant>разорванное

мышление

<variant>вязкое

(обстоятельное) мышление

<variant>символическое

мышление

<variant>резонерствующее

мышление

5. <question>Склонность к пустым, бесплодным, основанным на поверхностных формальных аналогиях рассуждениям. Стремление к демагогии, бесплодному мудрствованию по любому поводу.

<variant> резонерствующее

мышление

<variant> разорванное

мышление

<variant> вязкое

(обстоятельное) мышление

<variant> символическое

мышление

<variant> бегущее мышление

6. <question> Изменения памяти, характерные для маниакального синдрома.

<variant> гипермнезия

<variant> фиксационная

амнезия

<variant> ретроградная амнезия



<variant> конфабуляции
<variant> псевдореминисценции
7. <question> Потеря способности восстановить в памяти события, предшествовавшие повреждению головного мозга.
<variant> ретроградная амнезия
<variant> фиксационная амнезия
<variant> гипермнезия
<variant> конфабуляции
<variant> псевдореминисценции
8. <question> Нарушение памяти, при котором пациент стремится рассказать в различных вариантах вымышленные события часто фантастического характера. Разновидность ложных воспоминаний.
<variant> конфабуляции
<variant> фиксационная амнезия
<variant> ретроградная амнезия
<variant> псевдореминисценции
<variant> гипермнезия
9. <question> Нарушение памяти, при котором у пациента нарушено определение времени действия реальных событий: события прошлого выдаются за настоящее.
<variant> псевдореминисценции
<variant> фиксационная амнезия
<variant> ретроградная амнезия
<variant> конфабуляции
<variant> гипермнезия
10. <question> Облегченные по сравнению с нормой воспоминания фактов прошлого опыта.
<variant> гипермнезия
<variant> фиксационная амнезия
<variant> ретроградная амнезия
<variant> конфабуляции
<variant> псевдореминисценции

11. <question> Отсутствие любых эмоциональных переживаний.
<variant> эмоциональная тупость
<variant> эмоциональная неадекватность
<variant> дисфория
<variant> амбивалентность
<variant> слабодушие
12. <question> Возникновение эмоций, противоположных соответствующим данной конкретной ситуации.
<variant> эмоциональная неадекватность
<variant> эмоциональная тупость
<variant> дисфория
<variant> амбивалентность
<variant> слабодушие
13. <question> Злобно-тоскливое настроение, часто возникающее пароксизмально.
<variant> дисфория
<variant> эмоциональная тупость
<variant> эмоциональная неадекватность
<variant> амбивалентность
<variant> слабодушие
14. <question> Появление в сознании одновременно двух противоположных чувств (например, любовь и ненависть)
<variant> амбивалентность
<variant> эмоциональная тупость
<variant> эмоциональная неадекватность
<variant> дисфория
<variant> слабодушие
15. <question> Отсутствие возможности удерживаться от чрезмерного и бурного проявления адекватных эмоций по любому незначительному поводу.
<variant> слабодушие
<variant> эмоциональная тупость

<variant> эмоциональная неадекватность
<variant> дисфория
<variant> амбивалентность
16. <question> Стремление к воровству при осознании нелепости и предосудительности подобного акта, сопровождающееся внутренним противоречием раздваиванием.
<variant> kleptomania
<variant> piromania
<variant> onomatomania
<variant> claustrophobia
<variant> dromomania
17. <question> Влечение к поджогам при наличии сопротивления воли и осознании безрассудства подобных фактов.
<variant> piromania
<variant> kleptomania
<variant> onomatomania
<variant> claustrophobia
<variant> dromomania
18. <question> Вторжение в сознание (помимо воли) желания запомнить имена, фамилии, название учреждений, городов, рек и навязчивое желание повторять их в слух.
<variant> onomatomania
<variant> kleptomania
<variant> piromania
<variant> claustrophobia
<variant> dromomania
19. <question> Боязнь стесненного пространства, закрытых помещений при критическом отношении к подобным переживаниям.
<variant> claustrophobia
<variant> kleptomania
<variant> piromania
<variant> onomatomania
<variant> dromomania
20. <question> Безудержное влечение к путешествиям, странствиям, бродяжничеству.
<variant> dromomania



<p><variant> клептомания <variant> пиромания <variant> ономатомания <variant> кляустрофобия 21. <question>Образование ложных суждений и умозаключений о том, что окружающие люди стали плохо относиться к больному. <variant> бред отношения <variant> бред особого значения <variant> бред физического воздействия <variant> бред нигилистический <variant> бред самоуничужения 22. <question>Возникновение болезненного искаженного отношения мысли к действительным, но случайным фактам, придание им иного, особенно важного смысла. <variant> бред особого значения <variant> бред отношения <variant> бред физического воздействия <variant> бред самоуничужения <variant> бред нигилистический 23. <question>Ложные умозаключения пациента о том, что кто-то подвергает его тело и мозг физическому воздействию на расстоянии. <variant> бред физического воздействия <variant> бред отношения <variant> бред нигилистический <variant> бред самоуничужения <variant> бред особого значения 24. <question>Образование ложных суждений и умозаключений о собственном</p>	<p>ничтожестве, греховности, порочности. <variant>бред самоуничужения <variant>бред отношения <variant>бред особого значения <variant>бред физического воздействия <variant>бред нигилистический 25. <question>Возникновение у пациента ложных идей о том, что у него сгнили или вообще отсутствуют некоторые части тела. <variant>бред нигилистический <variant>бред отношения <variant>бред особого значения <variant>бред физического воздействия <variant>бред самоуничужения 26. <question>Голоса «внутри головы», с которыми пациент ведет мысленный диалог. <variant>псевдогаллюциноз <variant>мантизм <variant>симптом открытости мысли <variant>мышечный псевдогаллюциноз <variant>чувство овладения 27.<question>Непроизвольный и неподчиняемый воле наплыв мыслей, воспоминаний, образов <variant>мантизм <variant>псевдогаллюциноз <variant>чувство овладения <variant>симптом открытости мысли <variant>мышечный псевдогаллюциноз 28. <question>Расстройство, при котором пациент считает, что его мысли доступны и известны всем окружающим. <variant>симптом открытости мысли <variant>псевдогаллюциноз <variant>мантизм <variant>чувство овладения</p>	<p><variant>мышечный псевдогаллюциноз 29. <question>Ощущение действия воли извне, управляющей душевным процессом пациента. <variant>чувство овладения <variant>симптом открытости мысли <variant>мышечный псевдогаллюциноз <variant>псевдогаллюциноз <variant>мантизм 30. <question>Расстройство восприятия, при котором пациент предъявляет жалобы на непреднамеренное произношение слов. <variant>мышечный псевдогаллюциноз <variant>псевдогаллюциноз <variant>мантизм <variant>симптом открытости мысли <variant>чувство овладения 31. <question>Появление беспричинного отрицательного отношения пациента ко всякому воздействию извне в виде отказа, сопротивления или выполнения действий, противоположных заданным: <variant> негативизм <variant> ступор <variant> каталепсия <variant> мышечная ригидность <variant> мутизм 32. <question>Состояние обездвиженности, оцепенения с частичным или полным мутизмом и отсутствием или снижением реакции на внешние раздражители, в том числе на болевые. <variant> ступор <variant> негативизм <variant> каталепсия <variant> мышечная ригидность <variant> мутизм</p>
--	--	---



33. <question>Сохранение приданного извне положения отдельных частей тела, «восковая гибкость».
- <variant> каталепсия
<variant> негативизм
<variant> ступор
<variant> мышечная ригидность
<variant> мутизм
34. <question>Отсутствие способности изменить положение отдельных частей тела из-за напряжения мышц.
- <variant> мышечная ригидность
<variant> негативизм
<variant> ступор
<variant> каталепсия
<variant> мутизм
35. <question>Полное молчание пациента при отсутствии нарушений со стороны речево-артикулярного аппарата.
- <variant> мутизм
<variant> негативизм
<variant> ступор
<variant> каталепсия
<variant> мышечная ригидность
36. <question>Повышенное беззаботное настроение, благодушие, сочетающееся с беспечностью, недостаточным критическим отношением к своему состоянию; безмятежное блаженство.
- <variant>эйфория
<variant> идеи величия
<variant> гипермнезия
<variant> двигательная активность
<variant> бегущее мышление
37. <question>Преувеличение собственных способностей и достоинств, убежденность в собственной исключительности.
- <variant> идеи величия
<variant> эйфория
<variant> гипермнезия
- <variant> двигательная активность
<variant> бегущее мышление
38. <question>Количественное нарушение памяти, при котором воспоминание облегчено и обострено.
- <variant> гипермнезия
<variant>эйфория
<variant>идеи величия
<variant>двигательная активность
<variant>бегущее мышление
39. <question>Особое внимание при сборе анамнеза у пациента с биполярным аффективным расстройством врач должен обращать на:
- <variant> всё вышеперечисленное
<variant> стрессовые изменения жизненных обстоятельств
<variant> аффективные расстройства в семейном анамнезе и прошлом пациента
<variant> попытки суицида
<variant> лекарственную зависимость или алкоголизм
40. <question>Ускоренное, но поверхностное течение мыслей с повышенной отвлекаемостью.
- <variant> бегущее мышление
<variant> эйфория
<variant> идеи величия
<variant> гипермнезия
<variant> двигательная активность
- <question>аггравация характеризуется...
- <variant> выдумыванием симптомов несуществующей болезни
<variant> чрезмерным снижением симптомов
<variant> чрезмерным усилением симптомов
<variant> полным непониманием симптомов болезни
<variant> воображаемым представлением симптомов
- <question>Диссимуляция — это...
- <variant> преднамеренное скрывание симптомов болезни
<variant> демонстрация симптомов несуществующей болезни
<variant> преувеличение симптомов болезни
<variant> преднамеренное уменьшение симптомов
<variant> непреднамеренное скрывание симптомов
- <question>Анозогнозия — это...
- <variant> непроизвольная реакция, отсутствие осознания болезни
<variant> преднамеренное скрывание симптомов болезни
<variant> уменьшение симптомов болезни
<variant> неспособность принять болезнь
<variant> преувеличение симптомов несуществующей болезни
- <question>Ипохондрия — это...
- <variant> чрезмерная озабоченность своим здоровьем
<variant> страх перед социальными последствиями болезни
<variant> отказ от выздоровления
<variant> получение выгоды от болезни
<variant> преувеличение симптомов болезни
- <question>Симуляция — это...
- <variant> прагматичное стремление извлечь выгоду из болезни
<variant> преувеличение симптомов болезни
<variant> преднамеренное уменьшение симптомов болезни
<variant> непреднамеренное скрывание симптомов болезни



<variant>страх перед социальными последствиями болезни
<question>К трудным пациентам относятся пациенты ...
<variant>с признаками депрессивных симптомов с суицидальными наклонностями
<variant>эпилептоидного типа
<variant>астено-невротического типа
<variant>гипертимного типа
<variant>истерического типа
<question>Доктор-пациент как пациент — это...
<variant>самый трудный и нестандартный пациент
<variant>пациент, который облегчает работу лечащего врача
<variant>такой же пациент, как и все другие
<variant>самый обычный пациент
<variant>самый сложный пациент
<question>Модель взаимоотношений между врачом и пациентом, в которой роль врача чётко отделена и основывается на авторитарном подходе, называется...
<variant>модель управления
<variant>модель партнёрства
<variant>модель управления-партнёрства
<variant>модель соглашения
<variant>модель подчинения
<question>Модель партнёрства в отношениях между врачом и пациентом называется...
<variant>психотерапия
<variant>клиника внутренних болезней
<variant>психотерапия и неврология
<variant>подавление
<variant>компромисс
<question>Решение конфликта через болезнь называется...

<variant>соматизация
<variant>интериоризация
<variant>гетероагрессия
<variant>аутоагрессия
<variant>доминирование
<question>Современная комплексная терапия для лечения пациентов включает следующие виды терапевтического воздействия:
<variant>биологическое, психологическое, социальное
<variant>социальное, психологическое
<variant>биологическое, социальное
<variant>биологическое, психологическое, коммуникативное
<variant>биологическое, психологическое, биохимическое
<question>Профессия врача НЕ обязывает к взаимодействию с...
<variant>сотрудниками бюро захоронений
<variant>пациентами
<variant>родственниками пациента
<variant>медицинскими работниками
<variant>руководством медицинских учреждений
<question>Небольшое качество хорошего врача - это
<variant>аккуратность
<variant>уважение
<variant>внимание к пациентам
<variant>любовь к своей профессии
<variant>заботливость
<question>Современное понимание эмпатии включает в себя... эмпатию.
<variant>деятельностную
<variant>эмоциональную
<variant>когнитивную
<variant>предсказательную
<variant>познавательную
<question>Эмпатия, основанная на механизмах

строгости и идентификации, называется...
<variant>эмоциональной
<variant>когнитивной
<variant>предсказательной
<variant>познавательной
<variant>деятельностной
<question>Эмпатия, основанная на интеллектуальных процессах сравнения и аналогий, называется...
<variant>когнитивной
<variant>предсказательной
<variant>интеллектуальной
<variant>эмоциональной
<variant>деятельностной
<question>Эмпатия, основанная на интуиции и способности делать предположения о другом человеке, называется...
<variant>предсказательной
<variant>деятельностной
<variant>эмоциональной
<variant>когнитивной
<variant>познавательной
<question>Эмпатические качества врача могут быть необходимы в случаях...
<variant>симулятивного поведения
<variant>агрессивного поведения
<variant>тревожности
<variant>истерии
<variant>невроза
<question>Эмоциональная устойчивость характеризуется...
<variant>сдержанностью и уверенностью
<variant>рефлексией
<variant>аффилиацией
<variant>тревожностью
<variant>истерией
<question>Анализ собственного психического состояния — это...
<variant>рефлексия
<variant>эмоциональная устойчивость



<p><variant>эмпатия <variant>чувствительность <variant>аффилиация <question>Адаптация врача к профессиональной деятельности длится... <variant>2 года <variant>всю жизнь <variant>в зависимости от личности врача <variant>3 месяца <variant>5 лет <question>Когнитивный аспект профессиональной адаптации — это... <variant>развитие профессиональных знаний, навыков и квалификаций <variant>профессиональная адаптация <variant>профессиональный имидж <variant>коммуникативная толерантность <variant>коммуникативные навыки <question>«Жизненное пространство» — это личная зона человека, регулируемая в процессе общения и защищающая его от вмешательства других. Это... <variant>межличностное <variant>социальное <variant>личное <variant>интимное <variant>общественное <question>У людей, чье детство прошло в большом городе, жизненное пространство по сравнению с жителями маленького города... <variant>меньше <variant>больше <variant>одинаково <variant>зависит от возраста <variant>всегда различно <question>Близость незнакомца часто вызывает... <variant>психологический стресс</p>	<p><variant>беспокойство <variant>депрессию <variant>агрессию <variant>безразличие <question>При явной интроверсии «жизненное пространство» будет... <variant>больше <variant>меньше <variant>одинаковым <variant>зависеть от возраста <variant>всегда разным <question>У человека с высокой жизненной энергией и хорошим настроением расстояние для других людей... <variant>меньше <variant>больше <variant>одинаковое <variant>зависит от возраста <variant>всегда различное <question>Межличностное расстояние в отношениях между собеседниками определяется... <variant>размером их «жизненного пространства» <variant>плотностью населения места проживания <variant>психологическим климатом <variant>профессиональной деятельностью <variant>состоянием здоровья <question>Если люди находятся в теплых, близких эмоциональных отношениях, расстояние между ними будет... <variant>меньше <variant>больше <variant>одинаковое <variant>зависеть от возраста <variant>всегда разное <question>Если социальный статус собеседника выше, расстояние будет... <variant>больше <variant>меньше <variant>одинаковое <variant>зависеть от возраста <variant>всегда разное</p>	<p><question>Когда необходимо провести сложную операцию, врач использует... расстояние. <variant>минимальное <variant>личное <variant>социальное <variant>общественное <variant>массовое <question>«Партнёрские отношения», то есть отношения, основанные на общей деятельности, с одинаковым социальным статусом людей — это... <variant>личное <variant>интимное <variant>социальное <variant>общественное <variant>массовое <question>Если пациент позволяет создать дистанцию при первой встрече с врачом, она будет составлять... <variant>200 см <variant>400 см <variant>500 см <variant>300 см <variant>100 см <question>Собрания, заседания проходят на расстоянии... <variant>массовом <variant>социальном <variant>личном <variant>интимном <variant>неформальном <question>Для взаимопонимания собеседников помогает... <variant>чтение психологического контекста их общения <variant>совершенствование профессиональных знаний и навыков <variant>создание чувства уверенности у пациента <variant>установление психологического контакта с пациентом <variant>самооценка врача</p>
--	--	---

<question>Нормальное поведение при встрече с незнакомым человеком — это...
 <variant>«лицом к лицу»
 <variant>«рядом»
 <variant>сидеть, откинувшись назад
 <variant>«через стол»
 <variant>наклониться к пациенту
 <question>Партнёрские отношения, психологический контакт, общие цели, которые преследуют коллеги, определяются положением...
 <variant>«рядом»
 <variant>«лицом к лицу»
 <variant>сидя, откинувшись назад
 <variant>«через стол»
 <variant>наклониться к пациенту
 <question>Отношения «начальник-подчинённый», где роли чётко определены, и необходимо точно следовать указаниям и приказам, характерны для положения...
 <variant>«через стол»
 <variant>лицом к лицу
 <variant>рядом
 <variant>сидя, откинувшись назад
 <variant>наклониться к пациенту
 <question>Пациент на приёме у врача обычно находится в... положении.
 <variant>около стола
 <variant>лицом к лицу
 <variant>напротив
 <variant>сидя, откинувшись назад
 <variant>через стол
 <question>Если врач откидывается на спинку стула, у пациента может возникнуть мысль, что собеседник...
 <variant>скучает
 <variant>интересуется
 <variant>не понимает

<variant>противится
 <variant>спокоен
 <question>Если врач наклоняет голову вправо в процессе разговора, а пациент кивает, поддерживая разговор, пациент может подумать, что собеседник...
 <variant>интересуется
 <variant>скучает
 <variant>не понимает
 <variant>противится
 <variant>спокоен
 <question>Естественная, непринуждённая, одинаковая поза... характеризует.
 <variant>психологический комфорт
 <variant>скрытый стресс
 <variant>неготовность к общению
 <variant>неуверенность
 <variant>психологическое неудобство
 <question>Необычные, искусственные позы указывают на ...
 <variant>стресс
 <variant>психологический комфорт
 <variant>хорошее настроение
 <variant>уверенность
 <variant>открытость к общению
 <question>Необычные, искусственные позы указывают на
 <variant>психологическое неудобство
 <variant>психологический комфорт
 <variant>хорошее настроение
 <variant>уверенность
 <variant>открытость к общению
 <question>Психологический комфорт указывает на...
 <variant>хорошее настроение
 <variant>забывчивость
 <variant>невнимательность
 <variant>возбудимость
 <variant>неуверенность

<question>Неудобство в общении можно определить по...
 <variant>закрытой позе
 <variant>улыбке
 <variant>хорошему настроению
 <variant>открытости к общению
 <variant>дружескому рукопожатию
 <question>Люди, которые закрыты, оценивают себя строго, пытаются быть осторожными в общении, не доверяют окружающим и смотрят с подозрением, обычно предпочитают... позу.
 <variant>симметричную
 <variant>асимметричную
 <variant>естественную
 <variant>искусственную
 <variant>закрытую
 <question>Открытые, жизнерадостные люди, готовые к общению, предпочитают... позу.
 <variant>асимметричную
 <variant>симметричную
 <variant>естественную
 <variant>искусственную
 <variant>закрытую
 <question>Позы, которые показывают уклонение от общения с окружающими, называют... позами.
 <variant>закрытыми
 <variant>симметричными
 <variant>асимметричными
 <variant>естественными
 <variant>искусственными
 <question>Перекрещённые руки на груди (поза Наполеона), скрещённые ноги, руки в карманах или за спиной, развёрнутый к собеседнику корпус, взгляд в пол, окно или книгу — это признаки... позы.
 <variant>закрытой
 <variant>симметричной
 <variant>асимметричной
 <variant>естественной



<p><variant>искусственной <question>Если тело и голова направлены к собеседнику, а взгляд устремлён в лицо собеседника, это... поза. <variant>открытая <variant>асимметричная <variant>естественная <variant>искусственная <variant>закрытая <question>Самая информативная деталь на лице человека — это... <variant>линия губ <variant>лицо <variant>лоб <variant>глаза <variant>выражение лица <question>Оптимальное время для установления психологического контакта с другим человеком с помощью взгляда — это... <variant>3 сек <variant>1 мин <variant>30 сек <variant>2 мин <variant>10 сек <question>Взгляд длительностью 3-10 секунд, который ставит собеседника в неудобное положение, называется... <variant>внимательным взглядом <variant>«беглым взглядом» <variant>агрессивным вызовом <variant>добрым приглашением <variant>эффективным психологическим контактом <question>Взгляд длительностью более 10 секунд называется... <variant>агрессивным вызовом <variant>внимательным взглядом <variant>«беглым взглядом» <variant>добрым приглашением <variant>эффективным психологическим контактом</p>	<p><question>«Агрессивный вызов» — это... <variant>взгляд, длительностью более 10 секунд <variant>быстрый взгляд <variant>открытая улыбка <variant>взгляд снизу вверх <variant>дружеское рукопожатие <question>Собеседники, уверенные в себе, спокойные, с высокой самооценкой, в ходе общения с другими людьми смотрят на собеседника ..., чем люди с низкой самооценкой. <variant>чаще <variant>реже <variant>одинаково <variant>в зависимости от реакции окружающих <variant>всегда <question>Частота взгляда зависит от... <variant>ощущения наблюдения <variant>позы <variant>жестов <variant>миимики <variant>характера личности <question>Во время общения, чтобы выразить настроение, состояние, суть беседы, определённое значение имеют звуки, которые называются... <variant>паралингвистическим и элементами <variant>словами <variant>микимикой <variant>жестами <variant>позой <question>К паралингвистическим признакам коммуникации НЕ относится... <variant>акцент <variant>уровень громкости голоса <variant>слова <variant>ритм <variant>шероховатость <question>Согласованность степени звучания и частоты в</p>	<p>слове воспринимается как знак ... <variant>конфликтных отношении <variant>хорошей психологической связи <variant>положительных отношений <variant>терпения <variant>сильного воздействия <question>Передача своим психическим особенностям и проблем другим людям называется... <variant>проекция <variant>контрпроекция <variant>перенос <variant>аффилиация <question>Пациент воспринимает лечащую женщину-врача как свою мать, она воспринимает ее так, как воспринимала свою мать в детстве, и ожидает такую же помощь — это называется... <variant>перенос <variant>проекция <variant>контрпроекция <variant>аффилиация <variant>сенситивность <question>Хронический синдром усталости связан с... <variant>постоянными эмоциональными связями с большим количеством людей <variant>ночными дежурствами <variant>работой по сменам <variant>чрезмерным принятием пациентов <variant>низкой зарплатой <question>Анализ хода болезни и результатов анамнеза в повседневной практике требует от медицинского работника... <variant>оценочного слушания <variant>активного слушания <variant>направленного слушания <variant>безоценочного слушания <variant>аргументации</p>
---	--	---



<question>В зависимости от состояния пациента, его индивидуальных психологических особенностей и зависимости от заболевания, различная продолжительность характерна для стадии
 <variant>аргументации
 <variant>оценочного слушания
 <variant>направленного слушания
 <variant>безоценочного слушания
 <variant>активного слушания
 <question>Психологический метод "Если вы не можете бросить курить, я вас понимаю, потому что это могут победить только очень сильные люди" называется...
 <variant>вызов
 <variant>выбор
 <variant>сократический диалог
 <variant>достоинство
 <variant>дефицит
 <question>Психологический метод, когда пациента ставят в ситуацию выбора (например, очередь на консультацию или исследование), чтобы обойти собственно психологические жалобы пациента — это метод...
 <variant>дефицита
 <variant>слушания
 <variant>сократического диалога
 <variant>достоинства
 <variant>вызова
 <question>Модель управления НЕ применяется в...
 <variant>психотерапии
 <variant>клинике внутренних заболеваний
 <variant>акушерстве и гинекологии
 <variant>стоматологии
 <variant>хирургии
 <question>Оценка своего состояния без преувеличений, разумная оценка — это тип восприятия...

<variant>гармоничный
 <variant>тревожный
 <variant>ипохондрический
 <variant>меланхолический
 <variant>апатический
 <question>Ожидание возможных отклонений или опасности, беспокойство о течении болезни — это тип восприятия...
 <variant>тревожный
 <variant>гармоничный
 <variant>ипохондрический
 <variant>меланхолический
 <variant>апатический
 <question>Полное безразличие к своей судьбе, последствиям заболевания и результатам лечения — это тип восприятия...
 <variant>апатический
 <variant>гармоничный
 <variant>тревожный
 <variant>ипохондрический
 <variant>меланхолический
 <question>К стратегии пациента НЕ относится...
 <variant>депрессия
 <variant>печаль
 <variant>поглощение болезнью
 <variant>искусственность
 <variant>неадекватность
 <question>Пациент, который полностью адаптирован к внешней среде, имеет много знакомых, интересуется многими вещами, гибок в отношениях с людьми и привлекает внимание большинства — это...
 <variant>экстраверт
 <variant>интроверт
 <variant>аудиал
 <variant>визуал
 <variant>кинестетик
 <question>С экстравертом лучше начать взаимодействие с...
 <variant>создания
 эмоциональной связи
 <variant>установления
 информационной связи

<variant>беседы
 <variant>безоценочного слушания
 <variant>аргументации
 <question>Жизненные явления, которые оказывают влияние на важнейшие аспекты существования человека и приводят к глубокому психологическому стрессу, называются...
 <variant>психический шок
 <variant>болезнь
 <variant>депрессия
 <variant>тревога
 <variant>сенситивность
 <question>Ярость, возникающая при сильной боли, неудаче или неэффективности лечения, называется...
 <variant>невростенической
 <variant>гармоничной
 <variant>тревожной
 <variant>ипохондрической
 <variant>меланхолической
 <question>Беспокойство по поводу незначительных отклонений, неудач в лечении или мелких жизненных трудностей — это тип восприятия...
 <variant>обсессивно-фобический
 <variant>невростенический
 <variant>тревожный
 <variant>ипохондрический
 <variant>меланхолический
 <question>Сильная озабоченность тем, как окружающие воспринимают информацию о своем заболевании, — это тип восприятия...
 <variant>сенситивный
 <variant>тревожный
 <variant>ипохондрический
 <variant>меланхолический
 <variant>невростенический
 <question>Попытки привлечь внимание близких через демонстрацию своего горя и

<p>трудностей — это тип восприятия...</p> <p><variant>эгоцентрический</p> <p><variant>тревожный</p> <p><variant>ипохондрический</p> <p><variant>меланхолический</p> <p><variant>невростенический</p> <p><question>Безразличие к болезни и лечению — это тип восприятия...</p> <p><variant>апатичный</p> <p><variant>невростенический</p> <p><variant>тревожный</p> <p><variant>ипохондрический</p> <p><variant>эйфорический</p> <p><question>Столкновение двух противоположных тенденций в структуре личности называется...</p> <p><variant>конфликт</p> <p><variant>фрустрация</p> <p><variant>психологическая защита</p> <p><variant>конфронтация</p> <p><variant>конформизм</p> <p><question>Способ преодоления негативных эмоциональных состояний из-за нерешенного внутреннего конфликта называется...</p> <p><variant>психологическая защита</p> <p><variant>рефлексия</p> <p><variant>конформизм</p> <p><variant>фрустрация</p> <p><variant>аутоагрессия</p> <p><question>Избавление от неприятных, неэффективных мыслей и желаний из сознания называется...</p> <p><variant>отрицание</p> <p><variant>вытеснение</p> <p><variant>проекция</p> <p><variant>замещение</p> <p><variant>сдвиг</p> <p><question>Психологические способы поведения, достигнутые и закрепленные в личной жизни и тренировках, называются...</p> <p><variant>рефлекс</p> <p><variant>привычка</p>	<p><variant>инстинкт</p> <p><variant>фрустрация</p> <p><variant>импринтинг</p> <p><question>Основателем гуманистической директивной терапии является...</p> <p><variant>Фрейд</p> <p><variant>Юнг</p> <p><variant>Адлер</p> <p><variant>Роджерс</p> <p><variant>Периз</p> <p><question>К действиям терапевта, обеспечивающим его конгруэнтность и эффективность, НЕ относится...</p> <p><variant>критические действия</p> <p><variant>участие в разговоре в достаточной степени</p> <p><variant>адекватный язык жестов</p> <p><variant>визуальный контакт</p> <p><variant>вербальный контакт</p> <p><question>Для установления эффективной связи с пациентом достаточно присоединиться к нему на уровне...</p> <p><variant>продуктивной связи</p> <p><variant>формальной связи</p> <p><variant>близости</p> <p><variant>скрытости</p> <p><variant>формы мышления</p> <p><question>Зависимость восприятия от внутренних чувств называется...</p> <p><variant>интуиция</p> <p><variant>апперцепция</p> <p><variant>симпатия</p> <p><variant>эмпатия</p> <p><variant>рефлексия</p> <p><question>Процесс самопознания называется...</p> <p><variant>самовосприятие</p> <p><variant>интуиция</p> <p><variant>симпатия</p> <p><variant>рефлексия</p> <p><variant>эмпатия</p> <p><question>Процесс переноса субъекта своих личных качеств и состояния на внешние объекты называется...</p>	<p><variant>перенос</p> <p><variant>регресс</p> <p><variant>идентификация</p> <p><variant>проекция</p> <p><variant>отрицание</p> <p><question>Оценка возможностей и качеств личности, а также ее места среди других людей является ...</p> <p><variant>самооценка</p> <p><variant>самопознание</p> <p><variant>концепция «я»</p> <p><variant>уровень намерений</p> <p><variant>идеал «я»</p> <p><question>Стремление к действию, к цели деятельности, которое ощущается и не ощущается, называется ...</p> <p><variant>мотивация</p> <p><variant>концепция «я»</p> <p><variant>потребность</p> <p><variant>ценность</p> <p><variant>направленность</p> <p><question>Личные и психологические особенности, которые проявляются в деятельности человека и являются условием успешного выполнения называются ...</p> <p><variant>характер</p> <p><variant>направленность</p> <p><variant>интересы</p> <p><variant>способности</p> <p><variant>темперамент</p> <p><question>Сильное эмоциональное состояние стресса, возникающее из-за препятствий на пути к важной потребности связано с ...</p> <p><variant>психической травмой</p> <p><variant>оценением</p> <p><variant>фрустрацией</p> <p><variant>состоянием «дел-сал»</p> <p><variant>депривацией</p> <p><question>В ходе личной анкеты испытуемый часто задает вопросы, замечая уровень своих тестовых утверждений, это поведение указывает на ...</p>
---	---	--



<variant>желание показать себя с хорошей стороны
<variant>выделение своих недостатков
<variant>низкий интеллектуальный и культурный уровень
<variant>использование неверных эталонов
<variant>потребность в достижениях
<question>Основная задача врача на этапе коррекции - ...
<variant>установить эмоциональную связь с пациентом
<variant>оказать эмоциональную поддержку пациенту
<variant>сообщить пациенту точный диагноз
<variant>сообщить прогноз заболевания
<variant>наблюдать за невербальным поведением пациента
<question>Склонность, направленная на снижение патогенного эмоционального стресса и защиту от тяжелых чувств и мыслей, а также от развития психологических и физиологических отклонений называются ...
<variant>психологические защитные механизмы
<variant>копинг-механизмы
<variant>компенсаторные психологические механизмы
<variant>адаптационные психологические реакции
<variant>эмоциональные и рациональные
<question>Более продуктивными копинг-стратегиями пациента считаются ...
<variant>поиск партнерской и активной поддержки
<variant>эмоциональное успокоение и отвлечение

<variant>отвлечение и альтруизм
<variant>альтруизм и оптимизм
<variant>гипертимические признаки
<question>Клинический психолог оказывает психологическую помощь в учреждениях общего соматического лечения и профилактики:
<variant>совместно с врачом-ординатором
<variant>самостоятельно
<variant>совместно с психиатром
<variant>совместно с психиатром и психотерапевтом
<variant>совместно с психотерапевтом
<question>Психотерапевт и клинический психолог, работая с пациентом в невротическом состоянии, действуют ...
<variant>клинический психолог проводит психокоррекцию, а психотерапевт - психотерапию
<variant>клинический психолог проводит психодиагностику, а психотерапевт - медикаментозное лечение
<variant>психотерапевт проводит психотерапию, а клинический психолог - психодиагностику
<variant>психотерапевт и клинический психолог совместно проводят психотерапию с учетом разных направлений и целей
<variant>психотерапевт проводит психокоррекцию, а клинический психолог - лечебные мероприятия
<question>Психологические игры ...
<variant>вызывают агрессию
<variant>формируют и сохраняют «свой образ» перед другими

<variant>создают искренние и открытые отношения между людьми
<variant>снимают напряжение и поддерживают соматическое и психическое равновесие
<variant>усиливают внимание
<question>Сознание - это расширение чувств, интеграция противоречий, работа с воображением, принятие ответственности на себя, преодоление препятствий; это основной компонент метода в психотерапии называется ...
<variant>психотерапия индивидуальных препятствий Адлера
<variant>аналитическая психотерапия Юнга
<variant>психоанализ Фрейда
<variant>гештальт-терапия
<variant>гуманистическая психотерапия Роджерса
<question>Основой рациональной психотерапии ... является.
<variant>объяснение
<variant>убеждение
<variant>приведение примеров
<variant>коррекция личности
<variant>деонтология
<question>Уровень интеллектуальности пациента исследуется ...
<variant>через определение интеллектуального индекса
<variant>с помощью личных опросников
<variant>проективными методами
<variant>методами Люшера
<variant>методами Роршаха
<question>Тест Люшера используется для оценки ...
<variant>актуальных эмоциональных стрессов
<variant>ясности интеллектуального развития
<variant>особенностей мышления
<variant>ясности сознания



<variant>степени мнестических отклонений
<question>Психологический механизм защиты, характеризующийся стремлением не принимать реальность беспокоящей ситуации называется ...
<variant>отрицание (непризнание)
<variant>вытеснение
<variant>проекция
<variant>рационализация
<variant>сублимация
<question>Психологический защитный процесс, проявляющийся в ошибочном восприятии внутреннего явления так, как если бы оно действительно происходило, называется ...
<variant>рационализация
<variant>сублимация
<variant>проекция
<variant>отрицание (непризнание)
<variant>вытеснение
<question>Формирование истерических черт поведения чаще всего связано с типом воспитания ...
<variant>«семейный кумир»
<variant>высокая опека
<variant>низкая опека
<variant>строгий
<variant>парадоксальная коммуникация
<question>Способ преодоления негативного эмоционального состояния, связанного с внутренним конфликтом без решения называется ...
<variant>внутренний личностный конфликт
<variant>психологическая коррекция
<variant>психологическая защита
<variant>фрустрация
<variant>стресс
<question>Избавление от нежелательных,

неэффективных желаний и мыслей из сознания называется ...
<variant>вытеснение
<variant>замещение
<variant>отрицание
<variant>рационализация
<variant>сублимация
<question>Энергичность, скорость, склонность к общению, стремление к руководству, отсутствие критического взгляда на себя, высокие интересы, склонность к риску – это признаки ... типа акцентуации характера.
<variant>эмоционального
<variant>педантичного (ригидность)
<variant>гипертимного
<variant>демонстративного
<variant>гипотимного
<question>Стремление постоянно находиться в центре внимания, склонность к хвастовству, лжи, артистичности, искусственному поведению – это отрицательные качества, характерные для акцентуации ... характера.
<variant>демонстративного
<variant>педантичного
<variant>циклоидного
<variant>гипертимного
<variant>гипотимного
<question>Постоянное низкое настроение, апатия, склонность к грусти и одиночеству, неспособность к общению, пессимистический взгляд характерны для акцентуации характера...
<variant>гипотимного
<variant>гипертимного
<variant>тревожного
<variant>эйфорического
<variant>демонстративного
<question>Неуверенность в себе, застенчивость, склонность к сомнениям, пессимизму, чрезмерная

трусость, страх – такие качества характерны для акцентуации... характера
<variant>тревожного
<variant>эйфорического
<variant>циклоидного
<variant>стагнационного
<variant>гипертимного
<question>Чрезмерная чувствительность, доброта, милосердие, склонность сопереживать другим – такие качества характерны для акцентуации ... природы.
<variant>эмотивной
<variant>циклоидной
<variant>стагнационной
<variant>педантичной
<variant>демонстративной
<question>Ригидность убеждений, устойчивость взглядов, субъективность в оценке жизненных явлений, подозрительность, недоверие к другим, скептицизм – такие качества характерны для акцентуации ... природы
<variant>педантичной
<variant>стагнационной
<variant>эмотивной
<variant>тревожной
<variant>демонстративной
<question>Чрезмерная вспыльчивость, импульсивность, агрессивность, раздражительность, конфликтность – такие качества характерны для акцентуации ... характера.
<variant>возбудимого
<variant>педантичного
<variant>эмотивного
<variant>стагнационного
<variant>тревожного
<question>Чрезмерная нестабильность настроения характерна для акцентуации ... поведения, на которую влияют самоощущение, сон, аппетит, работоспособность и способность к общению.



<variant>дистимного
 <variant>циклоидного
 <variant>возбудимого
 <variant>стагнационного
 <variant>педантичного
 <question>Формирование
 очень ценных идей,
 аффективная вспычивость,
 жестокость, мстительность –
 такие качества характерны для
 акцентуации ... природы.
 <variant>паранойальной
 <variant>дистимной
 <variant>стагнационной
 <variant>возбудимой
 <variant>гипертимной
 <question>Чрезмерная
 чувствительность, доброта,
 страх, неуверенность в себе
 характерны для
 акцентуации... природы.
 <variant>гипотимной
 <variant>возбудимой
 <variant>гипертимной
 <variant>эйфоричной
 <variant>паранойальной
 <question>Признак поведения,
 НЕ относящийся к защитным
 механизмам:
 <variant>фрустрация
 <variant>вытеснение
 <variant>рационализация
 <variant>отрицание
 (непризнание)
 <variant>интеллектуальная
 защита
 <question>Термин, который
 используется для обозначения
 защиты от опасного объекта
 через его распознавание:
 <variant>идентификация
 <variant>вытеснение
 <variant>проекция
 <variant>рационализация
 <variant>регрессия
 <question>К
 психосоматическим
 расстройствам НЕ относятся ...
 <variant>конверсионные
 симптомы
 <variant>психосоматические
 симптомы

<variant>функциональные
 симптомы
 <variant>психосоматозы
 <variant>неврастения
 <question>В группу
 соматоформных расстройств
 НЕ входит ...
 <variant>деонтологические
 болезни
 <variant>ипохондрические
 расстройства
 <variant>соматоформные
 вегетативные дисфункции
 <variant>неврастения
 <variant>соматизированные
 расстройства
 <question>Основной целью
 психозащитного действия
 является ...
 <variant>уменьшение тревоги,
 избегание требований
 реальной жизни, поддержание
 достаточного уровня
 самооценки
 <variant>решение проблемы,
 стоящей перед личностью
 <variant>расслабление,
 улучшение настроения
 <variant>уменьшение
 «обратной энергии»
 <variant>решение проблемы
 <question>Человек, зависимый
 от алкоголя, но не признающий
 свою проблему использует
 защиту ...
 <variant>отрицание
 (непризнание)
 <variant>примитивная
 изоляция
 <variant>особый контроль
 <variant>проекция
 <variant>интеракция
 <question>У маленьких детей
 уверенность в том, что их
 родители обладают особыми
 магическими
 способностями называется ...
 <variant>примитивная
 идеализация
 <variant>особый контроль
 <variant>проекция

<variant>примитивная
 изоляция
 <variant>интроекция
 <question>Методика Векслера
 осуществляется через ...
 <variant>исследования
 интеллекта
 <variant>исследования памяти
 <variant>исследования
 человека
 <variant>исследования уровня
 усвоения
 <variant>исследования
 невротического уровня
 <question>Апперцепция - это ...
 .
 <variant>зависимость
 восприятия от предыдущего
 психического опыта
 <variant>строгое восприятие
 пространства памяти
 <variant>эмоциональная
 реакция
 <variant>тип памяти
 <variant>сознание
 <question>Оценка личности
 себя, своих возможностей,
 качеств и сравнение с
 другим называется ...
 <variant>самооценка
 <variant>самосознание
 <variant>концепция «я»
 <variant>уровень стремления
 <variant>эйфория
 <question>Тип реакции на
 проявления в начале и в
 конце называется ...
 <variant>психический процесс
 <variant>агрессия
 <variant>психическое
 проявление
 <variant>психическое
 состояние
 <variant>трансовое состояние
 <question>В психологическом
 тестировании является ...
 противопоказанием.
 <variant>употребление
 психотропных веществ
 <variant>наличие телесных
 заболеваний



<p><variant>наличие в анамнезе психических расстройств</p> <p><variant>алкоголизм</p> <p><variant>проживание в местах, где проводятся тесты</p> <p><question>К</p> <p>подготовительному этапу волевого воздействия НЕ относится ...</p> <p><variant>самооценка</p> <p><variant>понимание цели</p> <p><variant> понимание смысла цели</p> <p><variant>понимание достижимости цели</p> <p><variant>принятие решения</p> <p><question>Объективный образ субъективного мира называется ...</p> <p><variant>психика</p> <p><variant>объективная реальность</p> <p><variant>психологическое проявление</p> <p><variant>творчество</p> <p><variant>агрессия</p> <p><question>Психологический подход, закрепленный в личной жизни и упражнениях называется ...</p> <p><variant>навык</p> <p><variant>рефлекс</p> <p><variant>бессознательное чувство</p> <p><variant>фрустрация</p> <p><variant>импринтинг</p> <p><question>Столкновение двух противоположных тенденций в структуре личности называется ...</p> <p><variant>конфликт</p> <p><variant>фрустрация</p> <p><variant>психологическая защита</p> <p><variant>конфронтация</p> <p><variant>конформизм</p> <p><question>Уверенность человека в своей правоте, подтвержденная соответствующими аргументами и фактами называется ...</p>	<p><variant>уверенность</p> <p><variant>сознание</p> <p><variant>ориентация</p> <p><variant>завышенная самооценка</p> <p><variant>эгоцентризм</p> <p><question>Групповое противоречивое поведение, характеризующееся повышением агрессивных проявлений и снижением ответственности за происходящее, называется... .</p> <p><variant>результат группы</p> <p><variant>результат руководства группы</p> <p><variant>результат социального заражения</p> <p><variant>результат социальной поддержки</p> <p><variant>результат неопределенности</p> <p><question>Вероятность развития инновационного противоречия НЕ увеличивается</p> <p><variant>когда в инновационном процессе участвует небольшое количество людей</p> <p><variant>если процесс не обеспечен информацией</p> <p><variant>в процессе стремительной инновации</p> <p><variant>в радикальном обновлении</p> <p><variant>в масштабных новшествах</p> <p><question>В исследовании противоречий методы сублимации, проекции, рационализации, вытеснения и регрессии относятся</p> <p><variant>к биопсихологической трактовке внутриспихического конфликта</p> <p><variant>к неучтенному научному направлению исследования противоречий</p> <p><variant>к демонстрации противоречия «родительского сценария жизни»</p>	<p><variant>к удовлетворению, вызываемому фрустрацией других, сопротивлению «невротическим потребностям»</p> <p><variant>к бихевиоральной трактовке внутриспихического конфликта</p> <p><question>Компонент структуры суицидного поведения, состоящий из суицидных мыслей или действий называется ...</p> <p><variant>аффективный</p> <p><variant>исполнительный</p> <p><variant>параноидный</p> <p><variant>паранойяльный</p> <p><variant>ориентационный</p> <p><question>В соответствии с основным критерием разрешения противоречия, вариант финала</p> <p><variant>подчинение правилам совместного использования объекта</p> <p><variant>прекращение противоречия</p> <p><variant>разделение объекта противоречия</p> <p><variant>одностороннее или двустороннее устранение</p> <p><variant>победа одной стороны</p> <p><question>Укажите как правильно поступить, если вас хотят использовать с помощью запроса «войти в ваше положение»</p> <p><variant>не брать на себя ответственность</p> <p><variant>четко объяснить, что вы можете решить проблему сами</p> <p><variant>выразить соболезнования другу и убедить его, что вы его поддержите</p> <p><variant>спросить у друга, что для него самое трудное</p> <p><variant>отложить выполнение общей работы на позднее время</p>
--	--	--



<question>Основным условием предотвращения противоречий, состоящим из перечисления всех социальных проблем и формирования нормативных действий является ...

<variant>соблюдение взаимного баланса
<variant>соблюдение баланса совместных действий
<variant>равновесие самооценки и внешней оценки
<variant>соблюдение равенства ролей

<variant>соблюдение разбросанного равновесия
<question>Асимметричные отношения людей без хорошей обратной связи называются ...

<variant>выполнение социального запроса
<variant>дуальные отношения
<variant>иллюзорные отношения
<variant>ревизионные отношения
<variant>управленческие отношения

<question>Процесс, облегчающий взаимодействие партнеров и повышающий эффективность действий группы в условиях противоречия называется ...

<variant>фасилитацией
<variant>синхронизацией
<variant>апперцепцией
<variant>медиацией
<variant>коммуникацией

<question>Человек, обладающий специальными знаниями и обеспечивающий окончательный выбор между оппонентами, конструктивное разрешение противоречия, это ...

<variant>медиатор
<variant>помощник
<variant>арбитр
<variant>третейский суд
<variant>наблюдатель

<question>Эмоциональное выгорание — это синдром, состоящий из множества симптомов и их проявлений, кроме ...

<variant>повышения психической активности
<variant>эмоционального, физического и умственного истощения
<variant>снижения аппетита и обострения хронических заболеваний
<variant>головной боли, гипертонии, нарушений сна
<variant>психосоматических и психовегетативных расстройств поведения
<question>Особенности психики, повышенной скорости нервных реакций, связь с окружающей средой ... это.

<variant>динамичность
<variant>инертность
<variant>устойчивость
<variant>темперамент
<variant>лабильность
<question>Метод, используемый для самооценки, который применяется для описания здоровья и умственных способностей
<variant>метод Дембо-Рубинштейна
<variant>метод Роршаха
<variant>миннесотский многопрофильный личностный опросник (MMPI)
<variant>тест Люшера
<variant>метод фрустрации Розенцвейга

<question>На приеме у динамического психотерапевта пациентка сообщает о своих симптомах и выражает симпатию к врачу, тактика последнего...

<variant>сделать вид, что не замечает

<variant>не обращать внимания во время лечения, а затем поговорить позже
<variant>объяснить пациенту в начале лечения

<variant>сделать симпатию пациента темой обсуждения
<variant>провести семейную психотерапию
<question>По Юнгу архетипы показывают «первичные образы», которые существуют в каждом человеке, и они составляют...

<variant>индивидуальное бессознательное
<variant>совершенное бессознательное
<variant>коллективное бессознательное
<variant>личное бессознательное
<variant>высшее бессознательное

<question>В кабинет психотерапевта сначала вошла мать 4-летнего ребёнка, затем отец. На предложение психотерапевта сесть на стулья семья отреагировала так: мать строго приказала ребёнку сидеть рядом с психотерапевтом, сама села в 3 метрах позади ребёнка, а отец сидел ещё дальше, на 2 метра от матери. Был сформирован семейный треугольник. Такое расположение...

<variant>показывает, что они привыкли жить в большом доме
<variant>означает, что родители доверяют воле детей
<variant>указывает на эмоциональное отстранение
<variant>гарантирует психологическую безопасность в кабинете
<variant>означает, что они привыкли жить в маленькой квартире



<question>Чувства удлинения, укорочения и искривления конечностей, а также изменение восприятия «Я», проявляющееся в виде психосенсорных интеро- и проприоцептивных нарушений, это...

<variant>синдром нарушения схемы тела

<variant>галлюцинозный синдром

<variant>деперсонализация

<variant>дереализация

<variant>симптом

Ашарффенбурга

<question>Метод психологии, который позволяет получать информацию об объекте, отвечая на заранее подготовленные и целенаправленные вопросы в письменной форме...

<variant>тест

<variant>беседа

<variant>интервью

<variant>социометрия

<variant>аннотирование

<question>Фиксационная амнезия характерна для ...

<variant>Корсаковского

синдрома

<variant>психоорганического

синдрома

<variant>астенического

синдрома

<variant>депрессивного

синдрома

<variant>маниакального

синдрома

<question>Нарушение памяти и интеллекта НЕ характерно для...

<variant>неврастении

<variant>эпилепсии

<variant>прогрессирующего

паралича

<variant>церебрального

атеросклероза

<variant>шизофрении

<question>Конфабуляция НЕ бывает при...

<variant>неврозах

<variant>травматическом

повреждении мозга

<variant>сосудистом

повреждении головного мозга

<variant>мозговом сифилисе

<variant>алкогольной

энцефалопатии

<question>Отличие дисфории от помутнения сознания...

<variant>дезориентация в пространстве и времени

<variant>жестокый аффект

<variant>агрессия

<variant>появление

пароксизмов

<variant>появление в эпилепсии

<question>Помутнение сознания при сопоре НЕ характеризуется...

<variant>ориентацией в личности

<variant>ориентацией во времени

<variant>отсутствием речевого контакта

<variant>сохраненной ориентацией

<variant>сохранением подвижности и мимических

реакций при сильном возбуждении

<question>Различие между делирием и онейроидным помутнением сознания

заключается в...

<variant>аллопсихической дезориентации

<variant>фантастическом беспокойстве

<variant>реальных зрительных галлюцинациях

<variant>двигательном возбуждении

<variant>частичной амнезии

<question>Пациент говорит, что он «видит за стеной своим внутренним взглядом» — это...

<variant>псевдогаллюцинации

<variant>сенестопатии

<variant>настоящие

галлюцинации

<variant>вербальные

галлюцинации

<variant>пэрейдолические иллюзии

<question>Пациент утверждает, что его голова уменьшилась до размера грецкого ореха — это...

<variant>нарушение схемы тела

<variant>сенестопатии

<variant>настоящие

галлюцинации

<variant>вербальные

галлюцинации

<variant>псевдогаллюцинации

<question>Пациент, глядя в зеркало, говорит:

«Удивительно. Это мое лицо, но внутренний мир не мой» — это...

<variant>деперсонализация

<variant>сенестопатия

<variant>дереализация

<variant>парейдолия

<variant>псевдогаллюцинации

<question>Пациент после разговора с начальником

жалуется на внезапное исчезновение всех видов

чувствительности в нижней части тела — это...

<variant>истерическая

анестезия

<variant>нарушение схемы тела

<variant>псевдогаллюцинация

<variant>гиперестезия

<variant>повреждение

передней центральной

извилины

<question>Доктор во время

опроса жалоб пациента, его

состояния и здоровья слышит

от пациента повторение фразы:

«Меня ударили по голове...

Меня ударили по голове...» —

это...

<variant>персеверация



<p><variant>систематическое мышление <variant>дублирующие мысли <variant>резонерское мышление <variant>паралогическое мышление <question>Студент четко записывает свои мысли на бумаге, но стесняется, когда кто-то смотрит. Перед публичным выступлением, чтобы побороть страх, он должен 5 раз ущипнуть себя за колено — это... <variant>ритуалы <variant>символические мысли <variant>ипохондрическая бредовость <variant>чрезмерно ценные мысли <variant>психические автоматизмы <question>Вера в наличие физического дефекта — это... <variant>дисморфоманический бред <variant>бред самообвинения <variant>искусственный бред <variant>всеобъемлющий бред <variant>влияющий бред <question>Пациент в возбуждении говорит: «Это неправильно! Люди как бронзовые солдаты, а их дома как картонные коробки» — это... <variant>дереализация <variant>гиперестезия <variant>сенестопатия <variant>псевдогаллюцинация <variant>гипостезия <question>У пациента одновременно наблюдаются любовь, страсть и одновременно раздражение, ненависть к матери — это... <variant>амбивалентность <variant>полипрагмазия <variant>лабильность <variant>дисфория <variant>сенестопатия</p>	<p><question>Повышенная двигательная активность наблюдается при <variant>маниакальном возбуждении <variant>гебефреническом возбуждении <variant>кататоническом возбуждении <variant>гипертимии <variant>лабильности <question>Негативизм — это... <variant>кататонический ступор <variant>депрессивный синдром <variant>маниакальное возбуждение <variant>психогенный ступор <variant>гебефренический синдром <question>Мысли о самообвинении встречаются при ... <variant>депрессивном синдроме <variant>кататоническом ступоре <variant>липкости <variant>навязчивых мыслях <variant>эксплозивности <question>Пациент, 74 года, не узнает своего врача, не может найти свою палату и кровать, не знает, приходила ли его дочь. У пациента наблюдается нарушение памяти по типу... <variant>фиксационной амнезии <variant>репродукционной амнезии <variant>антероградной амнезии <variant>ретроградной амнезии <variant>криптомнезии <question>Состояние, сопровождающееся сохранением самоощущения и двигательным возбуждением, образным бредом, иллюзиями, зрительными галлюцинациями, характерное для неясной</p>	<p>галлюцинаторной формы острого психоза... <variant>делирий <variant>галлюциноз <variant>алкогольный паранойд <variant>алкогольная энцефалопатия <variant>энцефалопатия Гайе-Вернике <question>К симптомам расстройства настроения НЕ относится... <variant>гипобулия <variant>гипертимия <variant>апатия <variant>тревога <variant>эйфория <question>На экзамене студент сильно нервничал, не мог вспомнить название лекарства. Когда он вышел из кабинета экзаменатора, внезапно вспомнил название лекарства. У студента наблюдается нарушение памяти, подобное... <variant>фиксационной амнезии <variant>прогрессирующей амнезии <variant>симптом «De javue» <variant>ретроградной амнезии <variant>антероградной амнезии <question>После суточного дежурства врач очень устал. По дороге домой в трамвае борется с сонливостью. Когда он вышел на своей остановке, он понял, что находится в другом месте, окружающие дома, улицы, магазины показались ему незнакомыми. Какое нарушение памяти наблюдается у врача? <variant>синдром помрачнения сознания <variant>прогрессирующая амнезия <variant>псевдореминисценция <variant>фиксационная амнезия</p>
--	---	--



<variant>ретроградная амнезия
<question>Для дереализации характерно...
<variant>ложное восприятие окружающей среды
<variant>потеря чувства «Я»
<variant>восприятие без реальных объектов
<variant>отчуждение от окружающей среды
<variant>ошибочное восприятие окружающей среды
<question>Признак, НЕ свойственный истинным галлюцинациям...
<variant>«искусственные», «преднамеренно сделанные» мысли вызывают беспокойство
<variant>настоящая проекция
<variant>идентификация с реальным объектом
<variant>внешняя проекция
<variant>тяга к краже
<question>Нарушения, НЕ относящиеся к изменениям восприятия...
<variant>абулия
<variant>парастезия
<variant>анестезия
<variant>гиперестезия
<variant>сенестопатия
<question>Нарушение восприятия, при котором объект воспринимается без реального существования, называется...
<variant>галлюцинацией
<variant>сенестопатией
<variant>иллюзии
<variant>метаморфопсией
<variant>дисморфопсией
<question>Ощущения жжения, давления, растяжения, исходящие от внутренних органов называются...
<variant>сенестопатией
<variant>гиперестезией
<variant>дисморфопсией
<variant>иллюзией
<variant>гипнагогической галлюцинацией

<question>Галлюцинации, вызванные внушением, характерны для...
<variant>шизофрении
<variant>интоксикационных психозов
<variant>делирия
<variant>реактивных психозов
<variant>психопатий
<question>Различие между висцеральными галлюцинациями и сенестопатиями заключается в том, что...
<variant>ощущается наличие чего-то в определенном внутреннем органе
<variant>является ясным местоположение
<variant>отсутствие объективных причин для появления
<variant>перемещение
<variant>обманчивость
<question>Критерии псевдогаллюцинаций...
<variant>нет реального расположения в внешней среде
<variant>имеет реальное расположение в внешней среде
<variant>появляются во сне
<variant>появляются при пробуждении
<variant>находятся за пределами зрительного поля
<question>К простым галлюцинациям относятся...
<variant>фотопсии
<variant>гипнагогические галлюцинации
<variant>гипнопомпические галлюцинации
<variant>экстракампиновые галлюцинации
<variant>галлюцинации по типу Шарля Бонне
<question>Психосенсорные расстройства НЕ включают...
<variant>сенестопатии
<variant>метаморфопсии
<variant>макропсии

<variant>нарушения схемы тела
<variant>микропсии
<question>Пациент слышит, как незнакомые люди общаются между собой, слышит о себе угрозы и оскорбления — это расстройство называется...
<variant>слуховые галлюцинации
<variant>комментирующие галлюцинации
<variant>нейтральные галлюцинации
<variant>рефлекторные галлюцинации
<variant>эпизодические галлюцинации
<question>Деперсонализация — это расстройство...
<variant>ощущений и восприятия
<variant>памяти
<variant>самосознания
<variant>мышления
<variant>интеллекта
<question>К нарушениям восприятия относится синдром...
<variant>галлюцинаторный
<variant>депрессивный
<variant>маниакальный
<variant>кататонический
<variant>приступообразный
<question>Нарушению темпа мышления НЕ относится...
<variant>резонерство
<variant>ускорения мышления
<variant>шперрунг
<variant>ментизм
<variant>замедление мышления
<question>Если речь пациента состоит из отдельных слов, бессвязных фраз, то это относится к виду нарушения мышления...
<variant>бессвязное
<variant>прерывистое
<variant>резонерство
<variant>паралогическое



<variant>аморфное
<question>Бессвязное (инкогерентное) мышление возникает при...
<variant>амениции
<variant>делирии
<variant>онейроиде
<variant>нарушении сознания с помутнением
<variant>обнубиляции
<question>К критериям бреда НЕ относится...
<variant>критическое отношение
<variant>навязчивые мысли
<variant>патологический состав мысли
<variant>невозможность логической коррекции
<variant>неверное восприятие реальности
<question>Ментизм чаще всего встречается при синдроме...
<variant>психических автоматизмов
<variant>паранойальном
<variant>маниакальном
<variant>Корсаковском
<variant>ипохондрическом
<question>Агглютинация — это...
<variant>совмещение различных, не соответствующих друг другу понятий
<variant>новое понимание
<variant>бессмысленные рассуждения
<variant>поток болезненных мыслей
<variant>прекращение потока мыслей
<question>Паралогическое мышление чаще всего встречается при...
<variant>шизофрении
<variant>психопатии
<variant>эпилепсии
<variant>неврозах
<variant>инволюционных психозах

<question>К навязчивым мыслям НЕ относится...
<variant>абулия
<variant>клаустрофобия
<variant>кардиофобия
<variant>дисморфомания
<variant>сифилофобия
<question>Суицидальные мысли НЕ характерны для...
<variant>дисморфомании
<variant>истерии
<variant>депрессии
<variant>галлюцинозов
<variant>шизофрении
<question>Навязчивый страх НЕ включает в себя...
<variant>дисморфоманию
<variant>сифилофобию
<variant>танатофобию
<variant>клаустрофобию
<variant>кардиофобию
<question>Явное ускорение мыслительной деятельности называется...
<variant>скачкообразные мысли
<variant>ментизм
<variant>резонерность
<variant>вербигерация
<variant>персеверация
<question>Непроизвольный поток мыслей – это...
<variant>ментизм
<variant>персеверация
<variant>шперрунг
<variant>резонерность
<variant>навязчивые мысли
<question>К патологиям мышления НЕ относится...
<variant>криптомнезия
<variant>ускорение мыслей
<variant>реалистическое образное мышление
<variant>замедление
<variant>резонерность
<question>Социальную опасность представляют пациенты с...
<variant>императивными галлюцинациями
<variant>астеническим синдромом

<variant>истерическим синдромом
<variant>корсаковским синдромом
<variant>парафренным синдромом
<question>К нарушениям темпа мышления НЕ относится...
<variant>тщательность
<variant>ментизм
<variant>шперрунг
<variant>ускорение
<variant>замедление
<question>Для ускорения мышления НЕ характерно...
<variant>низкая продуктивность
<variant>увеличение ассоциаций
<variant>прерывистость внимания
<variant>патологическая тщательность
<variant>насильственное течение мыслей
<question>Широкие, фантастические идеи в бреде характерны для... синдрома.
<variant>парафренического синдрома
<variant>галлюцинаторного синдрома
<variant>параноидного синдрома
<variant>параноидального синдрома
<variant>синдрома Кандинского-Клерамбо
<question>В синдром Корсакова НЕ входит...
<variant>ускорение ассоциативных процессов
<variant>прогрессирующая амнезия
<variant>фиксационная амнезия
<variant>конфабуляции или псевдореминисценции
<variant>дезориентация в пространстве и времени
<question>Прогрессирующая амнезия НЕ встречается при...



<variant>маниакально-депрессивном психозе
<variant>психозе старческого возраста
<variant>болезни Пика
<variant>прогрессирующем параличе
<variant>атрофических заболеваний головного мозга
<question>К количественным нарушениям памяти НЕ относится...
<variant>конфабуляции
<variant>гипермнезия
<variant>гипомнезия
<variant>амнезия
<variant>прогрессирующая амнезия
<question>К качественным нарушениям памяти НЕ относится...
<variant>антероградная амнезия
<variant>псевдореминисценции
<variant>конфабуляции
<variant>парамнезии
<variant>криптомнезия
<question>Полная утрата памяти — это...
<variant>амнезия
<variant>апатия
<variant>апраксия
<variant>афазия
<variant>абулия
<question>Психоорганическом у синдрому НЕ относится...
<variant>кататония
<variant>ослабление мышления
<variant>неустойчивость аффекта
<variant>ментизм
<variant>дисмнезия
<question>Деменция НЕ встречается при...
<variant>психопатии
<variant>атрофических процессах головного мозга
<variant>прогрессирующем параличе
<variant>обсессивном психозе
<variant>черепно-мозговой травме

<question>Врожденная умственная отсталость называется...
<variant>олигофренией
<variant>частичной умственной отсталостью
<variant>болезнью Пика
<variant>деменцией
<variant>болезнью Альцгеймера
<question>В состав депрессивного синдрома НЕ входит...
<variant>нарциссический бред
<variant>дистресс
<variant>бред самообвинения
<variant>замедление мышления
<variant>снижение памяти
<question>К патологиям эмоционального фона НЕ относится...
<variant>абулия
<variant>паратимия
<variant>дисфория
<variant>мания
<variant>тревога
<question>Глубокая форма психического ограничения, выражающаяся в утрате связи с окружающим миром, называется...
<variant>аутизм
<variant>апатия
<variant>абулия
<variant>ступор
<variant>негативизм
<question>У пациента наблюдается повышение активности, повышенная работоспособность...
<variant>мания
<variant>эйфория
<variant>дисфория
<variant>мория
<variant>гиперкинезия
<question>Тип навязчивого поведения...
<variant>пиромания
<variant>геронтофилия
<variant>канцерофобия
<variant>педофилия

<variant>аграфобия
<question>Глубокая апатия, характеризующаяся отсутствием чувств...
<variant>апатия
<variant>адинамия
<variant>анестезия
<variant>депрессия
<variant>дисфория
<question>Патологическое повышение потребности в пище называется...
<variant>булимия
<variant>анорексия
<variant>пиромания
<variant>клептомания
<variant>полидипсия
<question>К нарушениям интересов НЕ относится...
<variant>клаустрофобия
<variant>нервная анорексия
<variant>полидипсия
<variant>абулия
<variant>клептомания
<question>К нарушениям интересов НЕ относится...
<variant>мутизм
<variant>дромомания
<variant>фетишизм
<variant>наркомания
<variant>пиромания
<question>Снижение или потеря чувства голода называется...
<variant>анорексия
<variant>апраксия
<variant>абулия
<variant>негативизм
<variant>апатия
<question>При помутнении сознания наблюдается...
<variant>нарушение концентрации внимания
<variant>эмоциональная лабильность
<variant>трудности в анализе ситуации
<variant>фиксационная амнезия
<variant>снижение познавательной деятельности



<question>Для онейроидного состояния НЕ характерно...
 <variant>истинные зрительные галлюцинации
 <variant>антагонистический бред
 <variant>кататонические нарушения
 <variant>психомоторное возбуждение
 <variant>дезориентация в месте, времени и личности
 <question>Для аменции НЕ характерно...
 <variant>понимание происходящих событий
 <variant>плохой прогноз
 <variant>несвязность мышления
 <variant>запоминание болезненных переживаний
 <variant>глубокая оглушенность сознания
 <question>Вариант помутнения сознания — это...
 <variant>амбулаторный автоматизм
 <variant>абсанс
 <variant>делирий
 <variant>фуга
 <variant>транс
 <question>К психотической патологии сознания НЕ относится...
 <variant>сопор
 <variant>обнубияция
 <variant>делирий
 <variant>состояние помутнения сознания
 <variant>онейроид
 <question>Показания для срочной госпитализации НЕ включают...
 <variant>неэффективность амбулаторного лечения
 <variant>суицидальные действия
 <variant>опасность для окружающих
 <variant>агрессивные тенденции

<variant>психомоторное возбуждение
 <question>Состояния, не требующие срочной госпитализации...
 <variant>лакунарная деменция
 <variant>помутнение сознания
 <variant>алкогольный делирий
 <variant>депрессивное состояние с суицидальными мыслями
 <variant>психомоторное возбуждение
 <question>Иллюзии, протекающие без нарушения психической функции, называются...
 <variant>функциональные
 <variant>слуховые
 <variant>аффективные
 <variant>вербальные
 <variant>парейдолические
 <question>При дереализации НЕ наблюдается...
 <variant>нарушения сознания
 <variant>искаженное восприятие окружающего мира
 <variant>нарушение критического отношения
 <variant>ощущение ложности и измененности мира
 <variant>ощущение отчуждения от окружающего мира
 <question>Экстракампинные галлюцинации — это...
 <variant>зрительные образы, которые проецируются не в поле зрения, а по бокам или за пределами видимости пациента
 <variant>фотопсия
 <variant>галлюцинации, возникающие при пробуждении
 <variant>галлюцинации, возникающие при засыпании
 <variant>псевдогаллюцинации
 <question>Симптом Липмана характерен для... галлюцинаций.
 <variant>внушенных
 <variant>гипногических

<variant>функциональных
 <variant>гипнопомпических
 <variant>слуховых
 <question>Истинные зрительные галлюцинации чаще всего встречаются при...
 <variant>алкогольной делирии
 <variant>реактивном психозе
 <variant>шизофрении
 <variant>эпилепсии
 <variant>маниакально-депрессивном психозе
 <question>Ошибочное восприятие формы, размера и расположения объектов в пространстве называется...
 <variant>метаморфопсия
 <variant>истинные галлюцинации
 <variant>иллюзия
 <variant>сенестопатия
 <variant>псевдогаллюцинации
 <question>Чувство присутствия «живого организма» в желудке — это...
 <variant>висцеральная галлюцинация
 <variant>сенестопатия
 <variant>истинные галлюцинации
 <variant>иллюзия
 <variant>аутометаморфопсия
 <question>Критерий истинных галлюцинаций:
 <variant>явная чувственность галлюцинации
 <variant>локализация галлюцинации в голове
 <variant>критерий «выполненности»
 <variant>влияние на психическое «Я»
 <variant>критика состояния пациента
 <question>Иллюзия — это...
 <variant>ошибочное, ложное восприятие реальных объектов
 <variant>ложное восприятие реальных объектов
 <variant>ложное ощущение увеличения конечностей

<variant>видение образов в голове
 <variant>ошибочные мысли
 <question>Критериям бреда НЕ относится...
 <variant>навязчивые мысли
 <variant>патологический состав мыслей
 <variant>болезненная основа появления
 <variant>убежденность в правильности мыслей
 <variant>невозможность логической коррекции
 <question>Персеверация в мышлении — это...
 <variant>застревание на определенном понятии или ответах
 <variant>ментизм
 <variant>отсутствие логической связи в мышлении
 <variant>склонность к бесплодному анализу
 <variant>отсутствие связи между отдельными мыслями
 <question>К первичному бреду НЕ относится...
 <variant>наследственность
 <variant>выдумывание
 <variant>реформаторский
 <variant>ревность
 <variant>самоуничтожение
 <question>Отличие первичного бреда от вторичного:
 <variant>система доказательств
 <variant>устойчивость уверенности
 <variant>ложные выводы
 <variant>отсутствие коррекции
 <variant>неустойчивость к коррекции
 <question>К обсессии НЕ относится...
 <variant>фобии
 <variant>контрастные влечения
 <variant>дипсомания
 <variant>подозрительность
 <variant>ритуалы
 <question>Невозможность отличить чужие события от

своих собственных называется...
 <variant>криптомнезия
 <variant>конфабуляция
 <variant>амнезия
 <variant>псевдореминисценция
 <variant>экмнезия
 <question>Пациент жалуется на ощущение "кислотного вещества, которое обжигает внутри груди" — это...
 <variant>сенестопатия
 <variant>гиперестезия
 <variant>парестезия
 <variant>психосенсорное расстройство
 <variant>псевдогаллюцинация
 <question>Нарушения памяти и интеллекта НЕ характерны для...
 <variant>неврастении
 <variant>эпилепсии
 <variant>прогрессивного паралича
 <variant>церебрального атеросклероза
 <variant>шизофрении
 <question>Конфабуляции НЕ встречаются при...
 <variant>неврозах
 <variant>черепно-мозговых травмах
 <variant>сосудистых поражениях мозга
 <variant>сифилисе мозга
 <variant>алкогольной энцефалопатии
 <question>Корсаковскому синдрому НЕ присуще...
 <variant>ментизм
 <variant>фиксационная амнезия
 <variant>конфабуляция
 <variant>нарушение ориентации в собственном «Я»
 <variant>нарушение ориентации во времени
 <question>При дереализации НЕ наблюдается...
 <variant>нарушение самопознания

<variant>ложное восприятие окружающего мира
 <variant>критическое отношение к происходящему
 <variant>чувство изменений, несоответствия реальности
 <variant>ощущение чуждости окружающего мира
 <question>Амнестические расстройства относятся к...
 <variant> синдрому Корсакова
 <variant> синдрому Кандинского-Клерамбо
 <variant>кататоническому синдрому
 <variant>гебефреническому синдрому
 <variant>делириозному синдрому
 <question>Самоубийства часто встречаются при ... синдроме.
 <variant>депрессивном
 <variant>параноидном
 <variant>галлюцинаторном
 <variant>кататоническом
 <variant>маниакальном
 <question>Симптом, НЕ входящий в депрессивный синдром...
 <variant>чрезмерная оценка своих возможностей
 <variant>тревога
 <variant>замедление движений
 <variant>мысли о своей неполноценности
 <variant>замедление мышления
 <question>Патологический аффект – это...
 <variant>активная двигательная реакция с помутнением сознания
 <variant>активная двигательная реакция без помутнения сознания
 <variant>высокая подвижность при хорошем настроении
 <variant>обаятельное настроение
 <variant>кратковременное помутнение сознания



<question>К кататоническому синдрому НЕ относится...

- <variant>амнезия
- <variant>негативизм
- <variant>ступор
- <variant>мутизм
- <variant>катаlepsия

<question>К психомоторному возбуждению НЕ относится...

- <variant>безумие
- <variant>мания
- <variant>гебефренический
- <variant>кататонический
- <variant>сандраки

<question>К расстройствам воли НЕ относится...

- <variant>апатия
- <variant>абулия
- <variant>парабулия
- <variant>гипобулия
- <variant>гипербулия

<question>Влечение к бродяжничеству — это...

- <variant>дромомания
- <variant>анорексия
- <variant>булемия
- <variant>пиромания
- <variant>клептомания

<question>Патология сознания психотического типа НЕ включает...

- <variant>обнубиляция
- <variant>помутнение
- <variant>аменция
- <variant>онейроид
- <variant>делирий

<question>В этиологии делирия нет ... фактора.

- <variant>психогенного
- <variant>алкогольного
- <variant>соматического
- <variant>инфекционного
- <variant>ядовитого

<question>Критерии синдрома расстройства сознания.

- <variant>отказ от реальной действительности
- <variant>ясность восприятия окружающей среды
- <variant>сохранение ориентации в окружающей среде

<variant>конфабуляция

<variant>паранойя

<question>Тип расстройства сознания, представляющий опасность для общества.

- <variant>помутнение
- <variant>аментивное
- <variant>онейроидное
- <variant>кома
- <variant>сопор

<question>Нарушение сознания на несколько секунд...

- <variant>абсанс
- <variant>помутнение
- <variant>делирий
- <variant>аменция
- <variant>онейроид

<question>Показания для экстренной госпитализации...

- <variant>императивные галлюцинации
- <variant>объяснение галлюцинаций
- <variant>галлюцинации, похожие на видения
- <variant>сенестопатия
- <variant>парейдолия

<question>Галлюцинации НЕ возникают через...

- <variant>невроз
- <variant>эпилепсию
- <variant>шизофрению
- <variant>алкогольные психозы
- <variant>прогрессирующий паралич

<question>Анестезия является симптомом психического расстройства при...

- <variant>истерии
- <variant>делирии
- <variant>галлюцинозе
- <variant>маниакальном синдроме
- <variant>обсессивно-компульсивном неврозе

<question>В составе синдрома Кандинского-Клерамбо НЕ наблюдается...

- <variant>болезненного восприятия расстройств
- <variant>псевдогаллюцинаций

<variant>навязчивых бредовых мыслей

<variant>ментизма
<variant>изоляции
собственных психических процессов

<question>К нарушениям памяти НЕ относится...

- <variant>ментизм и шперрунг
- <variant>антероградная амнезия

<variant>псевдореминисценции

<variant>петроградная амнезия
<variant>конфабуляция

<question>У пациентов отказ от пищи возникает при...

- <variant>остром бреде отравления

<variant>дисморфоманиакальн
ом бреде

<variant>кататоническом
бреде

<variant>маниакальном
синдроме

<variant>невротическом
синдроме

<question>Кататонический синдром характерен для...

- <variant>шизофрении
- <variant>истерии
- <variant>алкоголизма
- <variant>маниакально-депрессивного психоза
- <variant>невроз

<question>Длительность помутнения сознания...

- <variant>от нескольких минут до нескольких часов
- <variant>3-5 дней
- <variant>2-3 недели
- <variant>Более месяца
- <variant>2 месяца

<question>Обязанности участкового психиатра НЕ включают:

- <variant>судебно-психиатрические экспертизы
- <variant>начальные осмотры
- <variant>амбулаторное лечение



<variant>диспансеризация пациентов
<variant>диагностика
<question>Организовывать экстренную психиатрическую помощь НЕ требуется при:
<variant>психосенсорных расстройствах
<variant>эпилептическом статусе
<variant>сумеречном помрачении сознания
<variant>психомоторном возбуждении
<variant>алкогольном делирии
<question>Показаниями для госпитализации пациентов в психиатрическую больницу НЕ являются:
<variant>судебно-психиатрическая экспертиза
<variant>алкоголизм
<variant>отравление алкогольными суррогатами
<variant>злоупотребление ПАВ
<variant>наркомания
<question>Основная задача психиатрических стационаров:
<variant>лечение психически больных
<variant>диагностика соматических заболеваний
<variant>выявление пациентов с алкоголизмом
<variant>выявление пациентов с наркозависимостью
<variant>выявление пациентов с токсикоманией
<question>Широко НЕ встречаются истинные галлюцинации при заболеваниях:
<variant>эндогенных психозах
<variant>алкогольных психозах
<variant>маниакальных психозах
<variant>опухолях головного мозга
<variant>реактивных психозах
<question>Бред, сопровождающийся замедлением речи, чувством

вины, выраженной мимикой и самоограничением:
<variant>депрессивный бред
<variant>апатический бред
<variant>кататонический бред
<variant>кататонический синдром
<variant>психогенный бред
<question>Бред с эмоциональной холодностью, полной безразличностью:
<variant>апатический бред
<variant>депрессивный бред
<variant>кататонический бред
<variant>психогенный бред
<variant>негативистский бред
<question>Бред, возникающий после тяжелых, внезапных психических травм:
<variant>психогенный бред
<variant>депрессивный бред
<variant>апатический бред
<variant>кататонический бред
<variant>гебефренический синдром
<question>Клинический метод исследования в психиатрии:
<variant>клиническо-катамнестический
<variant>МРТ головного мозга
<variant>анализ крови и мочи
<variant>электроэнцефалография
<variant>рентгенография черепа
<question>К эмоциональным расстройствам НЕ относится:
<variant>аутизм
<variant>амбивалентность
<variant>эксплазивность
<variant>апатия
<variant>депрессия
<question>Дисфория – это:
<variant>злобность и агрессивность
<variant>неуверенность, снижение настроения
<variant>плохое настроение, переменная беспечность
<variant>страх и сомнение
<variant>тревога и повышенная возбудимость

<question>К гипертимным расстройствам НЕ относится:
<variant>гиперкинезия
<variant>мания
<variant>эйфория
<variant>мория
<variant>экстаз
<question>Типичная мания – это:
<variant>веселая
<variant>психопатическая
<variant>раздраженная
<variant>смущенная
<variant>возбужденная
<question>Скрытая депрессия – это:
<variant>печальное настроение с жалобами на физическое здоровье
<variant>печальное настроение с идеями нигилизма
<variant>ступор на фоне депрессивного настроения
<variant>тревога, возбуждение, аутоагрессия на фоне печального настроения
<variant>отсутствие признаков депрессии
<question>Суицидальные случаи у пациентов чаще встречаются при ... синдроме.
<variant>депрессивном
<variant>параноидальном
<variant>галлюцинаторном
<variant>кататоническом
<variant>маниакальном
<question>Амбивалентность эмоций – это:
<variant>одновременное проявление противоположных чувств
<variant>ощущение недостаточности
<variant>неумение контролировать эмоции
<variant>легкая смена от доброжелательности к раздражению
<variant>эмоциональная нестабильность
<question>Физиологический аффект – это:



<p><variant>сильная двигательная реакция без нарушения сознания</p> <p><variant>сильная двигательная реакция с помутнением сознания вследствие психической травмы</p> <p><variant>печальное настроение с чувством обиды</p> <p><variant>эмоциональная слабость</p> <p><variant>экстаз</p> <p><question>К эндогенным заболеваниям относятся:</p> <p><variant>маниакально-депрессивный психоз</p> <p><variant>эпилепсия</p> <p><variant>психопатии</p> <p><variant>невротические расстройства</p> <p><variant>олигофрения</p> <p><question>Самообвинение, склонность к самооскорблению характерны для:</p> <p><variant>депрессивной фазы МДП</p> <p><variant>маниакальной фазы МДП</p> <p><variant>интермиссионного периода МДП</p> <p><variant>всех фаз МДП</p> <p><variant>латентной фазы МДП</p> <p><question>Увеличение двигательной активности:</p> <p><variant>маниакальное возбуждение</p> <p><variant>гебефреническое возбуждение</p> <p><variant>кататоническое возбуждение</p> <p><variant>гипертимия</p> <p><variant>лабильность</p> <p><question>Замедленные движения встречаются при:</p> <p><variant>депрессивном синдроме</p> <p><variant>кататоническом ступоре</p> <p><variant>маниакальном синдроме</p> <p><variant>дисфории</p> <p><variant>дистимии</p>	<p><question>Самообвинения, идеи саморазрушения встречаются при</p> <p><variant>депрессивном синдроме</p> <p><variant>кататоническом ступоре</p> <p><variant>навязчивых мыслях</p> <p><variant>навязчивых мыслях</p> <p><variant>быстрой раздражительности</p> <p><question>При кататоническом возбуждении НЕ наблюдается:</p> <p><variant>ускорение ассоциативных процессов</p> <p><variant>стереотипность речи и движений</p> <p><variant>нарушение речи</p> <p><variant>пассивный и активный негативизм</p> <p><variant>импульсивные действия</p> <p><question>Грубое нарушение памяти:</p> <p><variant>амнезия</p> <p><variant>кататоническое оцепенение</p> <p><variant>депрессивный синдром</p> <p><variant>парамнезия</p> <p><variant>апатико-абулический синдром</p> <p><question>Отрицательные (дефицитарные) симптомы:</p> <p><variant>апатико-абулический синдром</p> <p><variant>депрессивный синдром</p> <p><variant>манический синдром</p> <p><variant>парафренный синдром</p> <p><variant>параноидный синдром</p> <p><question>Кататоническое возбуждение характеризуется:</p> <p><variant>разрыв мышления, стереотипность движений</p> <p><variant>оцепенение</p> <p><variant>демонстрация</p> <p><variant>страх</p> <p><variant>возбуждение</p> <p><question>Расслабленное, импульсивное возбуждение с</p>	<p>агрессией, стереотипность речи и поведения:</p> <p><variant>кататония</p> <p><variant>мания</p> <p><variant>гебефрения</p> <p><variant>психогенное расстройство</p> <p><variant>карфология</p> <p><question>Возбуждение с глупостью и упрямством называется:</p> <p><variant>гебефреническое</p> <p><variant>кататоническое</p> <p><variant>мания</p> <p><variant>психогенное</p> <p><variant>экстатическое</p> <p><question>В структуру кататонического ступора НЕ ВХОДИТ:</p> <p><variant>эхопраксия</p> <p><variant>отсутствие движений</p> <p><variant>мутизм</p> <p><variant>негативизм</p> <p><variant>каталепсия</p> <p><question>Симптом кататонического возбуждения:</p> <p><variant>стереотипность речи и движений</p> <p><variant>парамнезия</p> <p><variant>онейроид</p> <p><variant>ментизм</p> <p><variant>оцепенение</p> <p><question>Пациент говорит, что человек на висевшем портрете двигает лицом и показывает язык. Это называется:</p> <p><variant>парейдолические иллюзии</p> <p><variant>императивные галлюцинации</p> <p><variant>вербальные галлюцинации</p> <p><variant>психосенсорные расстройства</p> <p><variant>псевдогаллюцинации</p> <p><question>Пациент жалуется, что видит «внутренние образы», что он видит, что происходит за стеной. Это:</p> <p><variant>псевдогаллюцинация</p> <p><variant>сенестопатия</p>
---	---	--



<variant>шумные галлюцинации
<variant>вербальная галлюцинация
<variant>парейдолические иллюзии
<question>Пациент жалуется, что ему кажется, будто кто-то зовет его снаружи, и он отвечает на этот вызов. Это:
<variant>слуховые галлюцинации
<variant>рефлекторные (функциональные) иллюзии
<variant>психосенсорные расстройства
<variant>парейдолические иллюзии
<variant>псевдогаллюцинации
<question>Пациент заявляет, что его голова кажется уменьшенной до размера грецкого ореха. Это:
<variant>нарушение схемы тела
<variant>сенестопатия
<variant>шумные галлюцинации
<variant>вербальная галлюцинация
<variant>псевдогаллюцинация
<question>Пациент иногда ощущает, что у него нога «как у слона». Это называется...
<variant>макропсия
<variant>сенестопатия
<variant>метаморфопсия
<variant>парейдолические иллюзии
<variant>псевдогаллюцинация
<question>Пациент жалуется на неприятное ощущение в груди, как будто «кислота прожигает». Это называется:
<variant>сенестопатией
<variant>гиперестезия
<variant>парестезия
<variant>психосенсорные расстройства
<variant>псевдогаллюцинация
<question>Пациент заявляет, что чувствует, как будто

маленькие насекомые и черви ползают под кожей. Это называется:
<variant>тактильные галлюцинации
<variant>парейдолические иллюзии
<variant>вербальная галлюцинация
<variant>деперсонализация
<variant>псевдогаллюцинация
<question>Пациент заявляет, что люди на улице иногда выглядят как «карлики». Это:
<variant>психосенсорные расстройства
<variant>гиперестезия
<variant>деперсонализация
<variant>парейдолия
<variant>псевдогаллюцинация
<question>Пациент, глядя в зеркало, заявляет: «Интересно, это я, но внутри я не тот, кем был раньше». Это называется:
<variant>деперсонализация
<variant>сенестопатия
<variant>дереализация
<variant>парейдолия
<variant>псевдогаллюцинации
<question>Пациент жалуется на полное отсутствие ощущения в нижней части спины, которое появилось сразу после разговора с начальником. У пациента наблюдается:
<variant>истерическая анестезия
<variant>нарушение схемы тела
<variant>псевдогаллюцинация
<variant>гипестезия
<variant>повреждение передней центральной извилины
<question>Самая часто встречающаяся форма шизофрении в современной клинической практике:
<variant>параноидная
<variant>кататоническая
<variant>гебефреническая

<variant>шизоаффективное расстройство
<variant>шизоидное расстройство
<question>Для гебефренической формы шизофрении характерны следующие расстройства:
<variant>глупость и обидчивость
<variant>депрессивный синдром
<variant>эйфорическое возбуждение
<variant>синдром Кандинского-Клерамбо
<variant>апатико-абулический синдром
<question>Для круговой формы шизофрении характерны следующие расстройства:
<variant>люцидная кататония
<variant>синдром Кандинского-Клерамбо
<variant>манический синдром
<variant>депрессивный синдром
<variant>апатетическое помешательство
<question>Часто встречающееся проявление на поздних стадиях шизофрении (шизофренический дефект):
<variant>апатико-абулический синдром
<variant>онейроидная кататония
<variant>нарушение мышления
<variant>депрессивный синдром
<variant>аментивные расстройства сознания
<question>Учёный может четко и ясно выразить свои мысли на бумаге, но чувствует себя скованным перед незнакомыми людьми. Для преодоления страха он делает упражнения — сжимает свои голени 5 раз перед публичным выступлением. Это:
<variant>обряды



<variant>символическое мышление
<variant>ипохондрический делирий
<variant>переоцененные идеи
<variant>психический автоматизм
<question>Пациент отказывается есть ложкой, потому что «обычно с ложкой поглощают горе»:
<variant>символическое мышление
<variant>бессмысленное отравление
<variant>обсессивные мысли
<variant>переоцененные идеи
<variant>психический автоматизм
<question>Наличие острого психотравмирующего события характерно для психомоторного возбуждения... типа:
<variant>истерического
<variant>гебефренического
<variant>маниакального
<variant>кататонического
<variant>галлюцинаторно-бредового
<question>Пациент медленно, но подробно, с трудом выбирает слова при разговоре. Это называется:
<variant>патологическая обстоятельность
<variant>аутистическое мышление
<variant>шперунг (застревание мыслей)
<variant>мыслительные процессы
<variant>паралогическое мышление
<question>Характерные расстройства для психопатии:
<variant>эмоционально-волевые расстройства
<variant>расстройства восприятия
<variant>нарушения сознания

<variant>кататонические симптомы
<variant>расстройства памяти
<question>Пациент говорит устно, но вместо ответа на вопрос обсуждает философские и этические проблемы, очень абстрактно, отклоняясь от темы разговора. Это называется:
<variant>резонерство
<variant>последовательность мышления
<variant>персеверация
<variant>замедленное мышление
<variant>паралогическое мышление
<question>47-летний пациент жалуется на неприятные ощущения в животе, утверждая, что у него внутри «дырка» и просит провести обследование. При проверке патологии не обнаружено. Какое расстройство восприятия у пациента?
<variant>сенестопатическое
<variant>гиперестезическое
<variant>парестезическое
<variant>синестезическое
<variant>иллюзорное
<question>61-летний пациент сообщает, что видел «красивый голубой цветок, растущий от стакана до потолка». Какое расстройство восприятия у пациента?
<variant>галлюцинации
<variant>иллюзии
<variant>психосенсорные расстройства
<variant>сенестопатия
<variant>синестезия
<question>31-летняя женщина жалуется, что последние 2 недели боится телефонных звонков, не выдерживает звуков лифта и громких разговоров. Какие когнитивные расстройства у неё наблюдаются?

<variant>гиперестезические
<variant>гипестезические
<variant>парестезические
<variant>синестезические
<variant>макропсихические
<question>Пациент, страдавший от тифа с высокой температурой, увидел пожар в палате, которого не было, и пытался избежать огня. Какое когнитивное расстройство у него было?
<variant>галлюцинационное
<variant>иллюзорное
<variant>синестезическое
<variant>псевдогаллюцинаторное
<variant>гиперестезическое
<question>33-летний пациент постоянно ощущает неприятный запах из отходов, постоянно очищает свою комнату, моет полы в отделении, и при этом всегда ищет источник неприятного запаха. Какой тип расстройства восприятия у пациента?
<variant>обонятельные галлюцинации
<variant>иллюзии
<variant>психосенсорные расстройства
<variant>синестезия
<variant>гиперестезия
<question>23-летний пациент признается, что слышит «голос Бога» из своего позвоночника. Какие когнитивные расстройства развились у пациента?
<variant>псевдогаллюцинации
<variant>настоящие галлюцинации
<variant>иллюзии
<variant>психосенсорные расстройства
<variant>сенестопатии
<question>48-летний пациент ощущает, что в его теле ползает змея, требуя обследования. Какое



расстройство восприятия у него?
<variant>висцеральные галлюцинации
<variant>иллюзии
<variant>психосенсорные расстройства
<variant>тактильные галлюцинации
<variant>синестезия
<question>Рабочий пострадал от отравления в ТЭЦ и после этого заявил, что у него «появились волосы во рту», которые он пытался выдернуть. Какое когнитивное расстройство у него?
<variant>тактильные галлюцинации

<variant>вкусовые галлюцинации
<variant>псевдогаллюцинации
<variant>иллюзии
<variant>психосенсорные расстройства
<question>Пациент обратился к психотерапевту с просьбой помочь избавиться от постоянных мыслей о возможном сексуальном неуспехе. Это...
<variant>обсессивные бредовые идеи
<variant>персеверативные бредовые идеи
<variant>ипохондрический бред
<variant>переоцененные идеи

<variant>психические автоматизмы
<question>Пациент подробно описывает свою жизнь, начиная с детства. Когда врач попытался его прервать, он рассердился: «Вы спросили, что меня беспокоит». Это называется:
<variant>патологическая обстоятельность
<variant>символическое мышление
<variant>бред
<variant>психические автоматизмы
<variant>аутистическое мышление

Составители:  ассистент кафедры Мусаева С.К.

 ассистент кафедры Раманова Г.Б.

Заведующий кафедрой к.м.н., профессор:  Жаркинбекова Н.А.

Протокол: № 1 от «27» 08 2025 г.

**Перечень практических навыков по дисциплине «Неврология, психиатрия и наркология»
Оценка практических навыков бакалавра**

№	Название навыка	Баллы		
		1	0,5	0
Нормальные рефлексы (поверхностные)				
1	Корнеальный рефлекс			
2	Небный рефлекс			
3	Глоточный рефлекс			
4	Верхний брюшной рефлекс			
5	Средний брюшной рефлекс			
6	Нижний брюшной рефлекс			
7	Кримастерный рефлекс			
8	Подошвенный рефлекс			
9	Анальный рефлекс			
10	Оценка мышечной силы	1	0,5	0
11	Оценка мышечного тонуса	1	0,5	0
Нормальные рефлексы (глубокие)				
12	Надбровный рефлекс	1	0,5	0



13	Нижнечелюстной рефлекс			
14	Сгибательно-локтевой рефлекс			
15	Разгибательно локтевой рефлекс			
16	Карпорадиальный рефлекс			
17	Лапаточно-плечевой рефлекс			
18	Коленный рефлекс			
19	Ахиллов рефлекс			
20	Рефлекс Майера			
21	Рефлекс Лери			
	Патологические рефлекссы орального автоматизма	1	0,5	0
22	Носогубной рефлекс Аствацатурова			
23	Хоботковый рефлекс			
24	Сосательный рефлекс			
25	Ладонно-подбородочный рефлекс Маринеску-Радовичи			
	Патологические кистевые рефлекссы	1	0,5	0
26	Рефлекс Россолимо			
27	Рефлекс Бехтерева-1			
28	Рефлекс Бехтерева-2			
29	Рефлекс Жуковского			
30	Рефлекс Гоффмана			
31	Хватательный рефлекс Янишевского			
32	Рефлекс Якобсона-Ласке			
	Патологические стопные рефлекссы	1	0,5	0
33	Рефлекс Бабинского			
34	Рефлекс Оппенгейма			
35	Рефлекс Гордона			
36	Рефлекс Шеффера			
37	Рефлекс Пуссера			
38	Рефлекс Гроссмана			
39	Рефлекс Чеддока			
40	Рефлекс Россолимо			
41	Рефлекс Бехтерева-1			
42	Рефлекс Бехтерева-2			
43	Рефлекс Жуковского			
44	Синкинезии – это... Виды синкинезии	1	0,5	0
45	Клонусы – это...	1	0,5	0
	Чувствительная сфера (поверхностная)	1	0,5	0
46	Тактильная			
47	Температурная			
48	Болевая			
	Чувствительная сфера (глубокая)	1	0,5	0
49	Суставно-мышечное чувство			
50	Вибрационное			
51	Чувство давления и веса			
52	Кинестезия кожи			
	Чувствительная сфера (сложные виды)	1	0,5	0
53	Локализация			
54	Двухмерно-пространственная			

55	Дискриминационная			
56	Стереогноз			
	Черепно-мозговые нервы	1	0,5	0
57	I пара – обонятельный нерв			
58	II пара- зрительный нерв			
59	III, IV, VI пары – глазодвигательный, блоковый, отводящий			
60	V пара – тройничный нерв			
61	VII пара - лицевой нерв			
62	VIII пара – слуховой нерв			
63	IX, X пары – языкоглоточный и блуждающий нервы			
64	XI пара – добавочный нерв			
65	XII пара-подъязычный нерв			
	Координаторные пробы	1	0,5	0
66	Проба Ромберга			
67	Пальце-носовая проба			
68	Пяточно-коленная			
69	Проба на диадохокинез			
70	Пронататорная проба			
71	Ассинергия Бабинского			
72	Определение видов атаксий			
	Когнитивные расстройства	1	0,5	0
73	Когнитивные нарушения			
74	Проведение теста «рисование часов»			
75	Расстройства речи			
	Менингеальные симптомы	1	0,5	0
76	Регидность мышц затылка			
77	Симптом Кернинга			
78	Симптом Брудзинского			
79	Скуловой симптом Бехтерева			
80	Симптом Гийена			
81	Общемозговые симптомы			

Составители:  ассистент кафедры Мусаева С.К.

 ассистент кафедры Раманова Г.Б.

Заведующий кафедрой к.м.н., профессор:  Жаркинбекова Н.А.

Протокол: № 1 от «27» 08 2025 г.