

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА

Дисциплина: Психиатрия и наркология

Код дисциплины: PR 3305

Название ОП: 6В10117 «Стоматология»

Общий объём часов/кредит: 90ч./ 3 кредитов

Курс и семестр изучения: 3 курс/VI семестр

Контрольно-измерительные средства

Шымкент 2025г.

Тестовые вопросы программы для рубежного контроля 1

<question>Собрания, заседания проходят на расстоянии...

<variant>массовом

<variant>социальном

<variant>личном

<variant>интимном

<variant>неформальном

<question>Для взаимопонимания собеседников помогает...

<variant>чтение психологического контекста их общения

<variant>совершенствование профессиональных знаний и навыков

<variant>создание чувства уверенности у пациента

<variant>установление психологического контакта с пациентом

<variant>самооценка врача

<question>Нормальное поведение при встрече с незнакомым человеком — это...

<variant>«лицом к лицу»

<variant>«рядом»

<variant>сидеть, откинувшись назад

<variant>«через стол»

<variant>наклониться к пациенту

<question>Партнёрские отношения, психологический контакт, общие цели, которые преследуют коллеги, определяются положением...

<variant>«рядом»

<variant>«лицом к лицу»

<variant>сидя, откинувшись назад

<variant>«через стол»

<variant>наклониться к пациенту

<question>Отношения «начальник-подчинённый», где роли чётко определены, и необходимо точно следовать указаниям и приказам, характерны для положения...

<variant>«через стол»

<variant>лицом к лицу

<variant>рядом

<variant>сидя, откинувшись назад

<variant>наклониться к пациенту

<question>Пациент на приёме у врача обычно находится в... положении.

<variant>около стола

<variant>лицом к лицу

<variant>напротив

<variant>сидя, откинувшись назад

<variant>через стол

<question>Если врач откидывается на спинку стула, у пациента может возникнуть мысль, что собеседник...

<variant>скучает

<variant>интересуется

<variant>не понимает

<variant>противится

<variant>спокоен

<question>Если врач наклоняет голову вправо в процессе разговора, а пациент кивает, поддерживая разговор, пациент может подумать, что собеседник...

<variant>интересуется

<variant>скучает

<variant>не понимает
<variant>противится
<variant>спокоен
<question>Естественная, непринуждённая, одинаковая поза... характеризует.
<variant>психологический комфорт
<variant>скрытый стресс
<variant>неготовность к общению
<variant>неуверенность
<variant>психологическое неудобство
<question>Необычные, искусственные позы указывают на ...
<variant>стресс
<variant>психологический комфорт
<variant>хорошее настроение
<variant>уверенность
<variant>открытость к общению
<question>Необычные, искусственные позы указывают на
<variant>психологическое неудобство
<variant>психологический комфорт
<variant>хорошее настроение
<variant>уверенность
<variant>открытость к общению
<question>Психологический комфорт указывает на...
<variant>хорошее настроение
<variant>забывчивость
<variant>невнимательность
<variant>воздушность
<variant>неуверенность

Составители: Мусаев С.К. ассистент кафедры Мусаева С.К.

Раманов Г.Б. ассистент кафедры Раманова Г.Б.

Заведующий кафедрой к.м.н., профессор: Жаркинбекова Н.А.

Протокол: № 1 от «27» 08 2025 г.

Тестовые вопросы программы для рубежного контроля 2

<question>Неудобство в общении можно определить по...
<variant>закрытой позе
<variant>улыбке
<variant>хорошему настроению
<variant>открытости к общению
<variant>дружескому рукопожатию
<question>Люди, которые закрыты, оценивают себя строго, пытаются быть осторожными в общении, не доверяют окружающим и смотрят с подозрением, обычно предпочитают... позу.
<variant>симметричную

<variant>асимметричную

<variant>естественную

<variant>искусственную

<variant>закрытую

<question>Открытые, жизнерадостные люди, готовые к общению, предпочитают... позу.

<variant>асимметричную

<variant>симметричную

<variant>естественную

<variant>искусственную

<variant>закрытую

<question>Позы, которые показывают уклонение от общения с окружающими, называют... позами.

<variant>закрытыми

<variant>симметричными

<variant>асимметричными

<variant>естественными

<variant>искусственными

<question>Перекрещённые руки на груди (поза Наполеона), скрещённые ноги, руки в карманах или за спиной, развернутый к собеседнику корпус, взгляд в пол, окно или книгу — это признаки... позы.

<variant>закрытой

<variant>симметричной

<variant>асимметричной

<variant>естественной

<variant>искусственной

<question>Если тело и голова направлены к собеседнику, а взгляд устремлён в лицо собеседника, это... поза.

<variant>открытая

<variant>асимметричная

<variant>естественная

<variant>искусственная

<variant>закрытая

<question>Самая информативная деталь на лице человека — это...

<variant>линия губ

<variant>лицо

<variant>лоб

<variant>глаза

<variant>выражение лица

<question>Оптимальное время для установления психологического контакта с другим человеком с помощью взгляда — это...

<variant>3 сек

<variant>1 мин

<variant>30 сек

<variant>2 мин

<variant>10 сек

<question>Взгляд длительностью 3-10 секунд, который ставит собеседника в неудобное положение, называется...

<variant>внимательным взглядом

<variant>«беглым взглядом»

<variant>агрессивным вызовом

<variant>добрый приглашением

<variant>эффективным психологическим контактом

<question>Взгляд длительностью более 10 секунд называется...

<variant>агрессивным вызовом

<variant> внимательным взглядом

<variant> «беглым взглядом»

<variant> добрым приглашением

<variant> эффективным психологическим контактом

<question> «Агрессивный вызов» — это...

<variant> взгляд, длительностью более 10 секунд

<variant> быстрый взгляд

<variant> открытая улыбка

<variant> взгляд снизу вверх

<variant> дружеское рукопожатие

<question> Собеседники, уверенные в себе, спокойные, с высокой самооценкой, в ходе общения с другими людьми смотрят на собеседника ..., чем люди с низкой самооценкой.

<variant> чаще

<variant> реже

<variant> одинаково

<variant> в зависимости от реакции окружающих

<variant> всегда

Тестовые задания для промежуточной аттестации (экзаменационная сессия)

1. <question> Возникновение неправильных, ложных рассуждений, логических ошибок в умозаключениях, несопоставимых ассоциативных связей и понятий, объединение противоречивых идей и образов с произвольной заменой одних понятий другими вследствие нарушений законов и правил логики.

<variant> паралогическое мышление

<variant> вязкое (обстоятельное) мышление

<variant> символическое мышление

<variant> бегущее мышление

<variant> резонерствующее мышление

2. <question> Обстоятельность мышления, склонность к детализации, неумение отделить основное от второстепенного, тугоподвижность, невозможность переключиться на что-то другое, застrevание на одной теме.

<variant> вязкое (обстоятельное) мышление

<variant> разорванное мышление

<variant> символическое мышление

<variant> бегущее мышление

<variant> резонерствующее мышление

3. <question> Замена общих понятий и образов отвлеченными знаками, важными для пациента, но нередко недоступными пониманию окружающим.

<variant> символическое мышление

<variant> разорванное мышление

<variant> вязкое (обстоятельное) мышление

<variant> бегущее мышление

<variant> резонерствующее мышление

4. <question> Возникновение ассоциаций часто по звуанию, течение их ускоренное и поверхностное, с преждевременным переходом к другой, но смежной теме.

<variant> бегущее мышление

<variant> разорванное мышление

<variant> вязкое (обстоятельное) мышление

<variant> символическое мышление

<variant> резонерствующее мышление

5. <question> Склонность к пустым, бесплодным, основанным на поверхностных формальных аналогиях рассуждениям. Стремление к демагогии, бесплодному мудрствованию по любому поводу.

<variant> резонерствующее мышление

<variant> разорванное мышление

<variant> вязкое (обстоятельное) мышление

<variant> символическое мышление

<variant> бегущее мышление

6. <question> Изменения памяти, характерные для маниакального синдрома.

<variant> гипермнезия

<variant> фиксационная амнезия

<variant> ретроградная амнезия

- <variant> конфабуляции
<variant>
псевдореминисценции
7. <question>Потеря способности восстановить в памяти события, предшествовавшие повреждению головного мозга.
<variant> ретроградная амнезия
<variant>фиксационная амнезия
<variant>гипермнезия
<variant>конфабуляции
<variant>псевдореминисценции
8. <question>Нарушение памяти, при котором пациент стремится рассказать в различных вариантах вымышенные события часто фантастического характера. Разновидность ложных воспоминаний.
<variant>конфабуляции
<variant>фиксационная амнезия
<variant>ретроградная
<variant>псевдореминисценции
<variant>гипермнезия
9. <question>Нарушение памяти, при котором у пациента нарушено определение времени действия реальных событий: события прошлого выдаются за настоящее.
<variant>псевдореминисценции
<variant>фиксационная амнезия
<variant>ретроградная
<variant>конфабуляции
<variant>гипермнезия
10. <question> Облегченные по сравнению с нормой воспоминания фактов прошлого опыта.
<variant>гипермнезия
<variant>фиксационная амнезия
<variant>ретроградная
<variant>конфабуляции
<variant>псевдореминисценции
11. <question>Отсутствие любых эмоциональных переживаний.
<variant>эмоциональная тупость
<variant>эмоциональная неадекватность
<variant>дисфория
<variant>амбивалентность
<variant>слабодушие
12. <question>Возникновение эмоций, противоположных соответствующим данной конкретной ситуации.
<variant>эмоциональная неадекватность
<variant>эмоциональная тупость
<variant>дисфория
<variant>амбивалентность
<variant>слабодушие
13. <question>Злобнотоскливое настроение, часто возникающее пароксизмально.
<variant> дисфория
<variant>эмоциональная тупость
<variant>эмоциональная неадекватность
<variant>амбивалентность
<variant>слабодушие
14. <question>Появление в сознании одновременно двух противоположных чувств (например, любовь и ненависть)
<variant>амбивалентность
<variant>эмоциональная тупость
<variant>эмоциональная неадекватность
<variant>дисфория
<variant>слабодушие
15. <question>Отсутствие возможности удерживаться от чрезмерного и бурного проявления адекватных эмоций по любому незначительному поводу.
<variant> слабодушие
<variant>эмоциональная тупость
- <variant>эмоциональная неадекватность
<variant>дисфория
<variant>амбивалентность
16. <question>Стремление к воровству при осознании нелепости и предосудительности подобного акта, сопровождающееся внутренним противоречием раздваиванием.
<variant>клептомания
<variant>пиromания
<variant>ономатомания
<variant>кляустрофобия
<variant>дромомания
17. <question>Влечеие к поджогам при наличии сопротивления воли и осознании безрассудства подобных фактов.
<variant>пиromания
<variant>клептомания
<variant>ономатомания
<variant>кляустрофобия
<variant>дромомания
18. <question>Вторжение в сознание (помимо воли) желания запомнить имена, фамилии, название учреждений, городов, рек и навязчивое желание повторять их в слух.
<variant>ономатомания
<variant>клептомания
<variant>пиromания
<variant>кляустрофобия
<variant>дромомания
19. <question>Боязнь стесненного пространства, закрытых помещений при критическом отношении к подобным переживаниям.
<variant>кляустрофобия
<variant>клептомания
<variant>пиromания
<variant>ономатомания
<variant>дромомания
20. <question>Безудержное влечеие к путешествиям, странствиям, бродяжничеству.
<variant> дромомания

- <variant> клептомания
<variant> пиромания
<variant> ономатомания
<variant> кляустрофобия
21. <question>Образование ложных суждений и умозаключений о том, что окружающие люди стали плохо относиться к больному.
<variant> бред отношения
<variant> бред особого значения
<variant> бред физического воздействия
<variant> бред нигилистический
<variant> бред самоуничтожения
22. <question>Возникновение болезненного искаженного отношения мысли к действительным, но случайным фактам, приданье им иного, особенно важного смысла.
<variant> бред особого значения
<variant> бред отношения
<variant> бред физического воздействия
<variant> бред самоуничтожения
<variant> бред нигилистический
23. <question>Ложные умозаключения пациента о том, что кто-то подвергает его тело и мозг физическому воздействию на расстоянии.
<variant> бред физического воздействия
<variant> бред отношения
<variant> бред нигилистический
<variant> бред самоуничтожения
<variant> бред особого значения
24. <question>Образование ложных суждений и умозаключений о собственном
- ничтожестве, греховности, порочности.
<variant>бред самоуничтожения
<variant>бред отношения
<variant>бред особого значения
<variant>бред физического воздействия
<variant>бред нигилистический
25. <question>Возникновение у пациента ложных идей о том, что у него сгнили или вообще отсутствуют некоторые части тела.
<variant>бред нигилистический
<variant>бред отношения
<variant>бред особого значения
<variant>бред физического воздействия
<variant>бред самоуничтожения
26. <question>Голоса «внутри головы», с которыми пациент ведет мысленный диалог.
<variant>псевдогаллюцинация
<variant>мантизм
<variant>симптом открытости мысли
<variant>мышечный псевдогаллюцинация
<variant>чувствование овладения
- 27.<question>Непроизвольный и неподчиняемый воле наплыв мыслей, воспоминаний, образов
<variant>мантизм
<variant>псевдогаллюцинация
<variant>чувствование овладения
<variant>симптом открытости мысли
<variant>мышечный псевдогаллюцинация
28. <question>Расстройство, при котором пациент считает, что его мысли доступны и известны всем окружающим.
<variant>симптом открытости мысли
<variant>псевдогаллюцинация
<variant>мантизм
<variant>чувствование овладения
- <variant>мышечный псевдогаллюцинация
29. <question>Ощущение действия воли извне, управляющей душевным процессом пациента.
<variant>чувство овладения
<variant>симптом открытости мысли
<variant>мышечный псевдогаллюцинация
<variant>мантизм
30. <question>Расстройство восприятия, при котором пациент предъявляет жалобы на непреднамеренное произношение слов.
<variant>мышечный псевдогаллюцинация
<variant>псевдогаллюцинация
<variant>мантизм
<variant>симптом открытости мысли
<variant>чувство овладения
31. <question>Появление беспричинного отрицательного отношения пациента ко всякому воздействию извне в виде отказа, сопротивления или выполнения действий, противоположных заданным:
<variant> негативизм
<variant> ступор
<variant> каталепсия
<variant> мышечная ригидность
<variant> мутизм
32. <question>Состояние обездвиженности, оцепенения с частичным или полным мутизмом и отсутствием или снижением реакции на внешние раздражители, в том числе на болевые.
<variant> ступор
<variant> негативизм
<variant> каталепсия
<variant> мышечная ригидность
<variant> мутизм

33. **<question>**Сохранение приданного извне положения отдельных частей тела, «восковая гибкость».
<variant> каталепсия
<variant> негативизм
<variant> ступор
<variant> мышечная ригидность
<variant> мутизм

34. **<question>**Отсутствие способности изменить положение отдельных частей тела из-за напряжения мышц.
<variant> мышечная ригидность
<variant> негативизм
<variant> ступор
<variant> каталепсия
<variant> мутизм

35. **<question>**Полное молчание пациента при отсутствии нарушений со стороны речево-артикулярного аппарата.
<variant> мутизм
<variant> негативизм
<variant> ступор
<variant> каталепсия
<variant> мышечная ригидность

36. **<question>**Повышенное беззаботное настроение, благодушие, сочетающееся с беспечностью, недостаточно критическим отношением к своему состоянию; безмятежное блаженство.
<variant> эйфория
<variant> идеи величия
<variant> гипермнезия
<variant> двигательная активность
<variant> бегущее мышление

37. **<question>**Преувеличение собственных способностей и достоинств, убежденность в собственной исключительности.
<variant> идеи величия
<variant> эйфория
<variant> гипермнезия

<variant> двигательная активность
<variant> бегущее мышление

38. **<question>**Количественное нарушение памяти, при котором воспоминание облегчено и обострено.
<variant> гипермнезия
<variant> эйфория
<variant> идеи величия
<variant> двигательная активность
<variant> бегущее мышление

39. **<question>**Особое внимание при сборе анамнеза у пациента с биполярным аффективным расстройством врач должен обращать на:
<variant> всё
<variant> вышеперечисленное
<variant> стрессовые изменения жизненных обстоятельств
<variant> аффективные расстройства в семейном анамнезе и прошлом пациента
<variant> попытки суицида
<variant> лекарственную зависимость или алкоголизм

40. **<question>**Ускоренное, но поверхностное течение мыслей с повышенной отвлекаемостью.
<variant> бегущее мышление
<variant> эйфория
<variant> идеи величия
<variant> гипермнезия
<variant> двигательная активность
<question>аггравация характеризуется...
<variant> выдумыванием симптомов несуществующей болезни

<variant> чрезмерным снижением симптомов
<variant> чрезмерным усилением симптомов
<variant> полным непониманием симптомов болезни
<variant> воображаемым представлением симптомов

<question>Диссимуляция — это...
<variant> преднамеренное скрытие симптомов болезни
<variant> демонстрация симптомов несуществующей болезни
<variant> преувеличение симптомов болезни
<variant> преднамеренное уменьшение симптомов
<variant> непреднамеренное скрытие симптомов
<question>Анозогнозия — это...
<variant> непроизвольная реакция, отсутствие осознания болезни
<variant> преднамеренное скрытие симптомов болезни
<variant> уменьшение симптомов болезни
<variant> неспособность принять болезнь
<variant> преувеличение симптомов несуществующей болезни
<question>Ипохондрия — это...
<variant> чрезмерная озабоченность своим здоровьем
<variant> страх перед социальными последствиями болезни
<variant> отказ от выздоровления
<variant> получение выгоды от болезни
<variant> преувеличение симптомов болезни
<question>Симуляция — это...
<variant> прагматичное стремление извлечь выгоду из болезни
<variant> преувеличение симптомов болезни
<variant> преднамеренное уменьшение симптомов болезни
<variant> непреднамеренное скрытие симптомов болезни

<variant> страх перед социальными последствиями болезни
<question> К трудным пациентам относятся пациенты ...
<variant> с признаками депрессивных симптомов с суициальными наклонностями
<variant> эпилептоидного типа
<variant> астено-nevrotического типа
<variant> гипертимного типа
<variant> истерического типа
<question> Доктор-пациент как пациент — это...
<variant> самый трудный и нестандартный пациент
<variant> пациент, который облегчает работу лечащего врача
<variant> такой же пациент, как и все другие
<variant> самый обычный пациент
<variant> самый сложный пациент
<question> Модель взаимоотношений между врачом и пациентом, в которой роль врача чётко отделена и основывается на авторитарном подходе, называется...
<variant> модель управления
<variant> модель партнёрства
<variant> модель управления-партнёрства
<variant> модель соглашения
<variant> модель подчинения
<question> Модель партнёрства в отношениях между врачом и пациентом называется...
<variant> психотерапия
<variant> клиника внутренних болезней
<variant> психотерапия и неврология
<variant> подавление
<variant> компромисс
<question> Решение конфликта через болезнь называется...

<variant> соматизация
<variant> интериоризация
<variant> гетероагgression
<variant> аутоагgression
<variant> доминирование
<question> Современная комплексная терапия для лечения пациентов включает следующие виды терапевтического воздействия:
<variant> биологическое, психологическое, социальное
<variant> социальное, психологическое
<variant> биологическое, социальное
<variant> биологическое, психологическое, коммуникативное
<variant> биологическое, психологическое, биохимическое
<question> Профессия врача НЕ обязывает к взаимодействию с...
<variant> сотрудниками бюро захоронений
<variant> пациентами
<variant> родственниками пациента
<variant> медицинскими работниками
<variant> руководством медицинских учреждений
<question> Небольшое качество хорошего врача - это
<variant> аккуратность
<variant> уважение
<variant> внимание к пациентам
<variant> любовь к своей профессии
<variant> заботливость
<question> Современное понимание эмпатии включает в себя... эмпатию.
<variant> деятельностную
<variant> эмоциональную
<variant> когнитивную
<variant> предсказательную
<variant> познавательную
<question> Эмпатия, основанная на механизмах

строгости и идентификации, называется...
<variant> эмоциональной
<variant> когнитивной
<variant> предсказательной
<variant> познавательной
<variant> деятельностной
<question> Эмпатия, основанная на интеллектуальных процессах, сравнения и аналогий, называется...
<variant> когнитивной
<variant> предсказательной
<variant> интеллектуальной
<variant> эмоциональной
<variant> деятельностной
<question> Эмпатия, основанная на интуиции и способности делать предположения о другом человеке, называется...
<variant> предсказательной
<variant> деятельностной
<variant> эмоциональной
<variant> когнитивной
<variant> познавательной
<question> Эмпатические качества врача могут быть необходимы в случаях...
<variant> симулятивного поведения
<variant> агрессивного поведения
<variant> тревожности
<variant> истерии
<variant> невроза
<question> Эмоциональная устойчивость характеризуется...
<variant> сдержанностью и уверенностью
<variant> рефлексией
<variant> аффилиацией
<variant> тревожностью
<variant> истерией
<question> Анализ собственного психического состояния — это...
<variant> рефлексия
<variant> эмоциональная устойчивость

<variant>эмпатия
<variant>чувствительность
<variant>аффилияция
<question>Адаптация врача к профессиональной деятельности длится...
<variant>2 года
<variant>всю жизнь
<variant>в зависимости от личности врача
<variant>3 месяца
<variant>5 лет
<question>Когнитивный аспект профессиональной адаптации — это...
<variant>развитие профессиональных знаний, навыков и квалификаций
<variant>профессиональная адаптация
<variant>профессиональный имидж
<variant>коммуникативная толерантность
<variant>коммуникативные навыки
<question>«Жизненное пространство» — это личная зона человека, регулируемая в процессе общения и защищающая его от вмешательства других. Это... расстояние.
<variant>межличностное
<variant>социальное
<variant>личное
<variant>мимикное
<variant>общественное
<question>У людей, чье детство прошло в большом городе, жизненное пространство по сравнению с жителями маленького города...
<variant>меньше
<variant>больше
<variant>одинаково
<variant>зависит от возраста
<variant>всегда различно
<question>Близость незнакомца часто вызывает...
<variant>психологический стресс

<variant>беспокойство
<variant>депрессию
<variant>агрессию
<variant>безразличие
<question>При явной интроверсии «жизненное пространство» будет...
<variant>больше
<variant>меньше
<variant>одинаковым
<variant>зависеть от возраста
<variant>всегда разным
<question>У человека с высокой жизненной энергией и хорошим настроением расстояние для других людей...
<variant>меньше
<variant>больше
<variant>одинаковое
<variant>зависит от возраста
<variant>всегда различное
<question>Межличностное расстояние в отношениях между собеседниками определяется...
<variant>размером их «жизненного пространства»
<variant>плотностью населения места проживания
<variant>психологическим климатом
<variant>профессиональной деятельностью
<variant>состоянием здоровья
<question>Если люди находятся в теплых, близких эмоциональных отношениях, расстояние между ними будет...
<variant>меньше
<variant>больше
<variant>одинаковое
<variant>зависеть от возраста
<variant>всегда разное
<question>Если социальный статус собеседника выше, расстояние будет...
<variant>больше
<variant>меньше
<variant>одинаковое
<variant>зависеть от возраста
<variant>всегда разное

<question>Когда необходимо провести сложную операцию, врач использует... расстояние.
<variant>минимальное
<variant>личное
<variant>социальное
<variant>общественное
<variant>массовое
<question>«Партнёрские отношения», то есть отношения, основанные на общей деятельности, с одинаковым социальным статусом людей — это... расстояние.
<variant>личное
<variant>интимное
<variant>социальное
<variant>общественное
<variant>массовое
<question>Если пациент позволяет создать дистанцию при первой встрече с врачом, она будет составлять...
<variant>200 см
<variant>400 см
<variant>500 см
<variant>300 см
<variant>100 см
<question>Собрания, заседания проходят на расстоянии...
<variant>массовом
<variant>социальном
<variant>личном
<variant>интимном
<variant>неформальном
<question>Для взаимопонимания собеседников помогает...
<variant>чтение психологического контекста их общения
<variant>совершенствование профессиональных знаний и навыков
<variant>создание чувства уверенности у пациента
<variant>установление психологического контакта с пациентом
<variant>самооценка врача

<question>Нормальное поведение при встрече с незнакомым человеком — это...
<variant>«лицом к лицу»
<variant>«рядом»
<variant>сидеть, откинувшись назад
<variant>«через стол»
<variant>наклониться к пациенту
<question>Партнёрские отношения, психологический контакт, общие цели, которые преследуют коллеги, определяются положением...
<variant>«рядом»
<variant>«лицом к лицу»
<variant>сидя, откинувшись назад
<variant>«через стол»
<variant>наклониться к пациенту
<question>Отношения «начальник-подчинённый», где роли чётко определены, и необходимо точно следовать указаниям и приказам, характерны для положения...
<variant>«через стол»
<variant>лицом к лицу
<variant>рядом
<variant>сидя, откинувшись назад
<variant>наклониться к пациенту
<question>Пациент на приёме у врача обычно находится в... положении.
<variant>около стола
<variant>лицом к лицу
<variant>напротив
<variant>сидя, откинувшись назад
<variant>через стол
<question>Если врач откидывается на спинку стула, у пациента может возникнуть мысль, что собеседник...
<variant>скучает
<variant>интересуется
<variant>не понимает

<variant>противится
<variant>спокоен
<question>Если врач наклоняет голову вправо в процессе разговора, а пациент кивает, поддерживая разговор, пациент может подумать, что собеседник...
<variant>интересуется
<variant>скучает
<variant>не понимает
<variant>противится
<variant>спокоен
<question>Естественная, непринуждённая, одинаковая поза... характеризует.
<variant>психологический комфорт
<variant>скрытый стресс
<variant>неготовность к общению
<variant>неуверенность
<variant>психологическое неудобство
<question>Необычные, искусственные позы указывают на ...
<variant>стресс
<variant>психологический комфорт
<variant>хорошее настроение
<variant>уверенность
<variant>открытость к общению
<question>Необычные, искусственные позы указывают на
<variant>психологическое неудобство
<variant>психологический комфорт
<variant>хорошее настроение
<variant>уверенность
<variant>открытость к общению
<question>Психологический комфорт указывает на...
<variant>хорошее настроение
<variant>забывчивость
<variant>невнимательность
<variant>возбудимость
<variant>неуверенность

<question>Неудобство в общении можно определить по...
<variant>закрытой позе
<variant>улыбке
<variant>хорошему настроению
<variant>открытости к общению
<variant>дружескому рукопожатию
<question>Люди, которые закрыты, оценивают себя строго, пытаются быть осторожными в общении, не доверяют окружающим и смотрят с подозрением, обычно предпочитают... позу.
<variant>симметричную
<variant>асимметричную
<variant>естественную
<variant>искусственную
<variant>закрытую
<question>Открытые, жизнерадостные люди, готовые к общению, предпочитают... позу.
<variant>асимметричную
<variant>симметричную
<variant>естественную
<variant>искусственную
<variant>закрытую
<question>Позы, которые показывают уклонение от общения с окружающими, называют... позами.
<variant>закрытыми
<variant>симметричными
<variant>асимметричными
<variant>естественными
<variant>искусственными
<question>Перекрещённые руки на груди (поза Наполеона), скрещённые ноги, руки в карманах или за спиной, развернутый к собеседнику корпус, взгляд в пол, окно или книгу — это признаки... позы.
<variant>закрытой
<variant>симметричной
<variant>асимметричной
<variant>естественной

<variant>искусственной
<question>Если тело и голова направлены к собеседнику, а взгляд устремлён в лицо собеседника, это... поза.
<variant>открытая
<variant>асимметричная
<variant>естественная
<variant>искусственная
<variant>закрытая
<question>Самая информативная деталь на лице человека — это...
<variant>линия губ
<variant>лицо
<variant>лоб
<variant>глаза
<variant>выражение лица
<question>Оптимальное время для установления психологического контакта с другим человеком с помощью взгляда — это...
<variant>3 сек
<variant>1 мин
<variant>30 сек
<variant>2 мин
<variant>10 сек
<question>Взгляд длительностью 3-10 секунд, который ставит собеседника в неудобное положение, называется...
<variant>внимательным взглядом
<variant>«беглым взглядом»
<variant>агрессивным вызовом
<variant>добрый приглашением
<variant>эффективным психологическим контактом
<question>Взгляд длительностью более 10 секунд называется...
<variant>агрессивным вызовом
<variant>внимательным взглядом
<variant>«беглым взглядом»
<variant>добрый приглашением
<variant>эффективным психологическим контактом

<question>«Агрессивный вызов» — это...
<variant>взгляд, длительностью более 10 секунд
<variant>быстрый взгляд
<variant>открытая улыбка
<variant>взгляд снизу вверх
<variant>дружеское рукопожатие
<question>Собеседники, уверенные в себе, спокойные, с высокой самооценкой, в ходе общения с другими людьми смотрят на собеседника ..., чем люди с низкой самооценкой.
<variant>чаще
<variant>реже
<variant>одинаково
<variant>в зависимости от реакции окружающих
<variant>всегда
<question>Частота взгляда зависит от...
<variant>ощущения наблюдения
<variant>позы
<variant>жестов
<variant>мимики
<variant>характера личности
<question>Во время общения, чтобы выразить настроение, состояние, суть беседы, определённое значение имеют звуки, которые называются...
<variant>паралингвистическим и элементами
<variant>словами
<variant>мимикой
<variant>жестами
<variant>позой
<question>К паралингвистическим признакам коммуникации НЕ относится...
<variant>акцент
<variant>уровень громкости голоса
<variant>слова
<variant>ритм
<variant>шероховатость
<question>Согласованность степени звучания и частоты в

слове воспринимается как знак ...
<variant>конфликтных отношении
<variant>хорошей психологической связи
<variant>положительных отношений
<variant>терпения
<variant>сильного воздействия
<question>Передача своим психическим особенностей и проблем другим людям называется...
<variant>проекция
<variant>контрпроекция
<variant>перенос
<variant>аффилияция
<question>Пациент воспринимает лечащую женщину-врача как свою мать, она воспринимает ее так, как воспринимала свою мать в детстве, и ожидает такую же помощь — это называется...
<variant>перенос
<variant>проекция
<variant>контрпроекция
<variant>аффилияция
<variant>сенситивность
<question>Хронический синдром усталости связан с...
<variant>постоянными эмоциональными связями с большим количеством людей
<variant>ночными дежурствами
<variant>работой по сменам
<variant>чрезмерным принятием пациентов
<variant>низкой зарплатой
<question>Анализ хода болезни и результатов анамнеза в повседневной практике требует от медицинского работника...
<variant>оценочного слушания
<variant>активного слушания
<variant>направленного слушания
<variant>безоценочного слушания
<variant>аргументации

<question>В зависимости от состояния пациента, его индивидуальных психологических особенностей и зависимости от заболевания, различная продолжительность характерна для стадии
<variant>аргументации
<variant>оценочного слушания
<variant>направленного слушания
<variant>безоценочного слушания
<variant>активного слушания
<question>Психологический метод "Если вы не можете бросить курить, я вас понимаю, потому что это могут победить только очень сильные люди" называется...
<variant>вызов
<variant>выбор
<variant>сократический диалог
<variant>достоинство
<variant>дефицит
<question>Психологический метод, когда пациента ставят в ситуацию выбора (например, очередь на консультацию или исследование), чтобы обойти собственно психологические жалобы пациента — это метод...
<variant>дефицита
<variant>слушания
<variant>сократического диалога
<variant>достоинства
<variant>вызова
<question>Модель управления НЕ применяется в...
<variant>психотерапии
<variant>клинике внутренних заболеваний
<variant>акушерстве и гинекологии
<variant>стоматологии
<variant>хирургии
<question>Оценка своего состояния без преувеличений, разумная оценка — это тип восприятия...

<variant>гармоничный
<variant>тревожный
<variant>ипохондрический
<variant>меланхолический
<variant>апатический
<question>Ожидание возможных отклонений или опасности, беспокойство о течении болезни — это тип восприятия...
<variant>тревожный
<variant>гармоничный
<variant>ипохондрический
<variant>меланхолический
<variant>апатический
<question>Полное безразличие к своей судьбе, последствиям заболевания и результатам лечения — это тип восприятия...
<variant>апатический
<variant>гармоничный
<variant>тревожный
<variant>ипохондрический
<variant>меланхолический
<question>К стратегии пациента НЕ относится...
<variant>депрессия
<variant>печаль
<variant>поглощение болезнью
<variant>искусственность
<variant>неадекватность
<question>Пациент, который полностью адаптирован к внешней среде, имеет много знакомых, интересуется многими вещами, гибок в отношениях с людьми и привлекает внимание большинства — это...
<variant>экстраверт
<variant>интроверт
<variant>аудиал
<variant>визуал
<variant>кинестетик
<question>С экстравертом лучше начать взаимодействие с...
<variant>создания эмоциональной связи
<variant>установления информационной связи

<variant>беседы
<variant>безоценочного слушания
<variant>аргументации
<question>Жизненные явления, которые оказывают влияние на важнейшие аспекты существования человека и приводят к глубокому психологическому стрессу, называются...
<variant>психический шок
<variant>болезнь
<variant>депрессия
<variant>тревога
<variant>сенситивность
<question>Ярость, возникающая при сильной боли, неудаче или неэффективности лечения, называется...
<variant>невростенической
<variant>гармоничной
<variant>тревожной
<variant>ипохондрической
<variant>меланхолической
<question>Беспокойство по поводу незначительных отклонений, неудач в лечении или мелких жизненных трудностей — это тип восприятия...
<variant>обсессивно-фобический
<variant>неврастенический
<variant>тревожный
<variant>ипохондрический
<variant>меланхолический
<question>Сильная озабоченность тем, как окружающие воспринимают информацию о своем заболевании, — это тип восприятия...
<variant>сенситивный
<variant>тревожный
<variant>ипохондрический
<variant>меланхолический
<variant>невростенический
<question>Попытки привлечь внимание близких через демонстрацию своего горя и

трудностей — это тип восприятия...
<variant>эгоцентрический
<variant>тревожный
<variant>ипохондрический
<variant>меланхолический
<variant>невростенический
<question>Безразличие к болезни и лечению — это тип восприятия...
<variant>апатичный
<variant>невростенический
<variant>тревожный
<variant>ипохондрический
<variant>эйфорический
<question>Столкновение двух противоположных тенденций в структуре личности называется...
<variant>конфликт
<variant>фрустрация
<variant>психологическая защита
<variant>конфронтация
<variant>конформизм
<question>Способ преодоления негативных эмоциональных состояний из-за нерешенного внутреннего конфликта называется...
<variant>психологическая защита
<variant>рефлексия
<variant>конформизм
<variant>фрустрация
<variant>автоагрессия
<question>Избавление от неприятных, неэффективных мыслей и желаний из сознания называется...
<variant>отрицание
<variant>вытеснение
<variant>проекция
<variant>замещение
<variant>сдвиг
<question>Психологические способы поведения, достигнутые и закрепленные в личной жизни и тренировках, называются...
<variant>рефлекс
<variant>привычка

<variant>инстинкт
<variant>фрустрация
<variant>импринтинг
<question>Основателем гуманистической директивной терапии является...
<variant>Фрейд
<variant>Юнг
<variant>Адлер
<variant>Роджерс
<variant>Периз
<question>К действиям терапевта, обеспечивающим его конгруэнтность и эффективность, НЕ относится...
<variant>критические действия
<variant>участие в разговоре в достаточной степени
<variant>адекватный язык жестов
<variant>визуальный контакт
<variant>верbalный контакт
<question>Для установления эффективной связи с пациентом достаточно присоединиться к нему на уровне...
<variant>продуктивной связи
<variant>формальной связи
<variant>близости
<variant>скрытости
<variant>формы мышления
<question>Зависимость восприятия от внутренних чувств называется...
<variant>интуиция
<variant>апперцепция
<variant>симпатия
<variant>эмпатия
<variant>рефлексия
<question>Процесс самопознания называется...
<variant>самовосприятие
<variant>интуиция
<variant>симпатия
<variant>рефлексия
<variant>эмпатия
<question>Процесс переноса субъекта своих личных качеств и состояния на внешние объекты называется...

<variant>перенос
<variant>ретресс
<variant>идентификация
<variant>проекция
<variant>отрицание
<question>Оценка возможностей и качеств личности, а также ее места среди других людей является ...
<variant>самооценка
<variant>самопознание
<variant>концепция «я»
<variant>уровень намерений
<variant>идеал «я»
<question>Стремление к действию, к цели деятельности, которое ощущается и не ощущается, называется ...
<variant>мотивация
<variant>концепция «я»
<variant>потребность
<variant>ценность
<variant>направленность
<question>Личные и психологические особенности, которые проявляются в деятельности человека и являются условием успешного выполнения называются ...
<variant>характер
<variant>направленность
<variant>интересы
<variant>способности
<variant>темперамент
<question>Сильное эмоциональное состояние стресса, возникающее из-за препятствий на пути к важной потребности связано с ...
<variant>психической травмой
<variant>оцепенением
<variant>фрустрацией
<variant>состоянием «дел-сал»
<variant>депривацией
<question>В ходе личной анкеты испытуемый часто задает вопросы, замечая уровень своих тестовых утверждений, это поведение указывает на ...

<variant>желание показать себя с хорошей стороны
<variant>выделение своих недостатков
<variant>низкий интеллектуальный и культурный уровень
<variant>использование неверных эталонов
<variant>потребность в достижениях
<question>Основная задача врача на этапе коррекции -
<variant>установить эмоциональную связь с пациентом
<variant>оказать эмоциональную поддержку пациенту
<variant>сообщить пациенту точный диагноз
<variant>сообщить прогноз заболевания
<variant>наблюдать за неверbalным поведением пациента
<question>Склонность, направленная на снижение патогенного эмоционального стресса и защиту от тяжелых чувств и мыслей, а также от развития психологических и физиологических отклонений называются ...
<variant>психологические защитные механизмы
<variant>копинг-механизмы
<variant>компенсаторные психологические механизмы
<variant>адаптационные психологические реакции
<variant>эмоциональные и рациональные
<question>Более продуктивными копинг-стратегиями пациента считаются ...
<variant>поиск партнерской и активной поддержки
<variant>эмоциональное успокоение и отвлечение

<variant>отвлечение и альтруизм
<variant>альtruизм и оптимизм
<variant>гипертимические признаки
<question>Клинический психолог оказывает психологическую помощь в учреждениях общего соматического лечения и профилактики:
<variant>совместно с врачом-ординатором
<variant>самостоятельно
<variant>совместно с психиатром
<variant>совместно с психиатром и психотерапевтом
<variant>совместно с психотерапевтом
<question>Психотерапевт и клинический психолог, работая с пациентом в невротическом состоянии, действуют ...
<variant>клинический психолог проводит психокоррекцию, а психотерапевт - психотерапию
<variant>клинический психолог проводит психодиагностику, а психотерапевт - медикаментозное лечение
<variant>психотерапевт проводит психотерапию, а клинический психолог - психодиагностику
<variant>психотерапевт и клинический психолог совместно проводят психотерапию с учетом разных направлений и целей
<variant>психотерапевт проводит психокоррекцию, а клинический психолог - лечебные мероприятия
<question>Психологические игры ...
<variant>вызывают агрессию
<variant>формируют и сохраняют «свой образ» перед другими

<variant>создают искренние и открытые отношения между людьми
<variant>снимают напряжение и поддерживают соматическое и психическое равновесие
<variant>усиливают внимание
<question>Сознание - это расширение чувств, интеграция противоречий, работа с воображением, принятие ответственности на себя, преодоление препятствий; это основной компонент метода в психотерапии называется ...
<variant>психотерапия индивидуальных препятствий Адлера
<variant>аналитическая психотерапия Юнга
<variant>психоанализ Фрейда
<variant>гештальт-терапия
<variant>гуманистическая психотерапия Роджерса
<question>Основой рациональной психотерапии ... является.
<variant>объяснение
<variant>убеждение
<variant>приведение примеров
<variant>коррекция личности
<variant>деонтология
<question>Уровень интеллектуальности пациента исследуется ...
<variant>через определение интеллектуального индекса
<variant>с помощью личных опросников
<variant>проективными методами
<variant>методами Люшера
<variant>методами Роршаха
<question>Тест Люшера используется для оценки ...
<variant>актуальных эмоциональных стрессов
<variant>ясности
интеллектуального развития
<variant>особенностей мышления
<variant>ясности сознания

<variant>степени мнестических отклонений
<question>Психологический механизм защиты, характеризующийся стремлением не принимать реальность беспокоящей ситуации называется ...
<variant>отрицание (непризнание)
<variant>вытеснение
<variant>проекция
<variant>рационализация
<variant>сублимация
<question>Психологический защитный процесс, проявляющийся в ошибочном восприятии внутреннего явления так, как если бы оно действительно происходило, называется ...
<variant>рационализация
<variant>сублимация
<variant>проекция
<variant>отрицание (непризнание)
<variant>вытеснение
<question>Формирование истерических черт поведения чаще всего связано с типом воспитания ...
<variant>«семейный кумир»
<variant>высокая опека
<variant>низкая опека
<variant>строгий
<variant>парадоксальная коммуникация
<question>Способ преодоления негативного эмоционального состояния, связанного с внутренним конфликтом без решения называется ...
<variant>внутренний личностный конфликт
<variant>психологическая коррекция
<variant>психологическая защита
<variant>фрустрация
<variant>стресс
<question>Избавление от нежелательных,

неэффективных желаний и мыслей из сознания называется ...
<variant>вытеснение
<variant>замещение
<variant>отрицание
<variant>рационализация
<variant>сублимация
<question>Энергичность, скорость, склонность к общению, стремление к руководству, отсутствие критического взгляда на себя, высокие интересы, склонность к риску – это признаки ... типа акцентуации характера.
<variant>эмоционального
<variant>педантичного (ригидность)
<variant>гипертимного
<variant>демонстративного
<variant>гипотимного
<question>Стремление постоянно находиться в центре внимания, склонность к хвастовству, лжи, артистичности, искусственноному поведению – это отрицательные качества, характерные для акцентуации ... характера.
<variant>демонстративного
<variant>педантичного
<variant>цикloidного
<variant>гипертимного
<variant>гипотимного
<question>Постоянное низкое настроение, апатия, склонность к грусти и одиночеству, неспособность к общению, пессимистический взгляд характерны для акцентуации характера...
<variant>гипотимного
<variant>гипертимного
<variant>тревожного
<variant>эйфоричного
<variant>демонстративного
<question>Неуверенность в себе, застенчивость, склонность к сомнениям, пессимизму, чрезмерная

трусость, страх – такие качества характерны для акцентуации ... характера
<variant>тревожного
<variant>эйфоричного
<variant>цикloidного
<variant>стагнационного
<variant>гипертимного
<question>Чрезмерная чувствительность, доброта, милосердие, склонность сопереживать другим – такие качества характерны для акцентуации ... натуры.
<variant>эмотивной
<variant>цикloidной
<variant>стагнационной
<variant>педантичной
<variant>демонстративной
<question>Ригидность убеждений, устойчивость взглядов, субъективность в оценке жизненных явлений, подозрительность, недоверие к другим, скептицизм – такие качества характерны для акцентуации ... натуры
<variant>педантичной
<variant>стагнационной
<variant>эмотивной
<variant>тревожной
<variant>демонстративной
<question>Чрезмерная вспыльчивость, импульсивность, агрессивность, раздражительность, конфликтность – такие качества характерны для акцентуации ... характера.
<variant>воздушного
<variant>педантичного
<variant>эмотивного
<variant>стагнационного
<variant>тревожного
<question>Чрезмерная нестабильность настроения характерна для акцентуации ... поведения, на которую влияют самоощущение, сон, аппетит, работоспособность и способность к общению.

<variant>дистимного
<variant>циклоидного
<variant>возбудимого
<variant>стагнационного
<variant>педантичного
<question>Формирование очень ценных идей, аффективная вспыльчивость, жестокость, мстительность – такие качества характерны для акцентуации ... натуры.
<variant>паранойяльной
<variant>дистимной
<variant>стагнационной
<variant>возбудимой
<variant>гипертимной
<question>Чрезмерная чувствительность, доброта, страх, неуверенность в себе характерны для акцентуации...натурь.
<variant>гипотимной
<variant>возбудимой
<variant>гипертимной
<variant>эйфоричной
<variant>паранойяльной
<question>Признак поведения, НЕ относящийся к защитным механизмам:
<variant>фрустрация
<variant>вытеснение
<variant>рационализация
<variant>отрицание (непризнание)
<variant>интеллектуальная защита
<question>Термин, который используется для обозначения защиты от опасного объекта через его распознавание:
<variant>идентификация
<variant>вытеснение
<variant>проекция
<variant>рационализация
<variant>ретрессия
<question>К психосоматическим расстройствам НЕ относятся ...
<variant>конверсионные симптомы
<variant>психосоматические симптомы

<variant>функциональные симптомы
<variant>психосоматозы
<variant>неврастения
<question>В группу соматоформных расстройств НЕ входит...
<variant>деонтологические болезни
<variant>ипохондрические расстройства
<variant>соматоформные вегетативные дисфункции
<variant>неврастения
<variant>соматизированные расстройства
<question>Основной целью психозащитного действия является ...
<variant>уменьшение тревоги, избегание требований реальной жизни, поддержание достаточного уровня самооценки
<variant>решение проблемы, стоящей перед личностью
<variant>расслабление, улучшение настроения
<variant>уменьшение «обратной энергии»
<variant>решение проблемы
<question>Человек, зависимый от алкоголя, но не признающий свою проблему использует защиту ...
<variant>отрицание (непризнание)
<variant>примитивная изоляция
<variant>особый контроль
<variant>проекция
<variant>интеракция
<question>У маленьких детей уверенность в том, что их родители обладают особыми магическими способностями называется ...
<variant>примитивная идеализация
<variant>особый контроль
<variant>проекция

<variant>примитивная изоляция
<variant>интроекция
<question>Методика Векслера осуществляется через ...
<variant>исследования интеллекта
<variant>исследования памяти
<variant>исследования человека
<variant>исследования уровня усвоения
<variant>исследования невротического уровня
<question>Апперцепция - это ...
. <variant>зависимость восприятия от предыдущего психического опыта
<variant>строгое восприятие пространства памяти
<variant>эмоциональная реакция
<variant>тип памяти
<variant>сознание
<question>Оценка личности себя, своих возможностей, качеств и сравнение с другим называется ...
<variant>самооценка
<variant>самосознание
<variant>концепция «я»
<variant>уровень стремления
<variant>эйфория
<question>Тип реакции на проявления в начале и в концентрируется ...
<variant>психический процесс
<variant>агрессия
<variant>психическое проявление
<variant>психическое состояние
<variant>трансовое состояние
<question>В психологическом тестировании является ... противопоказанием.
<variant>употребление психотропных веществ
<variant>наличие телесных заболеваний

<variant>наличие в анамнезе психических расстройств
<variant>алкоголизм
<variant>проживание в местах, где проводятся тесты
<question>К подготовительному этапу волевого воздействия НЕ относится ...
<variant>самооценка
<variant>понимание цели
<variant> понимание смысла цели
<variant>понимание достижимости цели
<variant>принятие решения
<question>Объективный образ субъективного мира называется ...
<variant>психика
<variant>объективная реальность
<variant>психологическое проявление
<variant>творчество
<variant>агрессия
<question>Психологический подход, закрепленный в личной жизни и упражнениях называется ...
<variant>навык
<variant>рефлекс
<variant>бессознательное чувство
<variant>фрустрация
<variant>импринтинг
<question>Столкновение двух противоположных тенденций в структуре личности называется ...
<variant>конфликт
<variant>фрустрация
<variant>психологическая защита
<variant>конфронтация
<variant>конформизм
<question>Уверенность человека в своей правоте, подтвержденная соответствующими аргументами и фактами называется ...

<variant>уверенность
<variant>сознание
<variant>ориентация
<variant>занятая самооценка
<variant>эгоцентризм
<question>Групповое противоречивое поведение, характеризующееся повышением агрессивных проявлений и снижением ответственности за происходящее, называется ...
<variant>результат группы
<variant>результат руководства группы
<variant>результат социального заражения
<variant>результат социальной поддержки
<variant>результат неопределенности
<question>Вероятность развития инновационного противоречия НЕ увеличивается ...
<variant>когда в инновационном процессе участвует небольшое количество людей
<variant>если процесс не обеспечен информацией
<variant>в процессе стремительной инновации
<variant>в радикальном обновлении
<variant>в масштабных новшествах
<question>В исследовании противоречий методы сублимации, проекции, рационализации, вытеснения и регрессии относятся ...
<variant>к биopsихологической трактовке внутримышечного конфликта
<variant>к неучтенному научному направлению исследования противоречий
<variant>к демонстрации противоречия «родительского сценария жизни»

<variant>к удовлетворению, вызываемому фрустрацией других, сопротивлению «невротическим потребностям»
<variant>к бихевиоральной трактовке внутримышечного конфликта
<question>Компонент структуры суицидного поведения, состоящий из суицидных мыслей или действий называется ...
<variant>аффективный
<variant>исполнительный
<variant>параноидный
<variant>паранойяльный
<variant>ориентационный
<question>В соответствии с основным критерием разрешения противоречия, вариант финала ...
<variant>подчинение правилам совместного использования объекта
<variant>прекращение противоречия
<variant>разделение объекта противоречия
<variant>одностороннее или двустороннее устранение
<variant>победа одной стороны
<question>Укажите как правильно поступить, если вас хотят использовать с помощью запроса «войти в ваше положение»
<variant>не брать на себя ответственность
<variant>четко объяснить, что вы можете решить проблему сами
<variant>выразить соболезнования другу и убедить его, что вы его поддержите
<variant>спросить у друга, что для него самое трудное
<variant>отложить выполнение общей работы на позднее время

<question>Основным условием предотвращения противоречий, состоящим из перечисления всех социальных проблем и формирования нормативных действий является ...

<variant>соблюденение взаимного баланса
<variant>соблюдение баланса совместных действий
<variant>равновесие самооценки и внешней оценки
<variant>соблюдение равенства ролей

<variant>соблюдение разбросанного равновесия
<question>Асимметричные отношения людей без хорошей обратной связи называются ...
<variant>выполнение социального запроса
<variant>дуальные отношения
<variant>иллюзорные отношения
<variant>ревизионные отношения
<variant>управленческие отношения

<question>Процесс, облегчающий взаимодействие партнеров и повышающий эффективность действий группы в условиях противоречия называется ...
<variant>фасилитацией
<variant>синхронизацией
<variant>апперцепцией
<variant>медиацией
<variant>коммуникацией
<question>Человек, обладающий специальными знаниями и обеспечивающий окончательный выбор между оппонентами, конструктивное разрешение противоречия, это ...

<variant>mediator
<variant>помощник
<variant>арбитр
<variant>третейский суд
<variant>наблюдатель

<question>Эмоциональное выгорание — это синдром, состоящий из множества симптомов и их проявлений, кроме ...

<variant>повышения психической активности
<variant>эмоционального, физического и умственного истощения
<variant>снижения аппетита и обострения хронических заболеваний
<variant>головной боли, гипертонии, нарушений сна
<variant>психосоматических и психовегетативных расстройств поведения
<question>Особенности психики, повышенной скорости нервных реакций, связь с окружающей средой ... это.

<variant>динамичность
<variant>инертность
<variant>устойчивость
<variant>темперамент
<variant>лабильность
<question>Метод, используемый для самооценки, который применяется для описания здоровья и умственных способностей

<variant>метод Дембо-Рубинштейна
<variant>метод Роршаха

<variant>миннесотский

многопрофильный личностный

опросник (MMPI)

<variant>тест Люшера

<variant>метод фruстрации

Розенцвейга

<question>На приеме у динамического психотерапевта пациентка сообщает о своих симптомах и выражает симпатию к врачу, тактика последнего...

<variant>сделать вид, что не замечает

<variant>не обращать внимания во время лечения, а затем поговорить позже

<variant>объяснить пациенту в начале лечения

<variant>сделать симпатию пациента темой обсуждения
<variant>проводить семейную психотерапию

<question>По Юнгу архетипы показывают «первичные образы», которые существуют в каждом человеке, и они составляют...

<variant>индивидуальное бессознательное

<variant>совершенное бессознательное

<variant>коллективное бессознательное

<variant>личное бессознательное

<variant>высшее бессознательное

<question>В кабинет психотерапевта сначала вошла мать 4-летнего ребёнка, затем отец. На предложение психотерапевта сесть на стулья семья отреагировала так: мать строго приказала ребёнку сидеть рядом с

психотерапевтом, сама села в 3 метрах позади ребёнка, а отец сидел ещё дальше, на 2 метра от матери. Был сформирован семейный треугольник. Такое расположение...

<variant>показывает, что они привыкли жить в большом доме

<variant>означает, что родители доверяют воле детей<variant>указывает на эмоциональное отстранение
<variant>гарантирует психологическую безопасность в кабинете

<variant>означает, что они привыкли жить в маленькой квартире

<question>Чувства удлинения, укорочения и искривления конечностей, а также изменение восприятия «Я», проявляющееся в виде психосенсорных инtero- и проприоцептивных нарушений, это...

<variant>синдром нарушения схемы тела

<variant>галлюцинозный синдром

<variant>деперсонализация

<variant>дереализация

<variant>симптом

Ашарффенбурга

<question>Метод психологии, который позволяет получать информацию об объекте, отвечая на заранее подготовленные и целенаправленные вопросы в письменной форме...

<variant>тест

<variant>беседа

<variant>интервью

<variant>социометрия

<variant>аннотирование

<question>Фиксационная амнезия характерна для ...

<variant>Корсаковского синдрома

<variant>психоорганического синдрома

<variant>астенического синдрома

<variant>депрессивного синдрома

<variant>маниакального синдрома

<question>Нарушение памяти и интеллекта НЕ характерно для...

<variant>неврастении

<variant>эпилепсии

<variant>прогрессирующего паралича

<variant>церебрального атеросклероза

<variant>шизофрении

<question>Конфабуляция НЕ бывает при...

<variant>неврозах

<variant>травматическом повреждении мозга

<variant>сосудистом повреждении головного мозга

<variant>мозговом сифилисе

<variant>алкогольной энцефалопатии

<question>Отличие дисфории от помутнения сознания...

<variant>дезориентация в пространстве и времени

<variant>жестокий аффект

<variant>агрессия

<variant>появление пароксизмов

<variant>появление в эпилепсии

<question>Помутнение сознания при сопоре НЕ характеризуется...

<variant>ориентацией в личности

<variant>ориентацией во времени

<variant>отсутствием речевого контакта

<variant>сохраненной ориентацией

<variant>сохранением подвижности и мимических реакций при сильном возбуждении

<question>Различие между делирием и онейроидным помутнением сознания заключается в...

<variant>аллопсихической дезориентации

<variant>фантастическом беспокойстве

<variant>реальных зрительных галлюцинациях

<variant>двигательном возбуждении

<variant>частичной амнезии

<question>Пациент говорит, что он «видит за стеной своим внутренним взглядом» — это...

<variant>псевдогаллюцинации

<variant>сенестопатии

<variant>настоящие галлюцинации

<variant>вербальные галлюцинации

<variant>прайдоплические иллюзии

<question>Пациент утверждает, что его голова уменьшилась до размера грецкого ореха — это...

<variant>нарушение схемы тела

<variant>сенестопатии

<variant>настоящие галлюцинации

<variant>вербальные галлюцинации

<variant>псевдогаллюцинации

<question>Пациент, глядя в зеркало, говорит:

«Удивительно. Это мое лицо, но внутренний мир не мой» — это...

<variant>деперсонализация

<variant>сенестопатия

<variant>дереализация

<variant>парейдоля

<variant>псевдогаллюцинации

<question>Пациент после разговора с начальником жалуется на внезапное исчезновение всех видов чувствительности в нижней части тела — это...

<variant>истерическая анестезия

<variant>нарушение схемы тела

<variant>псевдогаллюцинация

<variant>гиперестезия

<variant>повреждение передней центральной извилины

<question>Доктор во время опроса жалоб пациента, его состояния и здоровья слышит от пациента повторение фразы: «Меня ударили по голове... Меня ударили по голове...» — это...

<variant>персеверация

<variant>систематическое мышление
<variant>дублирующие мысли
<variant>резонерское мышление
<variant>паралогическое мышление
<question>Студент четко записывает свои мысли на бумаге, но стесняется, когда кто-то смотрит. Перед публичным выступлением, чтобы побороть страх, он должен 5 раз ущипнуть себя за колено — это...
<variant>ритуалы
<variant>символические мысли
<variant>ипохондрическая бредовость
<variant>чрезмерно ценные мысли
<variant>психические автоматизмы
<question>Вера в наличие физического дефекта — это...
<variant>дисморфоманический бред
<variant>бред самообвинения
<variant>искусственный бред
<variant>всеобъемлющий бред
<variant>влияющий бред
<question>Пациент в возбуждении говорит: «Это неправильно! Люди как бронзовые солдаты, а их дома как картонные коробки» — это...
<variant>дереализация
<variant>гиперстезия
<variant>сенестопатия
<variant>псевдогаллюцинация
<variant>гипостезия
<question>У пациента одновременно наблюдаются любовь, страсть и одновременно раздражение, ненависть к матери — это...
<variant>амбивалентность
<variant>полипрагмазия
<variant>лабильность
<variant>дисфория
<variant>сенестопатия

<question>Повышенная двигательная активность наблюдается при
<variant>маниакальном возбуждении
<variant>гебефреническом возбуждении
<variant>кататоническом возбуждении
<variant>гипертимии
<variant>лабильности
<question>Негативизм — это...
<variant>кататонический ступор
<variant>депрессивный синдром
<variant>маниакальное возбуждение
<variant>психогенный ступор
<variant>гебефренический синдром
<question>Мысли о самообвинении встречаются при ...
<variant>депрессивном синдроме
<variant>кататоническом ступоре
<variant>липкости
<variant>навязчивых мыслях
<variant>эксплозивности
<question>Пациент, 74 года, не узнает своего врача, не может найти свою палату и кровать, не знает, приходила ли его дочь. У пациента наблюдается нарушение памяти по типу...
<variant>фиксационной амнезии
<variant>репродукционной амнезии
<variant>антероградной амнезии
<variant>ретроградной амнезии
<variant>криптомнезии
<question>Состояние, сопровождающееся сохранением самоощущения и двигательным возбуждением, образным бредом, иллюзиями, зрительными галлюцинациями, характерное для неясной

галлюцинационной формы острого психоза...
<variant>делирий
<variant>галлюциноз
<variant>алкогольный параноид
<variant>алкогольная энцефалопатия
<variant>энцефалопатия Гайе-Вернике
<question>К симптомам расстройства настроения НЕ относится...
<variant>гипобулия
<variant>гипертимия
<variant>апатия
<variant>тревога
<variant>эйфория
<question>На экзамене студент сильно нервничал, не мог вспомнить название лекарства. Когда он вышел из кабинета экзаменатора, внезапно вспомнил название лекарства. У студента наблюдается нарушение памяти, подобное...
<variant>фиксационной амнезии
<variant>прогрессирующей амнезии
<variant>симптом «De javue»
<variant>ретроградной амнезии
<variant>антероградной амнезии
<question>После суточного дежурства врач очень устал. По дороге домой в трамвае борется с сонливостью. Когда он вышел на своей остановке, он понял, что находится в другом месте, окружающие дома, улицы, магазины показались ему незнакомыми. Какое нарушение памяти наблюдается у врача?
<variant>синдром помрачнения сознания
<variant>прогрессирующая амнезия
<variant>псевдореминисценция
<variant>фиксационная амнезия

<variant>ретроградная амнезия
<question>Для дереализации характерно...
<variant>ложное восприятие окружающей среды
<variant>потеря чувства «Я»
<variant>восприятие без реальных объектов
<variant>отчуждение от окружающей среды
<variant>ошибочное восприятие окружающей среды
<question>Признак, НЕ свойственный истинным галлюцинациям...
<variant>«искусственные», «преднамеренно сделанные» мысли вызывают беспокойство
<variant>настоящая проекция
<variant>идентификация с реальным объектом
<variant>внешняя проекция
<variant>тяга к краже
<question>Нарушения, НЕ относящиеся к изменениям восприятия...
<variant>абулия
<variant>парастезия
<variant>анестезия
<variant>гиперестезия
<variant>сенестопатия
<question>Нарушение восприятия, при котором объект воспринимается без реального существования, называется...
<variant>галлюцинацией
<variant>сенестопатией
<variant>иллюзии
<variant>метаморфопсиией
<variant>дисморфопсиией
<question>Ощущения жжения, давления, растяжения, исходящие от внутренних органов называются...
<variant>сенестопатией
<variant>гиперестезией
<variant>дисморфопсиией
<variant>иллюзией
<variant>гипнагогической галлюцинацией

<question>Галлюцинации, вызванные внушением, характерны для...
<variant>шизофрении
<variant>интоксикационных психозов
<variant>делирия
<variant>реактивных психозов
<variant>психопатий
<question>Различие между висцеральными галлюцинациями и сенестопатиями заключается в том, что...
<variant>ощущается наличие чего-то в определенном внутреннем органе
<variant>является ясным местоположение
<variant>отсутствие объективных причин для появления
<variant>перемещение
<variant>обманчивость
<question>Критерии псевдогаллюцинаций...
<variant>нет реального расположения в внешней среде
<variant>имеет реальное расположение в внешней среде
<variant>появляются во сне
<variant>появляются при пробуждении
<variant>находятся за пределами зрительного поля
<question>К простым галлюцинациям относятся...
<variant>фотопсии
<variant>гипнагогические галлюцинации
<variant>гипнотомические галлюцинации
<variant>экстракампновые галлюцинации
<variant>галлюцинации по типу Шарля Бонне
<question>Психосенсорные расстройства НЕ включают...
<variant>сенестопатии
<variant>метаморфопсии
<variant>макропсии

<variant>нарушения схемы тела
<variant>микропсии
<question>Пациент слышит, как незнакомые люди общаются между собой, слышит о себе угрозы и оскорблений — это расстройство называется...
<variant>слуховые галлюцинации
<variant>комментирующие галлюцинации
<variant>нейтральные галлюцинации
<variant>рефлекторные галлюцинации
<variant>эпизодические галлюцинации
<question>Деперсонализация — это расстройство...
<variant>ощущений и восприятия
<variant>памяти
<variant>самосознания
<variant>мышления
<variant>интеллекта
<question>К нарушениям восприятия относится синдром...
<variant>галлюцинаторный
<variant>депрессивный
<variant>маниакальный
<variant>кататонический
<variant>приступообразный
<question>Нарушению темпа мышления НЕ относится...
<variant>резонерство
<variant>ускорения мышления
<variant>шперрунг
<variant>ментизм
<variant>замедление мышления
<question>Если речь пациента состоит из отдельных слов, бессвязных фраз, то это относится к виду нарушения мышления...
<variant>бессвязное
<variant>прерывистое
<variant>резонерство
<variant>паралогическое

<variant>аморфное
<question>Бессвязное (инкогерентное) мышление возникает при...
<variant>аменции
<variant>делирии
<variant>онейроиде
<variant>нарушении сознания с помутнением
<variant>обнуилиации
<question>К критериям бреда НЕ относится...
<variant>критическое отношение
<variant>навязчивые мысли
<variant>патологический состав мысли
<variant>невозможность логической коррекции
<variant>неверное восприятие реальности
<question>Ментизм чаще всего встречается при синдроме...
<variant>психических автоматизмов
<variant>паранойяльном
<variant>маниакальном
<variant>Корсаковском
<variant>ипохондрическом
<question>Агглютинация — это...
<variant>совмещение различных, не соответствующих друг другу понятий
<variant>новое понимание
<variant>бессмысленные рассуждения
<variant>поток болезненных мыслей
<variant>прекращение потока мыслей
<question>Паралогическое мышление чаще всего встречается при...
<variant>шизофрении
<variant>психопатии
<variant>эпилепсии
<variant>неврозах
<variant>инволюционных психозах

<question>К навязчивым мыслям НЕ относится...
<variant>абулия
<variant>клаустрофобия
<variant>кардиофобия
<variant>дисморфомания
<variant>сифилофобия
<question>Суицидальные мысли НЕ характерны для...
<variant>дисморфомании
<variant>истерии
<variant>депрессии
<variant>галлюцинозов
<variant>шизофрении
<question>Навязчивый страх НЕ включает в себя...
<variant>дисморфоманию
<variant>сифилофобию
<variant>танатофобию
<variant>клаустрофобию
<variant>кардиофобию
<question>Явное ускорение мыслительной деятельности называется...
<variant>скачкообразные мысли
<variant>ментизм
<variant>резонерность
<variant>вербигерация
<variant>персеверация
<question>Непроизвольный поток мыслей — это...
<variant>ментизм
<variant>персеверация
<variant>шперрунг
<variant>резонерность
<variant>навязчивые мысли
<question>К патологиям мышления НЕ относится...
<variant>криптомнезия
<variant>ускорение мыслей
<variant>реалистическое образное мышление
<variant>замедление
<variant>резонерность
<question>Социальную опасность представляют пациенты с...
<variant>императивными галлюцинациями
<variant>астеническим синдромом

<variant>истерическим синдромом
<variant>корсаковским синдромом
<variant>парафранным синдромом
<question>К нарушениям темпа мышления НЕ относится...
<variant>тщательность
<variant>ментизм
<variant>шперрунг
<variant>ускорение
<variant>замедление
<question>Для ускорения мышления НЕ характерно...
<variant>низкая продуктивность
<variant>увеличение ассоциаций
<variant>прерывистость внимания
<variant>патологическая тщательность
<variant>насильственное течение мыслей
<question>Широкие, фантастические идеи в бреде характерны для... синдрома.
<variant>парафренического синдрома
<variant>галлюцинаторного синдрома
<variant>параноидного синдрома
<variant>параноидального синдрома
<variant>синдрома Кандинского-Клерамбо
<question>В синдром Корсакова НЕ входит...
<variant>ускорение ассоциативных процессов
<variant>прогрессирующая амнезия
<variant>фиксационная амнезия
<variant>конфабуляции или псевдореминисценции
<variant>дезориентация в пространстве и времени
<question>Прогрессирующая амнезия НЕ встречается при...

<variant> маниакально-депрессивном психозе
<variant> психозе старческого возраста
<variant> болезни Пика
<variant> прогрессирующим параличе
<variant> атрофических заболеваний головного мозга
<question> К количественным нарушениям памяти НЕ относится...
<variant> конфабуляции
<variant> гипермнезия
<variant> гипомнезия
<variant> амнезия
<variant> прогрессирующая амнезия
<question> К качественным нарушениям памяти НЕ относится...
<variant> антероградная амнезия
<variant> псевдореминисценции
<variant> конфабуляции
<variant> парамнезии
<variant> криптомнезия
<question> Полная утрата памяти — это...
<variant> амнезия
<variant> апатия
<variant> апраксия
<variant> афазия
<variant> абулия
<question> Психоорганическом у синдрому НЕ относится...
<variant> кататония
<variant> ослабление мышления
<variant> неустойчивость аффекта
<variant> ментизм
<variant> дисмнезия
<question> Деменция НЕ встречается при...
<variant> психопатии
<variant> атрофических процессах головного мозга
<variant> прогрессирующим параличе
<variant> обсессивном психозе
<variant> черепно-мозговой травме

<question> Врождённая умственная отсталость называется...
<variant> олигофренией
<variant> частичной умственной отсталостью
<variant> болезнью Пика
<variant> деменцией
<variant> болезнью Альцгеймера
<question> В состав депрессивного синдрома НЕ входит...
<variant> нарциссический бред
<variant> дистресс
<variant> бред самообвинения
<variant> замедление мышления
<variant> снижение памяти
<question> К патологиям эмоционального фона НЕ относится...
<variant> абулия
<variant> паратимия
<variant> дисфория
<variant> мания
<variant> тревога
<question> Глубокая форма психического ограничения, выражающаяся в утрате связи с окружающим миром, называется...
<variant> аутизм
<variant> апатия
<variant> абулия
<variant> ступор
<variant> негативизм
<question> У пациента наблюдается повышение активности, повышенная работоспособность...
<variant> мания
<variant> эйфория
<variant> дисфория
<variant> мория
<variant> гиперкинезия
<question> Тип навязчивого поведения...
<variant> пиромания
<variant> геронтофилия
<variant> канцерофобия
<variant> педофилия

<variant> аграфобия
<question> Глубокая апатия, характеризующаяся отсутствием чувств...
<variant> апатия
<variant> адинания
<variant> анестезия
<variant> депрессия
<variant> дисфория
<question> Патологическое повышение потребности в пище называется...
<variant> булимия
<variant> анорексия
<variant> пиромания
<variant> клептомания
<variant> полидипсия
<question> К нарушениям интересов НЕ относится...
<variant> клаустрофобия
<variant> нервная анорексия
<variant> полидипсия
<variant> абулия
<variant> клептомания
<question> К нарушениям интересов НЕ относится...
<variant> мутизм
<variant> дромомания
<variant> фетишизм
<variant> наркомания
<variant> пиромания
<question> Снижение или потеря чувства голода называется...
<variant> анорексия
<variant> апраксия
<variant> абулия
<variant> негативизм
<variant> апатия
<question> При помутнении сознания наблюдается...
<variant> нарушение концентрации внимания
<variant> эмоциональная лабильность
<variant> трудности в анализе ситуации
<variant> фиксационная амнезия
<variant> снижение познавательной деятельности

<question>Для онейроидного состояния НЕ характерно...
<variant>истинные зрительные галлюцинации
<variant>антагонистический бред
<variant>кататонические нарушения
<variant>психомоторное возбуждение
<variant>дезориентация в месте, времени и личности
<question>Для аменции НЕ характерно...
<variant>понимание происходящих событий
<variant>плохой прогноз
<variant>несвязность мышления
<variant>запоминание болезненных переживаний
<variant>глубокая оглушенность сознания
<question>Вариант помутнения сознания — это...
<variant>амбулаторный автоматизм
<variant>абсанс
<variant>делирий
<variant>фуга
<variant>транс
<question>К психотической патологии сознания НЕ относится...
<variant>сопор
<variant>обнубилия
<variant>делирий
<variant>состояние помутнения сознания
<variant>онейроид
<question>Показания для срочной госпитализации НЕ включают...
<variant>неэффективность амбулаторного лечения
<variant>суицидальные действия
<variant>опасность для окружающих
<variant>агрессивные тенденции

<variant>психомоторное возбуждение
<question>Состояния, не требующие срочной госпитализации...
<variant>лакунарная деменция
<variant>помутнение сознания
<variant>алкогольный делирий
<variant>депрессивное состояние с суицидальными мыслями
<variant>психомоторное возбуждение
<question>Иллюзии, протекающие без нарушения психической функции, называются...
<variant>функциональные
<variant>слуховые
<variant>аффективные
<variant>вербальные
<variant>парейдотические
<question>При дереализации НЕ наблюдается...
<variant>нарушения сознания
<variant>искаженное восприятие окружающего мира
<variant>нарушение критического отношения
<variant>ощущение ложности и измененности мира
<variant>ощущение отчуждения от окружающего мира
<question>Экстракампинные галлюцинации — это...
<variant>зрительные образы, которые проецируются не в поле зрения, а по бокам или за пределами видимости пациента
<variant>фотопсия
<variant>галлюцинации, возникающие при пробуждении
<variant>галлюцинации, возникающие при засыпании
<variant>псевдогаллюцинации
<question>Симптом Липмана характерен для... галлюцинаций.
<variant>внущенных
<variant>гипногогических

<variant>функциональных
<variant>гипногогических
<variant>слуховых
<question>Истинные зрительные галлюцинации чаще всего встречаются при...
<variant>алкогольной делирии
<variant>реактивном психозе
<variant>шизофрении
<variant>эпилепсии
<variant>маниакально-депрессивном психозе
<question>Ошибочное восприятие формы, размера и расположения объектов в пространстве называется...
<variant>метаморфопсия
<variant>истинные галлюцинации
<variant>иллюзия
<variant>сенестопатия
<variant>псевдогаллюцинации
<question>Чувство присутствия «живого организма» в желудке — это...
<variant>висцеральная галлюцинация
<variant>сенестопатия
<variant>истинные галлюцинации
<variant>иллюзия
<variant>аутометаморфопсия
<question>Критерий истинных галлюцинаций:
<variant>явная чувственность галлюцинации
<variant>локализация галлюцинации в голове
<variant>критерий «выполненности»
<variant>влияние на психическое «Я»
<variant>критика состояния пациента
<question>Иллюзия — это...
<variant>ошибочное, ложное восприятие реальных объектов
<variant>ложное восприятие реальных объектов
<variant>ложное ощущение увеличения конечностей

<variant>видение образов в голове
<variant>ошибочные мысли
<question>Критериям бреда НЕ относится...
<variant>навязчивые мысли
<variant>патологический состав мыслей
<variant>болезненная основа появления
<variant>убежденность в правильности мыслей
<variant>невозможность логической коррекции
<question>Персеверация в мышлении — это...
<variant>застревание на определенном понятии или ответах
<variant>ментизм
<variant>отсутствие логической связи в мышлении
<variant>склонность к бесплодному анализу
<variant>отсутствие связи между отдельными мыслями
<question>К первичному бреду НЕ относится...
<variant>наследственность
<variant>выдумывание
<variant>реформаторский
<variant>ревность
<variant>самоуничтожение
<question>Отличие первичного бреда от вторичного:
<variant>система доказательств
<variant>устойчивость уверенности
<variant>ложные выводы
<variant>отсутствие коррекции
<variant>неустойчивость к коррекции
<question>К обсессии НЕ относится...
<variant>фобии
<variant>контрастные влечения
<variant>дипсомания
<variant>подозрительность
<variant>ритуалы
<question>Невозможность отличить чужие события от

своих собственных называется...
<variant>криптомнезия
<variant>конфабуляция
<variant>амнезия
<variant>псевдореминисценция
<variant>экмнезия
<question>Пациент жалуется на ощущение "кислотного вещества, которое обжигает внутри груди" — это...
<variant>сенестопатия
<variant>гиперестезия
<variant>парестезия
<variant>психосенсорное расстройство
<variant>псевдогаллюцинация
<question>Нарушения памяти и интеллекта НЕ характерны для...
<variant>неврастении
<variant>эпилепсии
<variant>прогрессивного паралича
<variant>церебрального атеросклероза
<variant>шизофрении
<question>Конфабуляции НЕ встречаются при...
<variant>неврозах
<variant>черепно-мозговых травмах
<variant>сосудистых поражениях мозга
<variant>сифилисе мозга
<variant>алкогольной энцефалопатии
<question>Корсаковскому синдрому НЕ присуще...
<variant>ментизм
<variant>фиксационная амнезия
<variant>конфабуляция
<variant>нарушение ориентации в собственном «Я»
<variant>нарушение ориентации во времени
<question>При дереализации НЕ наблюдается...
<variant>нарушение самопознания

<variant>ложное восприятие окружающего мира
<variant>критическое отношение к происходящему
<variant>чувство изменений, несоответствия реальности
<variant>ощущение чуждости окружающего мира
<question>Амнестические расстройства относятся к...
<variant> синдрому Корсакова
<variant> синдрому Кандинского-Клерамбо
<variant>кататоническому синдрому
<variant>гебефреническому синдрому
<variant>делириозному синдрому
<question>Самоубийства часто встречаются при ... синдроме.
<variant>депрессивном
<variant>параноидном
<variant>галлюцинаторном
<variant>кататоническом
<variant>маниакальном
<question>Симптом, НЕ входящий в депрессивный синдром...
<variant>чрезмерная оценка своих возможностей
<variant>тревога
<variant>замедление движений
<variant>мысли о своей неполноценности
<variant>замедление мышления
<question>Патологический аффект — это...
<variant>активная двигательная реакция с помутнением сознания
<variant>активная двигательная реакция без помутнения сознания
<variant>высокая подвижность при хорошем настроении
<variant>обаятельное настроение
<variant>кратковременное помутнение сознания

<question>К кататоническому синдрому НЕ относится...
<variant>амнезия
<variant>негативизм
<variant>ступор
<variant>мутизм
<variant>катаleпsия
<question>К психомоторному возбуждению НЕ относится...
<variant>безумие
<variant>мания
<variant>гебефренический
<variant>кататонический
<variant>сандраки
<question>К расстройствам воли НЕ относится...
<variant>апатия
<variant>абулия
<variant>парабулия
<variant>гипобулия
<variant>гипербулия
<question>Влечеnие к бродяжничеству — это...
<variant>дромомания
<variant>анорексия
<variant>булемия
<variant>пиromания
<variant>клептомания
<question>Патология сознания психотического типа НЕ включает...
<variant>обнуилияция
<variant>помутнение
<variant>аменция
<variant>онейроид
<variant>делирий
<question>В этиологии делирия нет ... фактора.
<variant>психогенного
<variant>алкогольного
<variant>соматического
<variant>инфекционного
<variant>ядовитого
<question>Критерии синдрома расстройства сознания.
<variant>отказ от реальной действительности
<variant>ясность восприятия окружающей среды
<variant>сохранение ориентации в окружающей среде

<variant>конфабуляция
<variant>паранойя
<question>Тип расстройства сознания, представляющий опасность для общества.
<variant>помутнение
<variant>аментивное
<variant>онейроидное
<variant>кома
<variant>сопор
<question>Нарушение сознания на несколько секунд...
<variant>абсанc
<variant>помутнение
<variant>делирий
<variant>аменция
<variant>онейроид
<question>Показания для экстренной госпитализации...
<variant>императивные галлюцинации
<variant>объяснение галлюцинаций
<variant>галлюцинации, похожие на видения
<variant>сенестопатия
<variant>парейдolia
<question>Галлюцинации НЕ возникают через...
<variant>невроз
<variant>эпилепсию
<variant>шизофрению
<variant>алкогольные психозы
<variant>прогрессирующий паралич
<question>Анестезия является симптомом психического расстройства при...
<variant>истерии
<variant>делирии
<variant>галлюцинозе
<variant>маниакальном синдроме
<variant>обсессивно-компульсивном неврозе
<question>В составе синдрома Кандинского-Клерамбо НЕ наблюдается...
<variant>болезненного восприятия расстройств
<variant>псевдогаллюцинаций

<variant>навязчивых бредовых мыслей
<variant>ментизма
<variant>изоляции собственных психических процессов
<question>К нарушениям памяти НЕ относится...
<variant>ментизм и шперрунг
<variant>антероградная амнезия
<variant>псевдореминисценции
<variant>ретроградная амнезия
<variant>конфабуляция
<question>У пациентов отказ от пищи возникает при...
<variant>остром бреде отравления
<variant>дисморфоманиакальном бреде
<variant>кататоническом бреде
<variant>маниакальном синдроме
<variant>невротическом синдроме
<question>Кататонический синдром характерен для...
<variant>шизофрении
<variant>истерии
<variant>алкоголизма
<variant>маниакально-депрессивного психоза
<variant>неврозов
<question>Длительность помутнения сознания...
<variant>от нескольких минут до нескольких часов
<variant>3-5 дней
<variant>2-3 недели
<variant>Более месяца
<variant>2 месяца
<question>Обязанности участкового психиатра НЕ включают:
<variant>судебно-психиатрические экспертизы
<variant>начальные осмотры
<variant>амбулаторное лечение

<variant>диспансеризация пациентов
<variant>диагностика
<question>Организовывать экстренную психиатрическую помощь НЕ требуется при:
<variant>психосенсорных расстройствах
<variant>эпилептическом статусе
<variant>сумеречном помрачнении сознания
<variant>психомоторном возбуждении
<variant>алкогольном делирии
<question>Показаниями для госпитализации пациентов в психиатрическую больницу НЕ являются:
<variant>судебно-психиатрическая экспертиза
<variant>алкоголизм
<variant>отравление алкогольными суррогатами
<variant> злоупотребление ПАВ
<variant> наркомания
<question>Основная задача психиатрических стационаров:
<variant> лечение психически больных
<variant>диагностика соматических заболеваний
<variant> выявление пациентов с алкоголизмом
<variant> выявление пациентов с наркозависимостью
<variant> выявление пациентов с токсикоманией
<question>Широко НЕ встречаются истинные галлюцинации при заболеваниях:
<variant>эндогенных психозах
<variant>алкогольных психозах
<variant> маниакальных психозах
<variant> опухолях головного мозга
<variant> реактивных психозах
<question>Бред, сопровождающийся замедлением речи, чувством

вины, выраженной мимикой и самоограничением:
<variant>депрессивный бред
<variant>апатический бред
<variant>кататонический бред
<variant>кататонический синдром
<variant>психогенный бред
<question>Бред с эмоциональной холодностью, полной безразличностью:
<variant>апатический бред
<variant>депрессивный бред
<variant>кататонический бред
<variant>психогенный бред
<variant>негативистский бред
<question>Бред, возникающий после тяжелых, внезапных психических травм:
<variant>психогенный бред
<variant>депрессивный бред
<variant>апатический бред
<variant>кататонический бред
<variant>гебефренический синдром
<question>Клинический метод исследования в психиатрии:
<variant>клиническо-катамнестический
<variant>МРТ головного мозга
<variant>анализ крови и мочи
<variant>электроэнцефалография
<variant>рентгенография черепа
<question>К эмоциональным расстройствам НЕ относится:
<variant>аутизм
<variant>амбивалентность
<variant>эксплазивность
<variant>апатия
<variant>депрессия
<question>Дисфория – это:
<variant>злобность и агрессивность
<variant>неуверенность, снижение настроения
<variant>плохое настроение, переменная беспечность
<variant> страх и сомнение
<variant> тревога и повышенная возбудимость

<question>К гипертическим расстройствам НЕ относится:
<variant>гиперкинезия
<variant>мания
<variant>эйфория
<variant>мория
<variant>экстаз
<question>Типичная мания – это:
<variant>веселая
<variant>психопатическая
<variant>раздраженная
<variant>смущенная
<variant>воздужденная
<question>Скрытая депрессия – это:
<variant>печальное настроение с жалобами на физическое здоровье
<variant>печальное настроение с идеями нигилизма
<variant>ступор на фоне депрессивного настроения
<variant>тревога, возбуждение, аутоагрессия на фоне печального настроения
<variant>отсутствие признаков депрессии
<question>Суицидальные случаи у пациентов чаще встречаются при ... синдроме.
<variant>депрессивном
<variant>параноидальном
<variant>галлюцинаторном
<variant>кататоническом
<variant>маниакальном
<question>Амбивалентность эмоций – это:
<variant>одновременное проявление противоположных чувств
<variant>ощущение недостаточности
<variant>неумение контролировать эмоции
<variant>легкая смена от доброжелательности к раздражению
<variant>эмоциональная нестабильность
<question>Физиологический аффект – это:

<variant>сильная двигательная реакция без нарушения сознания
<variant>сильная двигательная реакция с помутнением сознания вследствие психической травмы
<variant>печальное настроение с чувством обиды
<variant>эмоциональная слабость
<variant>экстаз
<question>К эндогенным заболеваниям относятся:
<variant>маниакально-депрессивный психоз
<variant>эпилепсия
<variant>психопатии
<variant>невротические расстройства
<variant>олигофрения
<question>Самообвинение, склонность к самооскорблению характерны для:
<variant>депрессивной фазы МДП
<variant>маниакальной фазы МДП
<variant>интермиссионного периода МДП
<variant>всех фаз МДП
<variant>латентной фазы МДП
<question>Увеличение двигательной активности:
<variant>маниакальное возбуждение
<variant>гебефреническое возбуждение
<variant>кататоническое возбуждение
<variant>гипертиmia
<variant>лабильность
<question>Замедленные движения встречаются при:
<variant>депрессивном синдроме
<variant>кататоническом ступоре
<variant>маниакальном синдроме
<variant>дисфории
<variant>дистимии

<question>Самообвинения, идеи саморазрушения встречаются при
<variant>депрессивном синдроме
<variant>кататоническом ступоре
<variant>навязчивых мыслях
<variant>навязчивых мыслях
<variant>быстрой раздражительности
<question>При кататоническом возбуждении НЕ наблюдается:
<variant>ускорение ассоциативных процессов
<variant>стереотипность речи и движений
<variant>нарушение речи
<variant>пассивный и активный негативизм
<variant>импульсивные действия
<question>Грубое нарушение памяти:
<variant>амнезия
<variant>кататоническое оцепенение
<variant>депрессивный синдром
<variant>парамнезия
<variant>апатико-абулический синдром
<question>Отрицательные (дефицитарные) симптомы:
<variant>апатико-абулический синдром
<variant>депрессивный синдром
<variant>манический синдром
<variant>парафренный синдром
<variant>параноидный синдром
<question>Кататоническое возбуждение характеризуется:
<variant>разрыв мышления, стереотипность движений
<variant>оцепенение
<variant>демонстрация
<variant>страх
<variant>возбуждение
<question>Расслабленное, импульсивное возбуждение с

агрессией, стереотипность речи и поведения:
<variant>кататония
<variant>мания
<variant>гебефрения
<variant>психогенное расстройство
<variant>карфология
<question>Возбуждение с глупостью и упрямством называется:
<variant>гебефреническое
<variant>кататоническое
<variant>мания
<variant>психогенное
<variant>экстatischeкое
<question>В структуру кататонического ступора НЕ ВХОДИТ:
<variant>эхопраксия
<variant>отсутствие движений
<variant>мутизм
<variant>негативизм
<variant>катаlepsия
<question>Симптом кататонического возбуждения:
<variant>стереотипность речи и движений
<variant>парамнезия
<variant>онейроид
<variant>ментизм
<variant>оцепенение
<question>Пациент говорит, что человек на висевшем портрете двигает лицом и показывает язык. Это называется:
<variant>парейдотические иллюзии
<variant>императивные галлюцинации
<variant>вербальные галлюцинации
<variant>психосенсорные расстройства
<variant>псевдогаллюцинации
<question>Пациент жалуется, что видит «внутренние образы», что он видит, что происходит за стеной. Это:
<variant>псевдогаллюцинация
<variant>сенестопатия

<variant>шумные галлюцинации
<variant>вербальная галлюцинация
<variant>парейдотические иллюзии
<question>Пациент жалуется, что ему кажется, будто кто-то зовет его снаружи, и он отвечает на этот вызов. Это:
<variant>слуховые галлюцинации
<variant>рефлекторные (функциональные) иллюзии
<variant>психосенсорные расстройства
<variant>парейдотические иллюзии
<variant>псевдогаллюцинации
<question>Пациент заявляет, что его голова кажется уменьшенной до размера греческого ореха. Это:
<variant>нарушение схемы тела
<variant>сенестопатия
<variant>шумные галлюцинации
<variant>вербальная галлюцинация
<variant>псевдогаллюцинации
<question>Пациент иногда ощущает, что у него нога «как у слона». Это называется...
<variant>мацропсия
<variant>сенестопатия
<variant>метаморфопсия
<variant>парейдотические иллюзии
<variant>псевдогаллюцинации
<question>Пациент жалуется на неприятное ощущение в груди, как будто «кислота прожигает». Это называется:
<variant>сенестопатией
<variant>гиперестезия
<variant>парестезия
<variant>психосенсорные расстройства
<variant>псевдогаллюцинации
<question>Пациент заявляет, что чувствует, как будто

маленькие насекомые и черви ползают под кожей. Это называется:
<variant>тактильные галлюцинации
<variant>парейдотические иллюзии
<variant>вербальная галлюцинация
<variant>деперсонализация
<variant>псевдогаллюцинации
<question>Пациент заявляет, что люди на улице иногда выглядят как «карлики». Это:
<variant>психосенсорные расстройства
<variant>гиперестезия
<variant>деперсонализация
<variant>парейдотия
<variant>псевдогаллюцинации
<question>Пациент, глядя в зеркало, заявляет: «Интересно, это я, но внутри я не тот, кем был раньше». Это называется:
<variant>деперсонализация
<variant>сенестопатия
<variant>дереализация
<variant>парейдотия
<variant>псевдогаллюцинации
<question>Пациент жалуется на полное отсутствие ощущения в нижней части спины, которое появилось сразу после разговора с начальником. У пациента наблюдается:
<variant>истерическая анестезия
<variant>нарушение схемы тела
<variant>псевдогаллюцинации
<variant>гипестезия
<variant>повреждение передней центральной извилины
<question>Самая часто встречающаяся форма шизофрении в современной клинической практике:
<variant>параноидная
<variant>кататоническая
<variant>гебефреническая

<variant>шизоаффективное расстройство
<variant>шизоидное расстройство
<question>Для гебефренической формы шизофрении характерны следующие расстройства:
<variant>глупость и обидчивость
<variant>депрессивный синдром
<variant>эйфорическое возбуждение
<variant>синдром Кандинского-Клерамбо
<variant>апатико-абулический синдром
<question>Для круговой формы шизофрении характерны следующие расстройства:
<variant>люцидная кататония
<variant>синдром Кандинского-Клерамбо
<variant>манический синдром
<variant>депрессивный синдром
<variant>апатетическое помешательство
<question>Часто встречающееся проявление на поздних стадиях шизофрении (шизофренический дефект):
<variant>апатико-абулический синдром
<variant>онейроидная кататония
<variant>нарушение мышления
<variant>депрессивный синдром
<variant>аментивные расстройства сознания
<question>Учёный может четко и ясно выразить свои мысли на бумаге, но чувствует себя скованным перед незнакомыми людьми. Для преодоления страха он делает упражнения — сжимает свои голени 5 раз перед публичным выступлением. Это:
<variant>обряды

<variant>символическое мышление
<variant>ипохондрический делирий
<variant>переоцененные идеи
<variant>психический автоматизм
<question>Пациент отказывается есть ложкой, потому что «обычно с ложкой поглощают горе»:
<variant>символическое мышление
<variant>бессмысленное отравление
<variant>обсессивные мысли
<variant>переоцененные идеи
<variant>психический автоматизм
<question>Наличие острого психотравмирующего события характерно для психомоторного возбуждения... типа:
<variant>истерического
<variant>гебефренического
<variant>маниакального
<variant>кататонического
<variant>галлюцинаторно-бредового
<question>Пациент медленно, но подробно, с трудом выбирает слова при разговоре. Это называется:
<variant>патологическая обстоятельность
<variant>аутистическое мышление
<variant>шперунг (застревание мыслей)
<variant>мыслительные процессы
<variant>паралогическое мышление
<question>Характерные расстройства для психопатии:
<variant>эмоционально-волевые расстройства
<variant>расстройства восприятия
<variant>нарушения сознания

<variant>кататонические симптомы
<variant>расстройства памяти
<question>Пациент говорит устно, но вместо ответа на вопрос обсуждает философские и этические проблемы, очень абстрактно, отклоняясь от темы разговора. Это называется:
<variant>резонерство
<variant>последовательность мышления
<variant>персеверация
<variant>замедленное мышление
<variant>паралогическое мышление
<question>47-летний пациент жалуется на неприятные ощущения в животе, утверждая, что у него внутри «дырка» и просит провести обследование. При проверке патологии не обнаружено. Какое расстройство восприятия у пациента?
<variant>сенестопатическое
<variant>гиперестезическое
<variant>парестезическое
<variant>синестезическое
<variant>иллюзорное
<question>61-летний пациент сообщает, что видел «красивый голубой цветок, растущий от стакана до потолка». Какое расстройство восприятия у пациента?
<variant>галлюцинации
<variant>иллюзии
<variant>психосенсорные расстройства
<variant>сенестопатия
<variant>синестезия
<question>31-летняя женщина жалуется, что последние 2 недели боится телефонных звонков, не выдерживает звуков лифта и громких разговоров. Какие когнитивные расстройства у неё наблюдаются?

<variant>гиперестезические
<variant>гипестезические
<variant>парестезические
<variant>синестезические
<variant>макропсические
<question>Пациент, страдавший от тифа с высокой температурой, увидел пожар в палате, которого не было, и пытался избежать огня. Какое когнитивное расстройство у него было?
<variant>галлюцинационное
<variant>иллюзорное
<variant>синестезическое
<variant>псевдогаллюцинационное
<variant>гиперестезическое
<question>33-летний пациент постоянно ощущает неприятный запах из отходов, постоянно очищает свою комнату, моет полы в отделении, и при этом всегда ищет источник неприятного запаха. Какой тип расстройства восприятия у пациента?
<variant>обонятельные галлюцинации
<variant>иллюзии
<variant>психосенсорные расстройства
<variant>синестезия
<variant>гиперестезия
<question>23-летний пациент признается, что слышит «голос Бога» из своего позвоночника. Какие когнитивные расстройства развились у пациента?
<variant>псевдогаллюцинации
<variant>настоящие галлюцинации
<variant>иллюзии
<variant>психосенсорные расстройства
<variant>сенестопатии
<question>48-летний пациент ощущает, что в его теле ползает змея, требуя обследования. Какое

расстройство восприятия у него?

<variant>висцеральные

галлюцинации

<variant>иллюзии

<variant>психосенсорные

расстройства

<variant>тактильные

галлюцинации

<variant>синестезия

<question>Рабочий пострадал

от отравления в ТЭЦ и после

этого заявил, что у него

«появились волосы во рту»,

которые он пытался

выдернуть. Какое когнитивное

расстройство у него?

<variant>тактильные

галлюцинации

<variant>вкусовые

галлюцинации

<variant>псевдогаллюцинации

<variant>иллюзии

<variant>психосенсорные

расстройства

<question>Пациент обратился к

психотерапевту с просьбой

помочь избавиться от

постоянных мыслей о

возможном сексуальном

неуспехе. Это...

<variant>обсессивные

бредовые идеи

<variant>персеверативные

бредовые идеи

<variant>ипохондрический

бред

<variant>переоцененные идеи

<variant>психические

автоматизмы

<question>Пациент подробно описывает свою жизнь, начиная с детства. Когда врач попытался его прервать, он рассердился: «Вы спросили, что меня беспокоит». Это называется:

<variant>патологическая

обстоятельность

<variant>символическое

мышление

<variant>бред

<variant>психические

автоматизмы

<variant>аутистическое

мышление

Составители:

 ассистент кафедры Мусаева С.К.

 ассистент кафедры Раманова Г.Б.

Заведующий кафедрой к.м.н., профессор:  Жаркинбекова Н.А.

Протокол: № 1 от «21» 08 2025 г.

Перечень практических навыков по дисциплине «Неврология, психиатрия и наркология»

Оценка практических навыков бакалавра

№	Название навыка	Баллы		
		1	0,5	0
1	Корнеальный рефлекс			
2	Небный рефлекс			
3	Глоточный рефлекс			
4	Верхний брюшной рефлекс			
5	Средний брюшной рефлекс			
6	Нижний брюшной рефлекс			
7	Кримастерный рефлекс			
8	Подошвенный рефлекс			
9	Анальный рефлекс			
10	Оценка мышечной силы	1	0,5	0
11	Оценка мышечного тонуса	1	0,5	0
Нормальные рефлексы (глубокие)		1	0,5	0
12	Надбровный рефлекс			

13	Нижнечелюстной рефлекс			
14	Сгибательно-локтевой рефлекс			
15	Разгибательно локтевой рефлекс			
16	Карпорадиальный рефлекс			
17	Лапаточно-плечевой рефлекс			
18	Коленный рефлекс			
19	Ахиллов рефлекс			
20	Рефлекс Майера			
21	Рефлекс Лери			
	Патологические рефлексы орального автоматизма	1	0,5	0
22	Носогубной рефлекс Аствацатурова			
23	Хоботковый рефлекс			
24	Сосательный рефлекс			
25	Ладонно-подбородочный рефлекс Маринеску-Радовичи			
	Патологические кистевые рефлексы	1	0,5	0
26	Рефлекс Россолимо			
27	Рефлекс Бехтерева-1			
28	Рефлекс Бехтерева-2			
29	Рефлекс Жуковского			
30	Рефлекс Гоффмана			
31	Хватательный рефлекс Янишевского			
32	Рефлекс Якобсона-Ласке			
	Патологические стопные рефлексы	1	0,5	0
33	Рефлекс Бабинского			
34	Рефлекс Оппенгейма			
35	Рефлекс Гордона			
36	Рефлекс Шеффера			
37	Рефлекс Пуссепа			
38	Рефлекс Гроссмана			
39	Рефлекс Чеддока			
40	Рефлекс Россолимо			
41	Рефлекс Бехтерева-1			
42	Рефлекс Бехтерева-2			
43	Рефлекс Жуковского			
44	Синкинезии – это... Виды синкинезии	1	0,5	0
45	Клонусы – это...	1	0,5	0
	Чувствительная сфера (поверхностная)	1	0,5	0
46	Тактильная			
47	Температурная			
48	Болевая			
	Чувствительная сфера (глубокая)	1	0,5	0
49	Суставно-мышечное чувство			
50	Вибрационное			
51	Чувство давления и веса			
52	Кинестезия кожи			
	Чувствительная сфера (сложные виды)	1	0,5	0
53	Локализация			
54	Двухмерно-пространственная			

55	Дискриминационная			
56	Стереогноз			
	Черепно-мозговые нервы	1	0,5	0
57	I пара – обонятельный нерв			
58	II пара- зрительный нерв			
59	III, IV, VI пары – глазодвигательный, блоковый, отводящий			
60	V пара – тройничный нерв			
61	VII пара - лицевой нерв			
62	VIII пара – слуховой нерв			
63	IX, X пары – языкоглоточный и блуждающий нервы			
64	XI пара – добавочный нерв			
65	XII пара-подъязычный нерв			
	Координаторные пробы	1	0,5	0
66	Проба Ромберга			
67	Пальце-носовая проба			
68	Пяточно-коленная			
69	Проба на диадохокинез			
70	Пронаторная проба			
71	Ассинергия Бабинского			
72	Определение видов атаксий			
	Когнитивные расстройства	1	0,5	0
73	Когнитивные нарушения			
74	Проведение теста «рисование часов»			
75	Расстройства речи			
	Менингеальные симптомы	1	0,5	0
76	Ригидность мышц затылка			
77	Симптом Кернинга			
78	Симптом Брудзинского			
79	Скуловой симптом Бехтерева			
80	Симптом Гийена			
81	Общемозговые симптомы			

Составители:  ассистент кафедры Мусаева С.К.

 ассистент кафедры Раманова Г.Б.

Заведующий кафедрой к.м.н., профессор:  Жаркинбекова Н.А.

Протокол: № 1 от «27» 08 2015 г.